

Zarządzenie nr 70/2025  
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie maksymalnych ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do  
Krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań,  
dopuszczonych do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych

W związku z art. 108 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129) i Decyzją Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.Urz. UE Nr L 362, 09/12/2004; z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie postępowania i obiegu dokumentów dotyczących wydawania zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian znajdujących się w trakcie badań rejestrowych z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych, a także biorąc pod uwagę powierzchnię uprawy poszczególnych gatunków w latach 2023-2025 podaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustala się maksymalne ilości materiału siewnego dla każdej odmiany rośliny rolniczej, zgłoszonej do Krajowego rejestru i przyjętej do urzędowych badań, które mogą być dopuszczone do obrotu na terytorium Polski z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

§ 1

Maksymalne ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do Krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań, które mogą być dopuszczone do obrotu na terytorium Polski z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych wynoszą:

| Gatunek rośliny uprawnej                    |                                                                 | Podstawa kalkulacji | Maksymalna ilość nasion/<br>sadzeniaków dla<br>jednej odmiany<br>(kg lub j.s. *) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| nazwa polska                                | nazwa botaniczna                                                |                     |                                                                                  |
| A. Rośliny zbożowe                          |                                                                 |                     |                                                                                  |
| Jęczmień                                    | <i>Hordeum vulgare</i> L.                                       |                     |                                                                                  |
| - forma jara                                |                                                                 | 0,3%                | 130 500 kg                                                                       |
| - forma ozima                               |                                                                 | 0,3%                | 227 500 kg                                                                       |
| Kukurydza                                   | <i>Zea mays</i> L.                                              | 0,1%                | 31 000 kg<br>lub 2 500 j.s.                                                      |
| Mozga kanaryjska<br>(syn. kanar)            | <i>Phalaris canariensis</i> L.                                  | 10 ha               | 300 kg                                                                           |
| Owies nagi<br>(syn. owies nagoziarnisty)    | <i>Avena nuda</i> L.                                            | 10 ha               | 1 400 kg                                                                         |
| Owies szorstki<br>(syn. owies owsik)        | <i>Avena strigosa</i> Schreb.                                   | 10 ha               | 1 000 kg                                                                         |
| Owies zwyczajny,<br>w tym owies bizantyjski | <i>Avena sativa</i> L.,<br>w tym <i>Avena byzantina</i> K. Koch |                     |                                                                                  |
| - forma jara                                |                                                                 | 0,3%                | 276 500 kg                                                                       |
| - forma ozima                               |                                                                 | 10 ha               | 1 800 kg                                                                         |
| Pszenica orkisz                             | <i>Triticum aestivum</i> L. subsp.<br><i>spelta</i> (L.) Thell. |                     |                                                                                  |
| - forma jara                                |                                                                 | 10 ha               | 2 000 kg                                                                         |
| - forma ozima                               |                                                                 | 10 ha               | 2 000 kg                                                                         |

| Gatunek rośliny uprawnej                             |                                                                                       | Podstawa kalkulacji | Maksymalna ilość nasion/sadzeniaków dla jednej odmiany (kg lub j.s.*) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| nazwa polska                                         | nazwa botaniczna                                                                      |                     |                                                                       |
| Pszenica twarda<br>- forma jara<br>- forma ozima     | <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren                  | 10 ha<br>10 ha      | 2 100 kg<br>2 300 kg                                                  |
| Pszenica zwyczajna<br>- forma jara<br>- forma ozima  | <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>                                    | 0,3%<br>0,3%        | 88 500 kg<br>1 531 000 kg                                             |
| Pszenżyto<br>- forma jara<br>- forma ozima           | <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus ( <i>Triticum</i> spp. x <i>Secale</i> spp.) | 0,1%<br>0,1%        | 11 000 kg<br>220 000 kg                                               |
| Żyto<br>- forma jara<br>- forma ozima                | <i>Secale cereale</i> L.                                                              | 0,1%<br>0,1%        | 3 500 kg<br>90 500 kg                                                 |
| <b>B. Rośliny oleiste i włókniste</b>                |                                                                                       |                     |                                                                       |
| Gorczyca biała                                       | <i>Sinapis alba</i> L.                                                                | 0,1%                | 300 kg                                                                |
| Gorczyca sarepska                                    | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.                                                    | 10 ha               | 80 kg                                                                 |
| Kminek zwyczajny                                     | <i>Carum carvi</i> L.                                                                 | 10 ha               | 100 kg                                                                |
| Konopie                                              | <i>Cannabis sativa</i> L.                                                             | 10 ha               | 500 kg                                                                |
| Len zwyczajny<br>- włóknisty<br>- oleisty            | <i>Linum usitatissimum</i> L.                                                         | 10 ha<br>10 ha      | 1 200 kg<br>500 kg                                                    |
| Mak                                                  | <i>Papaver somniferum</i> L.                                                          | 10 ha               | 10 kg                                                                 |
| Rzepak<br>- forma jara<br>- forma ozima              | <i>Brassica napus</i> L. (partim)                                                     | 0,1 %<br>0,1%       | 50 kg<br>lub 5 j.s.<br>3 700 kg<br>lub 350 j.s.                       |
| Rzepak                                               | <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs                          | 10 ha               | 50 kg                                                                 |
| Słonecznik                                           | <i>Helianthus annuus</i> L.                                                           | 0,1%                | 700 kg                                                                |
| Soja                                                 | <i>Glycine max</i> (L.) Merrill                                                       | 0,1%                | 11 000 kg<br>lub 300 j.s.                                             |
| <b>C. Rośliny pastewne</b>                           |                                                                                       |                     |                                                                       |
| <b>Bobowate - Fabaceae (Leguminosae)</b>             |                                                                                       |                     |                                                                       |
| Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty) | <i>Biserrula pelecinus</i> L.                                                         | 10 ha               | 100 kg                                                                |
| Bobik                                                | <i>Vicia faba</i> L. (partim)                                                         | 0,3%                | 30 000 kg                                                             |
| Esparceta siewna                                     | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.                                                    | 10 ha               | 700 kg                                                                |
| Groch siewny                                         | <i>Pisum sativum</i> L. (partim)                                                      | 0,3%                | 82 000 kg                                                             |
| Groszek cieierzycowaty                               | <i>Lathyrus cicera</i> L.                                                             | 10 ha               | 500 kg                                                                |
| Komonica zwyczajna                                   | <i>Lotus corniculatus</i> L.                                                          | 10 ha               | 80 kg                                                                 |
| Koniczyna biała                                      | <i>Trifolium repens</i> L.                                                            | 10 ha               | 100 kg                                                                |
| Koniczyna białoróżowa (syn. koniczyna szwedzka)      | <i>Trifolium hybridum</i> L.                                                          | 10 ha               | 120 kg                                                                |
| Koniczyna gruczołkowata                              | <i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.                                                 | 10 ha               | 150 kg                                                                |
| Koniczyna kosmata                                    | <i>Trifolium hirtum</i> All.                                                          | 10 ha               | 150 kg                                                                |

| Gatunek rośliny uprawnej                       |                                                                                    | Podstawa kalkulacji | Maksymalna ilość nasion/<br>sadzeniaków dla jednej odmiany<br>(kg lub j.s.*) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| nazwa polska                                   | nazwa botaniczna                                                                   |                     |                                                                              |
| Koniczyna krwistoczerwona<br>(syn. inkarnatka) | <i>Trifolium incarnatum</i> L.                                                     | 10 ha               | 200 kg                                                                       |
| Koniczyna łąkowa<br>(syn. koniczyna czerwona)  | <i>Trifolium pratense</i> L.                                                       | 0,1%                | 550 kg                                                                       |
| Koniczyna łuskowata                            | <i>Trifolium squarrosus</i> L.                                                     | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Koniczyna Michela                              | <i>Trifolium michelianum</i> Savi                                                  | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Koniczyna perska                               | <i>Trifolium resupinatum</i> L.                                                    | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Koniczyna pęcherzykowata                       | <i>Trifolium vesiculosus</i> Savi                                                  | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Koniczyna podziemna                            | <i>Trifolium subterraneum</i> L.                                                   | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Koniczyna przewężona                           | <i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.                                                | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Koniczyna rozdęta                              | <i>Trifolium fragiferum</i> L.                                                     | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna chmielowa                              | <i>Medicago lupulina</i> L.                                                        | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna kolczasta                              | <i>Medicago doliata</i> Carmign.                                                   | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna mieszańcowa                            | <i>Medicago x varia</i> T. Martyn                                                  | 0,1%                | 1 000 kg                                                                     |
| Lucerna nadbrzeżna                             | <i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.                                        | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna ostrostrąkowa                          | <i>Medicago murex</i> Willd.                                                       | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna pomarszczona                           | <i>Medicago rugosa</i> Desr.                                                       | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna siewna                                 | <i>Medicago sativa</i> L.                                                          | 0,1%                | 600 kg                                                                       |
| Lucerna ściętolistkowa                         | <i>Medicago truncatula</i> Gaertn.                                                 | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna tarczowata                             | <i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.                                              | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna wielokształtna                         | <i>Medicago polymorpha</i> L.                                                      | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Lucerna włoska                                 | <i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori                                              | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Łubin biały                                    | <i>Lupinus albus</i> L.                                                            | 0,1%                | 4 300 kg                                                                     |
| Łubin wąskolistny                              | <i>Lupinus angustifolius</i> L.                                                    | 0,1%                | 28 000 kg                                                                    |
| Łubin żółty                                    | <i>Lupinus luteus</i> L.                                                           | 0,1%                | 2 000 kg                                                                     |
| Rutwica wschodnia                              | <i>Galega orientalis</i> Lam.                                                      | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Seradela pastewna                              | <i>Ornithopus sativus</i> Brot.                                                    | 0,1%                | 1 000 kg                                                                     |
| Seradela zwarta                                | <i>Ornithopus compressus</i> L.                                                    | 10 ha               | 600 kg                                                                       |
| Wyka bengalska                                 | <i>Vicia benghalensis</i> L.                                                       | 10 ha               | 1 000 kg                                                                     |
| Wyka kosmata                                   | <i>Vicia villosa</i> Roth                                                          | 10 ha               | 850 kg                                                                       |
| Wyka siewna                                    | <i>Vicia sativa</i> L.                                                             | 0,1%                | 1 500 kg                                                                     |
| <b>Wiechlinowate - Poaceae (Gramineae)</b>     |                                                                                    |                     |                                                                              |
| Festulolium                                    | <i>xFestulolium</i> Asch. & Graebn.<br>( <i>Festuca</i> spp. x <i>Lolium</i> spp.) | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| Kostrzewa czerwona                             | <i>Festuca rubra</i> L.                                                            | 10 ha               | 120 kg                                                                       |
| Kostrzewa łąkowa                               | <i>Festuca pratensis</i> Huds.                                                     | 10 ha               | 200 kg                                                                       |
| Kostrzewa nitkowata                            | <i>Festuca filiformis</i> Pourr.                                                   | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Kostrzewa owcza                                | <i>Festuca ovina</i> L.                                                            | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Kostrzewa szczecińska                          | <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.                                          | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Kostrzewa trzcinowa                            | <i>Festuca arundinacea</i> Schreber                                                | 10 ha               | 250 kg                                                                       |
| Kupkówka pospolita                             | <i>Dactylis glomerata</i> L.                                                       | 10 ha               | 250 kg                                                                       |

| Gatunek rośliny uprawnej                                                                                                               |                                                                                                                                | Podstawa kalkulacji | Maksymalna ilość nasion/<br>sadzeniaków dla jednej odmiany<br>(kg lub j.s.*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| nazwa polska                                                                                                                           | nazwa botaniczna                                                                                                               |                     |                                                                              |
| Mietlica biaława                                                                                                                       | <i>Agrostis gigantea</i> Roth                                                                                                  | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Mietlica pospolita                                                                                                                     | <i>Agrostis capillaris</i> L.                                                                                                  | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Mietlica psia                                                                                                                          | <i>Agrostis canina</i> L.                                                                                                      | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Mietlica rozłogowa                                                                                                                     | <i>Agrostis stolonifera</i> L.                                                                                                 | 10 ha               | 100 kg                                                                       |
| Rajgras wyniosły<br>(syn. rajgras francuski)                                                                                           | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl                                                             | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| Stokłosa uniolowata                                                                                                                    | <i>Bromus catharticus</i> Vahl                                                                                                 | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| Tymotka kolankowata                                                                                                                    | <i>Phleum nodosum</i> L.                                                                                                       | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Tymotka łąkowa                                                                                                                         | <i>Phleum pratense</i> L.                                                                                                      | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Wiechlina błotna                                                                                                                       | <i>Poa palustris</i> L.                                                                                                        | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Wiechlina gajowa                                                                                                                       | <i>Poa nemoralis</i> L.                                                                                                        | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Wiechlina łąkowa                                                                                                                       | <i>Poa pratensis</i> L.                                                                                                        | 10 ha               | 200 kg                                                                       |
| Wiechlina zwyczajna                                                                                                                    | <i>Poa trivialis</i> L.                                                                                                        | 10 ha               | 150 kg                                                                       |
| Wyczyniec łąkowy                                                                                                                       | <i>Alopecurus pratensis</i> L.                                                                                                 | 10 ha               | 200 kg                                                                       |
| Życica mieszańcowa<br>(syn. rajgras oldenburski)                                                                                       | <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.                                                                                              | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| Życica trwała<br>(syn. rajgras angielski)                                                                                              | <i>Lolium perenne</i> L.                                                                                                       | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| Życica wielokwiatowa<br>(syn. rajgras włoski),<br>z wyłączeniem życicy<br>wielokwiatowej westerwoldzkiej<br>(syn. rajgras holenderski) | <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                                                                                                 | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| Życica wielokwiatowa<br>westerwoldzka<br>(syn. rajgras holenderski)                                                                    | <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                                                                                                 | 10 ha               | 400 kg                                                                       |
| <b>Inne</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                |                     |                                                                              |
| Babka lancetowata                                                                                                                      | <i>Plantago lanceolata</i> L.                                                                                                  | 10 ha               | 20 kg                                                                        |
| Brukiew                                                                                                                                | <i>Brassica napus</i> L.<br>var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.                                                                | 10 ha               | 20 kg                                                                        |
| Facelia błękitna                                                                                                                       | <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.                                                                                           | 0,1%                | 500 kg                                                                       |
| Kapusta pastewna                                                                                                                       | <i>Brassica oleracea</i> L.<br>convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef.<br>var. <i>medullosa</i> Thell.<br>+ var. <i>viridis</i> L. | 10 ha               | 60 kg                                                                        |
| Rzodkiew oleista                                                                                                                       | <i>Raphanus sativus</i> L.<br>var. <i>oleiformis</i> Pers.                                                                     | 10 ha               | 120 kg                                                                       |
| <b>D. Burak</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                |                     |                                                                              |
| Burak cukrowy                                                                                                                          | <i>Beta vulgaris</i> L.                                                                                                        | 0,1%                | 300 j.s.                                                                     |
| Burak pastewny<br>- odmiany jednokielkowe<br>- odmiany wielokielkowe                                                                   | <i>Beta vulgaris</i> L.                                                                                                        | 10 ha<br>10 ha      | 12 j.s.<br>200 kg                                                            |
| <b>E. Ziemniak</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                |                     |                                                                              |
| Ziemniak                                                                                                                               | <i>Solanum tuberosum</i> L.                                                                                                    | 0,1%                | 471 000 kg                                                                   |

\* - j.s. - kukurydza - 50 000 nasion; rzepak - na 3 ha; burak cukrowy i pastewny - 100 000 nasion (na ok. 0,8 ha)

## § 2

1. Podane w § 1 maksymalne ilości materiału siewnego obowiązują przy rozpatrywaniu wniosków złożonych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w terminie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.
2. Traci moc zarządzenie nr 57/2024 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie maksymalnych ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do Krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań, dopuszczonych do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

DYREKTOR  
  
prof. dr hab. Henryk Bujak