



KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

ZDOO Lisewo
wyniki z 2010 roku


ODMIANY WCZESNE

Odmiana		Hodowca	Plon ogólny dt z ha	Plon handlowy dt z ha	Główki handlowe	Główki o masie < 0,7 kg	Główki popękane i luźne
					% ogólnej liczby główek		
Dynamic	H	Moravoseed	618	546	85,9	4,2	9,9
Hornet	H	Moravoseed	604	533	79,7	12,5	7,8

Odmiana	Hodowca	Średnia masa główki handlowej - kg	Trwałość główek - skala 9 ^o	Udział głąba wewnętrznego w wysokości główki - %	L. dni od sadzenia do pierwszego zbioru	
Dynamic	H	Moravoseed	1,27	4,0	40,6	63
Hornet	H	Moravoseed	1,34	4,2	43,4	63

ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE

Plonowanie badanych odmian




ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE – WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE BADANYCH ODMIAN

Odmiana	Hodowca	Główki handlowe	Główki popękane i chore	Średnia masa główki handlowej - kg	Trwałość główek - skala 9 ^o	Udział głąba wewnętrznego w wysokości główki - %	Wskaźnik wczesności Reinholda - l.dni
		% ogólnej liczby główek					
Irodori	H Kaneko Seeds	99,0	1,0	3,1	8,0	40,0	72
KA-780	H Kaneko Seeds	95,8	4,1	3,1	4,0	38,1	73
Kalibro	H Moravoseed	97,4	2,6	3,2	7,0	31,0	78
Karlla	H Kees Broersen Zaden	100,0	0,0	3,3	8,0	42,2	79
Sougetsu	H Kaneko Seeds	93,8	6,3	3,7	5,0	48,6	73
Zeus	H Moravoseed	94,3	5,8	3,5	5,0	52,8	70



ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE

Plonowanie badanych odmian




ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE – WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE BADANYCH ODMIAN

Odmiana	Hodowca	Główki handlowe o masie >2,5 kg	Główki handlowe o masie 2,5 - 1,2 kg	Główki handlowe ogółem	Średnia masa główki handlowej - kg	Udział głaba wewnętrznego w wysokości i główki - %	L. dni od sadzenia do zbioru	
		% ogólnej liczby główek						
Froggy	H	Kees Broersen Zaden	96,9	0,0	96,9	4,5	50,0	109
HS 103	H	Hortag Seeds	94,3	0,5	94,8	4,0	53,9	109
Madison	H	Moravoseed	96,9	0,0	96,9	3,7	52,4	109
Ramco	H	Syngenta Seed	97,4	0,0	97,4	4,1	56,7	109
Squadron	H	Clause	79,2	16,1	95,3	2,5	53,2	121
Target	H	Moravoseed	85,4	11,5	96,9	2,8	39,7	121



ODMIANY PÓŻNE

Plonowanie badanych odmian



ODMIANY PÓŹNE – WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE BADANYCH ODMIAN

Odmiana		Hodowca	Główki handlowe o masie >2,5 kg	Główki handlowe o masie 2,5 - 1,2 kg	Główki handlowe ogółem	Średnia masa główki handlowej - kg	Udział głąba wewnętrznego w wysokości główki - %	L. dni od sadzenia do zbioru
			% ogólnej liczby główek					
odmiany do przechowywania								
Adaptor	H	Syngenta Seed	100,0	0,0	100,0	3,1	54,8	126
Agresor	H	Syngenta Seed	99,0	0,0	99,0	3,7	58,2	126
Fatcor	H	Syngenta Seed	96,4	0,0	96,4	3,3	46,4	126
Gilson	H	Nickerson Zwaan	60,9	39,1	100,0	2,3	55,2	126
Lion	H	Nickerson Zwaan	86,5	10,9	97,4	2,5	44,4	126
Replika	H	PlantiCo Zielonki	100,0	0,0	100,0	3,7	50,7	126
SG 3448	H	Syngenta Seed	96,9	0,0	96,9	3,1	54,0	126
Sting	H	Nickerson Zwaan	75,0	24,5	99,5	2,5	49,7	126
Zenon	H	Syngenta Seed	100,0	0,0	100,0	2,9	52,8	126

ODMIANY PÓŻNE – WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE BADANYCH ODMIAN

Odmiana	Hodowca	Główki handlowe o masie >2,5 kg	Główki handlowe o masie 2,5 - 1,2 kg	Główki handlowe ogółem	Średnia masa główki handlowej - kg	Udział głębia wewnętrznego w wysokości i główki - %	L. dni od sadzenia do zbioru
		% ogólnej liczby główek					
odmiany do kwaszenia							
Furious	H Monsanto, Seminis	45,3	51,6	96,9	2,2	54,2	124
Kolia	H Monsanto, Seminis	99,5	0,0	99,5	3,5	53,7	119
Liberator	H Syngenta Seed	94,3	0,0	94,3	4,5	52,2	107
Novoton	H Syngenta Seed	97,4	0,0	97,4	5,0	44,3	107
Szarada Późna	H PlantiCo Zielonki	97,4	0,0	97,4	3,1	54,6	119
Vestri	H Monsanto, Seminis	96,4	0,0	96,4	4,1	52,4	107