


Kapusta głowiasta biała badana w systemie PDOiR

ZDOO Lisewo
wyniki z 2011 roku



Odmiany wczesne – plonowanie badanych odmian




Odmiany wczesne - ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana	H	Hodowca	Plon handlowy dt z ha	Główki handlowe o masie $\geq 0,7$ kg	Główki o masie $< 0,7$ kg	Główki popękane	Główki chore
				% ogólnej liczby główek			
Acura	H	Hortag Seed	393	67,7	26,0	6,2	0,0
Fortex	H	Hortag Seed	779	82,7	10,5	1,0	5,7
Lotus	H	Hortag Seed	953	95,8	0,0	0,0	4,2
Markiza	H	Hortag Seed	690	89,0	3,6	5,7	1,6
Performa	H	Hortag Seed	847	94,8	0,0	1,0	4,2
Reserva	H	Hortag Seed	610	92,2	4,2	1,0	2,6

Odmiany wczesne - ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana	Hodowca	Średnia masa główki handlowej - kg	Trwałość główek - skala 9 ⁰	Udział głaba wewnętrznego w wysokości główki - %	L. dni od sadzenia do pierwszego zbioru	Wskaźnik wczesności Reinholda – l.dni
Acura	H Hortag Seed	1,16	3,5	40,3	61	63
Fortex	H Hortag Seed	1,94	6,5	55,8	87	92
Lotus	H Hortag Seed	1,98	6,2	40,2	97	97
Markiza	H Hortag Seed	1,54	6,0	37,5	68	71
Performa	H Hortag Seed	1,78	7,5	37,3	97	97
Reserva	H Hortag Seed	1,32	6,5	36,2	68	71

Odmiany średniowczesne – plonowanie badanych odmian




Odmiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana	H	Hodowca	Plon handlowy dt z ha	Główki handlowe o masie $\geq 1,2$ kg	Główki o masie $< 1,2$ kg	Główki popękane	Główki chore
				% ogólnej liczby główek			
Irodori	H	Kaneko Seeds	780	84,4	0,5	3,1	12,0
Quartz	H	Monsanto – Seminis	993	91,1	0,5	0,0	8,4
Rare Ball	H	Kaneko Seeds	733	76,5	1,6	16,6	5,3
Sougetsu	H	Kaneko Seeds	514	82,3	3,6	1,0	13,0

Odmiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana		Hodowca	Średnia masa główki handlowej - kg	Trwałość główek - skala 9 ⁰	Udział głaba wewnę- trznego w wysokości główki - %	L. dni od sadzenia do pierwszego zbioru	Wskaźnik wczesności Reinholda - l.dni
Irodori	H	Kaneko Seeds	2,80	5,0	31,4	71	74
Quartz	H	Monsanto - Seminis	3,28	8,2	49,7	105	104
Rare Ball	H	Kaneko Seeds	2,96	4,0	48,2	71	69
Sougetsu	H	Kaneko Seeds	1,87	4,8	51,7	65	67

Odmiiany średniopóźne i późne – plonowanie badanych odmian



Odmiany średniopóźne i późne – ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana	Hodowca	Plon handlowy dt z ha	Główki handlowe o masie > 2,5 kg	Główki handlowe o masie 2,5 - 1,2 kg	Główki handlowe ogółem	Główki o masie <1,2 kg	Główki chore
			% ogólnej liczby główek				
Froggy H	Kees Broersen Zaden	873	61,1	0,0	61,1	0,0	38,9
Furios H	Monsanto – Seminis	838	94,3	3,6	97,9	1,4	0,7
Fuyukuguri H	Kaneko Seeds	923	76,4	1,4	77,8	0,0	22,2
Gilson H	Nickerson Zwaan	867	98,0	0,0	98,0	0,0	2,0
Langedijker Bewaar <i>Starski</i>	Kees Broersen Zaden	930	93,0	2,1	95,1	4,2	0,7
Kolia H	Monsanto – Seminis	1180	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Korund H	POLAN Kraków	819	93,0	0,0	93,0	3,5	3,5
Sting H	Nickerson Zwaan	841	94,4	1,4	95,8	0,7	3,5



Odmiany średniopóźne i późne – ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana		Hodowca	Średnia masa główki handlowej - kg	Udział głaba wewnętrznego w wysokości główki - %	Liczba dni od sadzenia do zbioru
Froggy	H	Kees Broersen Zaden	5,2	41,0	136
Furios	H	Monsanto – Seminis	3,2	44,1	155
Fuyukuguri	H	Kaneko Seeds	4,3	36,4	143
Gilson	H	Nickerson Zwaan	3,2	45,4	149
Langedijker Bewaar <i>Starski</i>		Kees Broersen Zaden	3,6	48,8	155
Kolia	H	Monsanto – Seminis	4,2	51,8	149
Korund	H	POLAN Kraków	3,2	44,6	155
Sting	H	Nickerson Zwaan	3,2	47,4	149