




# Marchew jadalna badana w systemie PDOiR

SDOO Szczecin Dąbie  
– wyniki z 2011 roku



# Odmiiany wczesne

## Plonowanie badanych odmian





# Odmiany wczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 3,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 1,5-3,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Formosa	Hortag Seed	<b>77,8</b>	69,3	8,5	140
HS-N077N	Hortag Seed	<b>88,4</b>	84,4	4,0	150
Liberty	H Hortag Seed	<b>74,5</b>	68,0	6,5	170
Marion	H Moravoseed	<b>91,3</b>	89,5	1,8	150




# Odmiany wczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 1,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego			
Formosa	Hortag Seed	1,1	8,4	11,2	1,5
HS-N077N	Hortag Seed	0,1	8,0	2,9	0,5
Liberty H	Hortag Seed	1,8	13,5	9,4	0,8
Marion H	Moravoseed	0,8	3,8	4,1	0,0



# Odmiany średniowczesne

## Plonowanie badanych odmian



plon ogólny plon handlowy



# Odmiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,0-4,0$ cm	Średnia masa korzeni	
		% plonu ogólnego			g	
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	87,9	50,8	37,1	180
Arleta		PNOS Ożarów Maz.	87,1	46,6	40,5	170
Carboli	H	Monsanto – Seminis	90,5	63,2	27,3	160
Carrazzo	H	Monsanto – Seminis	86,9	63,0	23,9	160
Fama	H	SPÓJNIA Nochowo	90,7	53,5	37,2	160
Galicja	H	POLAN Kraków	84,0	50,0	34,0	150
Nebula	H	Monsanto – Seminis	84,0	57,7	26,3	180
Rumba		POLAN Kraków	86,4	61,2	25,2	170




# Odmiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,0$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore	
		% plonu ogólnego				
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	4,6	1,5	1,1	4,9
Arleta		PNOS Ożarów Maz.	4,3	0,9	1,2	6,4
Carboli	H	Monsanto – Seminis	3,1	1,0	0,4	5,0
Carrazzo	H	Monsanto – Seminis	3,9	1,4	0,6	7,3
Fama	H	SPÓJNIA Nochowo	4,0	0,7	0,0	4,6
Galicja	H	POLAN Kraków	4,3	1,9	1,3	8,5
Nebula	H	Monsanto – Seminis	5,7	2,0	0,2	8,1
Rumba		POLAN Kraków	3,3	1,2	1,0	8,2



# Odmiany średniopóźne i późne

## Plonowanie badanych odmian







# Odmiany średniopóźne i późne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Delta	SPÓJNIA Nochowo	<b>91,0</b>	65,5	25,5	150
Finezja	SPÓJNIA Nochowo	<b>92,7</b>	60,3	32,4	150
NOE 809 H	SPÓJNIA Nochowo	<b>91,1</b>	59,6	31,5	160
NOE 1010 H	SPÓJNIA Nochowo	<b>87,7</b>	44,6	43,1	140
Volcano H	Vilmorin	<b>87,0</b>	53,1	33,9	130



# Odmiany średniopóźne i późne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego			
Delta	SPÓJNIA Nochowo	3,5	1,1	1,3	3,0
Finezja	SPÓJNIA Nochowo	4,8	0,8	0,5	1,2
NOE 809 H	SPÓJNIA Nochowo	3,4	2,3	0,2	3,0
NOE 1010 H	SPÓJNIA Nochowo	6,9	1,4	1,0	3,0
Volcano H	Vilmorin	4,2	1,8	0,1	7,0