




# Marchew jadalna badana w systemie PDOiR

SDOO Szczecin Dąbie - wyniki z 2012 roku



# Odmiany wczesne

## – plonowanie badanych odmian





# Odmiany wczesne

## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 3,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 1,5-3,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Aneta H	Moravoseed	85,4	75,5	9,9	220
Carvora H	Monsanto – Seminis	86,9	69,8	17,1	220
Marion H	Moravoseed	82,5	62,5	19,9	170
Napoli H	Bejo Zaden	84,0	76,1	7,8	190




# Odmiany wczesne

## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 1,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego			
Aneta H	Moravoseed	1,0	2,9	6,8	3,9
Carvora H	Monsanto – Seminis	1,7	3,7	5,0	2,6
Marion H	Moravoseed	2,2	1,9	9,7	3,8
Napoli H	Bejo Zaden	0,6	3,1	7,1	5,2

# Odmiiany średniowczesne

## – plonowanie badanych odmian





# Odmiany średniowczesne

## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,0-4,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Afalon H	Moravoseed	84,7	67,4	17,3	230
Carboli H	Monsanto – Seminis	90,5	63,0	27,5	210
Fama H	SPÓJNIA Nochowo	84,8	65,2	19,6	200
Napa H	Bejo Zaden	81,7	55,5	26,2	300



# Odmiany średniowczesne


## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,0$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
			% plonu ogólnego			
Afalon	H	Moravoseed	3,6	2,6	6,6	2,5
Carboli	H	Monsanto – Seminis	3,5	2,9	2,4	0,7
Fama	H	SPÓJNIA Nochowo	5,7	2,9	4,6	2,0
Napa	H	Bejo Zaden	5,0	5,9	7,4	0,0



# Odmiany średniopóźne

## – plonowanie badanych odmian







# Odmiany średniopóźne

## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	H	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Średnia masa korzeni
			% plonu ogólnego			g
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	82,0	63,2	18,9	280
Nebula	H	Monsanto – Seminis	80,2	60,7	19,6	300
Nerac	H	Bejo Zaden	85,1	55,6	29,5	200
Ruta	H	SPÓJNIA Nochowo	85,2	56,7	28,5	260



# Odmiany średniopóźne


## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	H	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
			% plonu ogólnego			
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	7,5	6,6	2,7	1,1
Nebula	H	Monsanto – Seminis	7,8	5,7	5,9	0,4
Nerac	H	Bejo Zaden	8,4	4,4	1,9	0,2
Ruta	H	SPÓJNIA Nochowo	7,7	5,8	0,8	0,6



# Odmiany późne

## – plonowanie badanych odmian





# Odmiany późne

## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Delta	SPÓJNIA Nochowo	89,4	67,8	21,6	240
Cortina H	Moravoseed	87,1	63,6	23,5	310
Kazan H	Bejo Zaden	88,1	78,5	9,7	220
Sukces	HR Snowidza	87,0	65,3	21,7	260

# Odmiany późne

## – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego			
<b>Delta</b>	<b>SPÓJNIA Nochowo</b>	<b>6,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Cortina</b> H	<b>Moravoseed</b>	<b>7,8</b>	<b>3,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Kazan</b> H	<b>Bejo Zaden</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Sukces</b>	<b>HR Snowidza</b>	<b>5,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,3</b>