




Marchew jadalna badana w systemie PDOiR

ZDOO Lisewo - wyniki z 2012 roku



Odmiany wczesne

– plonowanie badanych odmian





Odmiany wczesne

– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 3,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 1,5-3,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Aneta H	Moravoseed	83,8	75,2	8,6	390
Carvora H	Monsanto – Seminis	81,9	64,5	17,4	285
Marion H	Moravoseed	82,9	53,3	29,6	260
Napoli H	Bejo Zaden	90,0	54,3	35,7	270




Odmiany wczesne

– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 1,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
			% plonu ogólnego			
Aneta	H	Moravoseed	4,4	2,8	9,0	0,0
Carvora	H	Monsanto – Seminis	6,3	3,4	8,1	0,3
Marion	H	Moravoseed	4,4	4,0	8,3	0,4
Napoli	H	Bejo Zaden	3,0	4,1	2,9	0,0



Odmiany średniowczesne – plonowanie badanych odmian





Odmiany średniowczesne – ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,0$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,0-4,0$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Afalon H	Moravoseed	80,0	18,6	61,4	275
Carboli H	Monsanto – Seminis	78,1	5,7	72,5	210
Fama H	SPÓJNIA Nochowo	90,7	7,6	83,1	260
Napa H	Bejo Zaden	81,6	25,8	55,8	305

Odmiany średniowczesne


– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,0$ cm	Korzenie rozwidlone	Korzenie popękane	Korzenie chore
			% plonu ogólnego			
Afalon	H	Moravoseed	10,5	1,7	7,7	0,0
Carboli	H	Monsanto – Seminis	18,2	1,5	2,2	0,0
Fama	H	SPÓJNIA Nochowo	5,5	1,6	2,2	0,0
Napa	H	Bejo Zaden	5,9	1,5	11,0	0,0



Odmiany średniopóźne

– plonowanie badanych odmian





Odmiany średniopóźne

– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Średnia masa korzeni
			% plonu ogólnego			g
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	88,6	16,1	72,5	310
Nebula	H	Monsanto – Seminis	91,4	28,5	62,9	315
Nerac	H	Bejo Zaden	79,9	2,0	77,9	250
Ruta	H	SPÓJNIA Nochowo	91,7	9,9	81,8	325



Odmiany średniopóźne


– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
			% plonu ogólnego			
Alfa	H	SPÓJNIA Nochowo	3,5	2,0	5,9	0,0
Nebula	H	Monsanto – Seminis	3,1	2,9	2,6	0,0
Nerac	H	Bejo Zaden	18,0	1,0	1,1	0,0
Ruta	H	SPÓJNIA Nochowo	4,0	2,5	1,8	0,0



Odmiany późne

– plonowanie badanych odmian





Odmiany późne

– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie handlowe ogółem	Korzenie o $\varnothing > 4,5$ cm	Korzenie o $\varnothing 2,5-4,5$ cm	Średnia masa korzeni
		% plonu ogólnego			g
Delta	SPÓJNIA Nochowo	87,3	13,1	74,2	360
Cortina H	Moravoseed	89,1	7,9	81,2	340
Kazan H	Bejo Zaden	91,2	17,6	73,6	430
Sukces	HR Snowidza	91,6	16,7	75,0	420



Odmiany późne

– ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Korzenie o $\varnothing < 2,5$ cm	Korzenie rozwidłone	Korzenie popękane	Korzenie chore
		% plonu ogólnego			
Delta	SPÓJNIA Nochowo	7,2	0,8	4,6	0,0
Cortina	H Moravoseed	9,9	0,0	1,0	0,0
Kazan	H Bejo Zaden	6,5	0,7	1,6	0,0
Sukces	HR Snowidza	7,5	0,0	0,9	0,0