


Odmiany ogórka

badane w systemie PDOiR


ZDOO w Tarnowie; wyniki z 2014



Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - plonowanie badanych odmian



Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian



Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe

- ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana	H	Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 ⁰			
Allianz	H	Bejo Zaden	2,8	8,0	7,0	7,0	5,8
Grot	H	POLAN Kraków	3,0	8,0	7,0	6,0	4,3
Lukas	H	SPÓJNIA Nochowo	3,0	8,0	7,0	6,5	5,5
Markus	H	POLAN Kraków	2,8	8,3	7,0	7,0	6,0
Śremski	H	SPÓJNIA Nochowo	2,8	8,0	7,0	6,5	5,3
Nadusha	H	Monsanto / Seminis	2,9	8,0	7,0	7,0	5,8

Odmiiany konserwowe partenokarpiczne - plon i jego struktura

Odmiana	H	Hodowca	Plon			
			ogólny	handlowy	owoców konserwowych	wczesny
			dt z ha			
Artist	H	Bejo Zaden	362	318	266	82
Ortina	H	Nunhems	383	337	307	113

Odmiana	H	Hodowca	Udział owoców			
			konserwowych	za długich	za grubych	niekształtnych
			% plonu ogólnego			
Artist	H	Bejo Zaden	73,6	14,2	3,4	8,8
Ortina	H	Nunhems	80,3	7,8	4,2	7,8

Odmiiany konserwowe partenokarpiczne

- ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana	H	Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 ⁰			
Artist	H	Bejo Zaden	3,1	7,0	6,3	6,0	4,0
Ortina	H	Nunhems	3,1	7,5	6,3	6,0	3,8



www.coboru.pl

k.bartoszak@coboru.pl