




Wyniki doświadczeń z odmianami ogórka badanymi w systemie PDO w roku 2015

ZDOO w Tarnowie




Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (uprawa pod włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - plon badanych odmian





Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (uprawa pod włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - struktura plonu ogólnego






Odmiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (uprawa pod włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 ⁰			
Brawo	H	M. Pędziński	3,0	8,0	7,0	9,0	7,8
Szeryf	H	Hortico	3,4	9,0	8,0	9,0	8,0
Śremski	H	PH-N W. Legutko	2,9	8,0	7,3	9,0	7,8
Traper	H	PH-N W. Legutko	2,7	8,3	7,3	8,5	7,5
Mirabelle	H	Monsanto/Seminis	3,6	8,0	7,5	9,0	8,0




Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - plon badanych odmian





Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - struktura plonu ogólnego






Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 ⁰			
Allianz	H	Bejo Zaden	3,0	8,5	7,8	8,8	7,8
Atomic	H	Bejo Zaden	3,3	8,5	7,3	8,8	7,5
Edyp	H	Torseed	3,0	8,3	7,5	8,8	8,3
Lokata	H	PH-N W. Legutko	3,1	8,3	7,3	9,0	7,8
Portal	H	Hortico	3,0	8,0	7,0	8,5	7,5
Szeryf	H	Hortico	3,4	8,5	7,5	9,0	7,8
Śremski	H	PH-N W. Legutko	3,0	8,0	6,8	8,3	7,5
Tarot	H	Hortico	2,8	8,3	7,0	9,0	8,5
Traper	H	PH-N W. Legutko	2,7	7,8	7,3	8,5	7,3
Zefir	H	Hortico	2,9	8,3	7,8	9,0	8,0
Nadusha	H	Monsanto/Seminis	2,9	8,5	7,5	8,5	7,5




Odmiiany konserwowe partenokarpiczne - plon badanych odmian





Odmiiany konserwowe partenokarpiczne - struktura plonu ogólnego



■ udział owoców konserwowych

■ udział owoców za grubych

■ udział owoców za długich

■ udział owoców niekształtnych



Odmiany konserwowe partenokarpiczne - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Zlecający badania	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
			kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
			I termin	II termin	I termin	II termin
			skala 9 ⁰			
Atik	Bejo Zaden	3,4	8,5	8,3	8,8	8,3
Brawo	M. Pędziński	3,2	8,5	7,5	8,8	7,8



www.coboru.pl

k.bartoszak@coboru.pl