



FASOLA

ODMIANY SZPARAGOWE

badania w systemie PDO
ZDOO CZESŁAWICE

rok zbioru 2015




WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

Odmiana	Pochodzenie nasion	Plon handlowy strąków dt z ha	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
Arkana	Spójnia Nochowo	90	88	12,2	15,0	69
Eliza	Spójnia Nochowo	75	87	11,2	16,2	69
Malwina	Polan Kraków	93	86	12,4	12,6	69
SV1286GW	Monsanto / Seminis	93	88	10,8	13,6	69
SV1541GA	Monsanto / Seminis	102	88	12,0	14,2	69
SV1545GA	Monsanto / Seminis	91	87	11,1	16,0	69
Erla	Polan Kraków	81	79	9,8	16,2	64/70
SV1003GF	Monsanto / Seminis	97	92	11,5	11,4	64/70

Odmiany Erla i SV1003GF mające żółte strąki, były zbierane dwukrotnie (po 64 i 70 dniach wegetacji); pozostałe odmiany, które mają strąki zielone - były zbierane jednorazowo.



PLON OGÓLNY I PLON HANDLOWY (dt z ha)





UDZIAŁ W PLONIE NAJLICZNIEJSZYCH FRAKCJI STRĄKÓW (wg średnicy)

