


# Wyniki doświadczeń z odmianami ogórka badanymi w systemie PDO w roku 2016




SDOO w Przecławiu

# Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - plon badanych odmian



# Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - struktura plonu ogólnego



■ udział owoców niekształtnych

■ udział owoców za grubych

■ udział owoców za długich (> 8cm)

■ udział owoców konserwowych (6-8 cm)

W doświadczeniu nie wystąpiły owoce chore i żółknące

# Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów) - ważniejsze cechy użytkowe


Odmiana	Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
			kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
			I termin	II termin	I termin	II termin
			skala 9 <sup>0</sup>			
Brawo	H PH-N W. Legutko	3,4	6,5	4,8	8,5	7,5
Bursztyn	H SPÓJNIA Nochowo	3,8	6,3	5,0	9,0	8,0
Lazuryt	H SPÓJNIA Nochowo	3,6	6,0	4,3	8,8	7,5
Orfeus	H PNOS Ożarów Maz. / Moravoseed	3,4	6,5	4,5	8,8	7,8
Śremski	H PH-N W. Legutko	3,5	7,0	5,0	8,8	8,0
Mirabelle	H Monsanto/Seminis	3,6	7,0	5,0	8,5	7,8
Monisia	H Monsanto/Seminis	3,7	6,5	4,5	8,8	8,0

# Odmiiany konserwowe w uprawie przyspieszonej (okrycie włókniną od siewu do pierwszych zbiorów)


- ocena sensoryczna kwaszonych owoców po 1 i 3 miesiącach od zakwaszenia
- wybrane cechy

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Smak owoców		Konsystencja owoców		Ogólna ocena sensoryczna	
			1 miesiąc	3 miesiące	1 miesiąc	3 miesiące	1 miesiąc	3 miesiące
Brawo	H	PH-N W. Legutko	4,1	3,4	4,9	4,3	4,3	3,9
Lazuryt	H	SPÓJNIA Nochowo	4,1	3,6	4,2	4,0	4,2	3,8
Śremski	H	PH-N W. Legutko	4,7	4,0	4,3	4,6	4,4	4,4
Mirabelle	H	Monsanto/Seminis	4,8	4,6	4,4	4,6	4,5	4,4
Monisia	H	Monsanto/Seminis	4,1	2,8	4,7	4,1	4,2	3,6

# Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - plon badanych odmian



# Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - struktura plonu ogólnego



W doświadczeniu nie wystąpiły owoce chore i żółknące

# Odmiany konserwowe grubobrodawkowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 <sup>0</sup>			
Avatar	H	SPÓJNIA Nochowo	3,5	6,3	4,5	7,0	5,0
Skaner	H	M. Pędziński	3,4	7,0	4,8	7,3	4,8
Śremski	H	PH-N W. Legutko	3,6	6,8	5,0	6,0	4,0
Atlantis	H	Bejo Zaden	4,0	6,8	4,5	6,8	4,3



# Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe

- ocena sensoryczna kwaszonych owoców po 1 i 3 miesiącach od zakwaszenia
- wybrane cechy

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Smak owoców		Konsystencja owoców		Ogólna ocena sensoryczna	
			1 miesiąc	3 miesiące	1 miesiąc	3 miesiące	1 miesiąc	3 miesiące
Skaner	H	M. Pędziński	5,0	3,6	5,0	4,1	5,0	4,0
Śremski	H	PH-N W. Legutko	4,4	4,1	4,8	4,1	4,5	4,4
Atlantis	H	Bejo Zaden	3,7	4,2	4,4	4,9	4,1	4,6