


Wyniki doświadczeń z odmianami fasoli szparagowej badanymi w systemie PDO w roku 2019

ZDOO Czesławice


Plon ogólny i plon handlowy strąków (dt z ha)



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

Udział w plonie poszczególnych frakcji plonu

(wg średnicy w mm)



- nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania
- odmiany Grinstar (zielonostrąkowa), Mamutina, Maxigold (żółtostrąkowa) to odmiany o szerokich strąkach

Ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Pochodzenie nasion	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
Helena	POLAN	74,5	11,4	21,2	75
FZ 2/19 *		69,1	10,5	18,6	73
FZ 3/19 *		73,0	10,6	14,6	68
FZ 4/19 *		70,3	10,4	18,0	68
FZ 5/19 *		66,3	11,3	15,8	70
FZ 6/19 *		69,5	10,2	17,8	73
Grinstar	SPÓJNIA	73,0	16,4	14,5	66 / 75
Mamutina	POLAN	64,3	14,8	12,6	70 / 77
Maxigold	SPÓJNIA	78,8	18,9	12,2	66 / 75

**- nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania; odmiany Mamutina i Maxigold mające żółte strąki, były zbierane dwukrotnie (odpowiednio po 70 i 77 dniach oraz po 66 i 75 dniach wegetacji; odmiana Grinstar to odmiana zielonostrąkowa o płaskich i szerokich strąkach, była zbierana dwukrotnie po 66 i 75 dniach; pozostałe odmiany, które mają strąki zielone - były zbierane jednorazowo.*

