

**WYNIKI POREJESTROWYCH
DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
ZA LATA 2018 - 2020**

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKI
POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
IZBA ROLNICZA W OPOLU
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN
UPRAWNYCH
STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN
W GŁUBCZYCACH

**WYNIKI POREJESTROWYCH
DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM**

ZBOŻA OZIME I JARE, RZEPAK OZIMY I JARY, KUKURYDZA
BURAK CUKROWY, ZIEMNIAK, BOBIK, GROCH, SOJA

2018 – 2020

**GŁUBCZYCE
2021**

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKI POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

Przewodniczący : *dr inż. Kazimierz Pyziak*
Wiceprzewodniczący: *dr inż. Krzysztof Gawęcki*
dr inż. Agnieszka Krawczyk
Sekretarz : *mgr inż. Jolanta Głogowska*

Opracowanie : *dr Marta Bednarczyk*
mgr inż. Jolanta Głogowska
mgr inż. Michał Kręgielewski
inż. Wojciech Żłobicki

Redakcja merytoryczna: *dr inż. Kazimierz Pyziak*

Publikacja chroniona prawem autorskim

Przedruk dozwolony tylko po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zespołu Wojewódzkiego PDO

Jednostka wiodąca: *Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach
ul. Kolejowa 5
48-100 Głubczyce
tel./fax. 77 485-26-94
e-mail: sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl*

p.o. Dyrektora: *dr Marta Bednarczyk*

Skład i druk:



OUTDOOR Agencja Reklamy
Damian Kmiecik
ul. Żołnierzy I Armii WP 2A
48-100 Głubczyce
tel. 792 210 069
e-mail: uslugireklamowe@poczta.fm

SPIS TREŚCI

I. SKŁAD ZESPOŁU WOJEWÓDZKIEGO POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO	6
II. WPROWADZENIE	7
III. PRZEBIEG POGODY I JEJ WPŁYW NA PLONY I ICH JAKOŚĆ	9
IV. WYNIKI DOŚWIADCZEŃ	14
1. PSZENICA OZIMA .	14
Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu	14
Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu.	14
Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych.	29
Przedplon pszenica ozima, opóźniony termin siewu	??
Przedplon soja, optymalny termin siewu	??
Przedplon soja, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu.	36
Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu	39
Przedplon burak cukrowy, optymalny termin siewu	43
Porównanie plonowania odmian w różnych wariantach agrotechnicznych	46
2. JĘCZMIEŃ OZIMY	51
3. PSZENŻYTO OZIME	56
4. ŻYTO OZIME	60
5. PSZENICA JARA	64
6. JĘCZMIEŃ JARY	69
7. OWIES	74
8. RZEPAK OZIMY	78
9. RZEPAK JARY	86
10. KUKURYDZA	89
11. BURAK CUKROWY	95
12. ZIEMNIAK	99
13. BOBIK	108
14. GROCH	113
15. SOJA	118
V. DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE ODMIAN Z KATALOGU UE (CCA)	135
1. PSZENICA OZIMA	135
2. RZEPAK OZIMY	137
VI. SPIS TABEL	139

SKŁAD ZESPOŁU WOJEWÓDZKIEGO POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

Lp.	Nazwisko i Imię	Instytucja	Stanowisko
1	dr inż. Pyziak Kazimierz przewodniczący	Ekspert, były dyrektor SDOO Głubczyce	emeryt
2	dr inż. Gawęcki Krzysztof z-ca przewodniczącego	Grupa Świerkot	dyrektor zarządzający
3	dr inż. Krawczyk Agnieszka z-ca przewodniczącego	Grupa Azoty SA	menager
4	dr inż. Bandurowski Ryszard	SPIC in Agriculture	właściciel
5	dr Bednarczyk Marta	SDOO Głubczyce	dyrektor
6	mgr Beleć Katarzyna	Opolska Izba Rolnicza	dyrektor biura
7	dr inż. Biliński Zdzisław	HR Smolice O/Bąków	dyrektor
8	mgr inż. Bochniak Krzysztof	Gospodarstwo Rolno-Nasienne "Pagro" Sp. z o.o.	dyrektor, członek zarządu
9	mgr inż. Chmielniak Grzegorz	FMC Agro	przedstawiciel handlowy
10	dr inż. Chudziński Błażej	ADOB Sp. z o.o. Sp.k.	dyrektor ds. sprzedaży
11	mgr inż. Dawidowicz Andrzej	Saaten-Union Polska Sp. z o.o.	przedstawiciel regionalny
12	mgr inż. Fink-Podyma Emilia	Saatbau Polska Sp. z o.o.	menager
13	mgr inż. Froelich Marek	Opolska Izba Rolnicza	prezes
14	dr inż. Grocholski Jarosław	Arenda Sp. z o.o.	v-ce prezes
15	mgr inż. Hoffmann Marcin	KWS Lochow Polska Sp. z o.o.	przedstawiciel regionalny
16	mgr inż. Jarosz Adam	KWS Polska Sp. z o.o.	regionalny kierownik sprzedaży
17	Jędrysek Krzysztof	Gospodarstwo Rolne Kozłówek	właściciel
18	mgr inż. Kamola Jakub	Limagrain Central Europe	przedstawiciel handlowy
19	dr inż. Kik Izabela	WIORIN	wojewódzki inspektor
20	mgr inż. Konopka Antoni	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	członek zarządu Województwa Opolskiego
21	mgr Kowalski Łukasz	OODR Łosiów	główny specjalista
22	mgr inż. Krechowicki Łukasz	Top Farms Głubczyce Sp. z o.o.	prezes
23	mgr inż. Kryniewski Wiesław	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24	mgr inż. Kuraś Katarzyna	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	kierownik Referatu Rolnictwa i Łowiectwa w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
25	mgr inż. Łuczak Elżbieta	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	inspektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
26	inż. Magdziak Grzegorz	Danko Hodowla Roślin	przedstawiciel regionalny
27	dr inż. Markowicz Marcin	Top Farms Głubczyce Sp. z o.o.	dyrektor ds. produkcji roślinnej
28	mgr inż. Miśkiewicz Tomasz	Poznańska Hodowla Roślin	regionalny kierownik sprzedaży
29	mgr inż. Niewęglowski Adam	Osadkowski SA	kierownik działu nasion zbóż
30	mgr inż. Oblicki Marek	Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.	dyrektor ds. produkcji roślinnej
31	mgr inż. Olejnik Mariusz	Opolski Związek Producentów Rolnych	prezes
32	mgr inż. Orłowska-Job Wanda	HR Strzelce	z-ca kierownika działu hodowli
33	inż. Pohl Rafał	Gospodarstwo Rolne Konrad Pohl	właściciel
34	mgr inż. Rakoczy Stanisław	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	członek zarządu Województwa Opolskiego
35	mgr inż. Skórka Adam	COBORU	inspektor oceny odmian
36	mgr inż. Skórzyński Jerzy	Chempest SA	przedstawiciel regionalny
37	Staniczek Hubert	HZ Zamarte o/Stare Olesno	kierownik oddziału Stare Olesno
38	mgr inż. Strycharz Robert	Syngenta Polska Sp. z o.o.	przedstawiciel regionalny
39	mgr inż. Śmiałek Ewa	Ekspert, były inspektor oceny odmian	emeryt
40	inż. Trzórzewski Henryk	Opolski Związek Rewizyjny RSP	prezes
41	dr inż. Wiśniewska Małgorzata	Małopolska Hodowla Roślin	hodowca
42	mgr inż. Zamojski Henryk	Ekspert, były dyrektor OODR w Łosiewie	emeryt

II

WPROWADZENIE

W imieniu Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, przekazujemy w Państwa ręce kolejną edycję Biuletynu pt. "Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w woj. opolskim 2018-2020".

Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Polsce funkcjonuje nieprzerwalnie od ponad dwudziestu lat. W realizacji programu PDO współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem polskiego rolnictwa poprzez wdrażanie do praktyki rolniczej szerokokorozumianego postępu hodowlanego i agrotechnicznego.

Podstawy prawne funkcjonowania PDO w Polsce określają następujące akty prawne:

- Ustawa z dn. 9 listopada 2012r. o nasiennictwie;
- Ustawa z dn. 25 listopada 2010r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Zgodnie z Ustawą koordynacją systemu PDO na szczeblu centralnym zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw, Izbami Rolniczymi i innymi partnerami, a najważniejsze ustalenia zapadają podczas posiedzeń Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, w skład którego wchodzi przedstawiciele środowiska rolniczego: firm, instytucji, producentów rolnych, hodowców, świata nauki.

Na poziomie województwa opolskiego funkcjonuje Zespół Wojewódzki PDO (WZ PDO), zaś podmiotem koordynującym Program jest Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach (SDOO), jako Oddział Terenowy COBORU.

Podstawowym celem badań w systemie PDO jest dostarczenie rolnictwu obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian, przedstawienie reakcji odmian na różne warunki glebowo-klimatyczne danego regionu, wskazanie opłacalności intensyfikacji produkcji (porównanie dwóch poziomów agrotechnicznych), a także wykrzystanie postępu biologicznego, którego nośnikami są nowe odmiany, między innymi poprzez ustalenie List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa.

Niniejsza publikacja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, głównie do użytkowników odmian, przede wszystkim rolników i producentów rolnych, przedsiębiorstw i instytucji nasiennych a także przemysłu przetwórczego. Informacje zawarte w tym opracowaniu powinny być pomocne także instytucjom zajmującym się upowszechnianiem postępu odmianowego. Analiza informacji zamieszczonych w opracowaniu z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie właściwego wyboru najbardziej wartościowych odmian przydatnych dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w różnych warunkach glebowych, klimatycznych i ekonomicznych.

W roku 2020 na terenie województwa opolskiego Program realizowano w pięciu lokalizacjach: SDOO Głubczyce, OODR Łosiów, GRN „Pagro” Pąków, HR Smolice O/Bąków oraz HZ Zamarte O/ Stare Olesno.

Lokalizacja doświadczeń nie jest przypadkowa, odzwierciedla ona przekrój warunków glebowych i klimatycznych naszego województwa. Uzyskiwane wyniki z doświadczeń i przygotowana na ich bazie rekomendacja odmian może stanowić podstawę decyzji o wyborze odmian dla producentów rolnych z terenu całego województwa.

Program PDO w sezonie wegetacyjnym 2019-2020 obejmował w województwie opolskim

57 doświadczeń w 15 gatunkach roślin uprawnych:

Tab.1. Realizacja doświadczeń PDO w województwie opolskim w sezonie 2019/2020

Gatunek	Rodzaj Doświadczenia	Lokalizacja	Liczba badanych odmian	Liczba poziomów agrotechnicznych	Liczba powtórzeń
Pszenica ozima	L	SDOO Głubczyce	52	2	2
	K	HR Bąków	44	2	2
	K	OODR Łosiów	44	2	2
	K	PAGRO Pągów	44	2	2
	S (po pszenicy ozimej)	SDOO Głubczyce	44	1	3
		OODR Łosiów	44	1	3
	S (po kukurydzy)	PAGRO Pągów	44	1	3
	S (po buraku cukrowym)	SDOO Głubczyce	44	1	3
	S (obniżona obsada, po rzepaku ozimym)	SDOO Głubczyce	12	1	3
		HR Bąków	12	1	3
		PAGRO Pągów	12	1	3
	S (różne formy nawozów azotowych)	SDOO Głubczyce	12	1	3
	S (po soi, zmniejszone nawożenie)	SDOO Głubczyce	12	1	3
Jęczmień ozimy	L	SDOO Głubczyce	18	2	2
	K	HR Bąków	16	2	2
	K	OODR Łosiów	16	2	2
	K	PAGRO Pągów	16	2	2
Pszenżyto ozime	L	SDOO Głubczyce	23	2	2
	K	OODR Łosiów	19	2	2
	K	PAGRO Pągów	19	2	2
	K	HR Bąków	19	2	2
Żyto ozime	L	SDOO Głubczyce	31	2	2
	K	OODR Łosiów	17	2	2
	K	HR Bąków	17	2	2
	K	PAGRO Pągów	17	2	2
Pszenica jara	L	SDOO Głubczyce	23	2	2
	K	HR Bąków	20	2	2
	K	OODR Łosiów	20	2	2
	K	PAGRO Pągów	20	2	2
Jęczmień jary	L	SDOO Głubczyce	37	2	2
	K	HR Bąków	26	2	2
	K	PAGRO Pągów	26	2	2
Owies	Z	SDOO Głubczyce	24	1	3
	M	HR Bąków	14	1	3
	M	OODR Łosiów	14	1	3
Rzepak ozimy	M	OODR Łosiów	37	1	3
	Z	SDOO Głubczyce	57	1	3
	Z	PAGRO Pągów	57	1	3
	Z	HR Bąków	57	1	3
Rzepak jary	G	SDOO Głubczyce	25	1	3
Kukurydza	Z (wczesna)	SDOO Głubczyce	21	1	3
	Z (średniowczesna)	SDOO Głubczyce	22	1	3
	Z (średniopóźna i późna)	SDOO Głubczyce	9	1	3
Burak cukrowy	Z	SDOO Głubczyce	18	1	4
Ziemniak	G (bardzo wczesny)	Stare Olesno	7	1	3
	G (bardzo wczesny)	Stare Olesno	8	1	3
	G (wczesny)	Stare Olesno	10	1	3
	G (średniowczesny, średniopóźny i późny)	Stare Olesno	9	1	3
Bobik	Z	SDOO Głubczyce	11	1	3
	G	PAGRO Pągów	11	1	3
Groch	Z	SDOO Głubczyce	21	1	3
	G	PAGRO Pągów	21	1	3
Soja	S (gęstość siewu)	SDOO Głubczyce	9	3	3
		OODR Łosiów	9	3	3
	G	SDOO Głubczyce	56	1	3
	M	OODR Łosiów	34	1	3
	M	PAGRO Pągów	34	1	3

W imieniu Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego słowa podziękowania kieruję do Zarządu Województwa Opolskiego i Zarządu Opolskiej Izby Rolniczej oraz gospodarstw zrzeszonych w Opolskim Związku Producentów Rolnych i Opolskim Związku Rewizyjnym RSP za ogromne wsparcie finansowe i zaangażowanie w prace OZ PDO. Dziękuję podmiotom realizującym doświadczenia w ramach programu PDO: Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Hodowli Roślin Smolice o/ Bąków, Hodowli Ziemiaka Zamarte o/ Stare Olesno oraz GR „Pagro” w Pągowie oraz wszystkim, którzy finansowo, merytorycznie lub w jakikolwiek inny sposób włączyli się w realizację, doskonalenie i upowszechnianie systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

*Marta Bednarczyk
p.o. dyrektora SDOO w Głubczycach*

III

PRZEBIEG POGODY I JEJ WPŁYW NA PLONY I ICH JAKOŚĆ

Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody oraz znacznym zróżnicowaniem przebiegu pór roku w następujących po sobie latach.

Wyniki doświadczeń PDO, na podstawie doświadczeń odmianowych i agrotechnicznych służą rolnictwu do podejmowania bardziej właściwych decyzji doboru odmian do pogarszających się warunków pogodowych.

Przebieg warunków atmosferycznych w analizowanych trzech punktach doświadczalnych (Głubczyce, Łosiów, Stare Olesno) w sezonie 2019-2020 był dość zróżnicowany. Średnia roczna temperatura powietrza w 2020 roku była wyższa niż w ostatnim dziesięcioleciu o 0,6°C w Głubczycach i Łosiowie, i aż o 1,8°C w Starym Oleśnie. Suma opadów w tym okresie była wyższa o 226,1 mm w Głubczycach, 135,8 mm w Starym Oleśnie i aż o 337,5 mm w Łosiowie. W 2020 roku szczególnie ciepły był początek, gdzie temperatura w styczniu - zazwyczaj najzimniejszym miesiącu w roku była wyższa od średniej wieloletniej średnio o 3,0°C do 3,9°C, a w lutym aż o 4,2°C do 4,9°C. Z kolei szczególnie zimny był maj ze średnią temperaturą powietrza oscylującą w granicach 11,0°C – 13,2°C, niższą o 1,1 oC do 2,3°C w stosunku do średniej z wielolecia.

W okresie wegetacji (kwiecień – październik) 2020 roku temperatura powietrza była niższa o 0,2°C w Głubczycach, 1,4°C w Łosiowie, natomiast w Starym Oleśnie aż o 1,4°C wyższa. W stosunku do wielolecia wyraźnie cieplej było we wrześniu i październiku. W pozostałych miesiącach temperatury powietrza były zróżnicowane. Suma opadów w tym czasie była wyższa aż o 229,5 mm w Głubczycach, 277,4 mm w Łosiowie i 166,0 mm w Starym Oleśnie. Największą sumę opadów odnotowano w miesiącach czerwcu, wrześniu i październiku.

Jesień 2019 roku cechowały korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin. Ciepło, szczególnie w październiku, przy niższej ilości opadów niż w wieloleciu sprzyjały przebiegowi wegetacji rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Zima łagodna, już w III dekadzie lutego rozpoczęło się ruszenie wegetacji, warunki pozwoliły na wczesny siew roślin jarych.

Początek sezonu wegetacyjnego 2020 roku (kwiecień) pod względem temperatury powietrza był zbliżony do średniej z wielolecia, z wyjątkiem Starego Olesna, gdzie było wyraźnie cieplej. W tym miesiącu wystąpiła wyraźna susza we wszystkich miejscowościach, co nie sprzyjało początkowemu rozwojowi roślin jarych. W maju było chłodniej, występowały przymrozki przygruntowe i odnotowano niższą ilość opadów, co ogólnie nie sprzyjało przebiegowi wegetacji wszystkich roślin uprawnych. Czerwiec charakteryzował się bardzo dużą ilością opadów, przy temperaturze powietrza zbliżonej do wielolecia. Warunki te sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych, lecz wpłynęły korzystnie na wzrost i rozwój roślin. Występujące lokalnie ulewne opady deszczu połączone z burzami i silnymi wiatrami spowodowały nadmierne uwilgotnienie gleby oraz wyleganie zbóż i roślin bobowatych, co wpłynęło na powstanie strat, zwłaszcza w jęczmieniu i grochu.

W lipcu i sierpniu notowano zbliżone do wielolecia temperatury powietrza, z dużym zróżnicowaniem opadów

w miejscowościach. Mniej opadów odnotowano w Starym Oleśnie w lipcu, a bardzo dużo w Łosiowie w sierpniu. Wrzesień i październik cechowały się wyższą niż w wieloleciu temperaturą powietrza i bardzo dużą, szczególnie w październiku ilością opadów. Miało to wyraźny wpływ na opóźnienie i utrudnienie zbiorów, zwłaszcza soi oraz zakładanie doświadczeń z rzepakiem ozimym i zbożami ozimymi.

Szczegółowe dane i porównanie warunków przedstawiają poniższe tabele i wykresy



Tab. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w punktach doświadczalnych województwa opolskiego w roku 2020 i w wieloleciu (°C).

Miesiąc	SDOO Głubczyce		OODR Łosiów		HZ Zamarte O/Stare Olesno	
	2020	2010-2019	2020	2010-2019	2020	2010-2019
I	1,4	-2,2	2,2	-0,8	2,6	-1,3
II	4,6	0,0	4,9	0,7	4,6	-0,3
III	5,0	4,4	5,4	4,7	6,4	3,9
IV	8,5	8,5	10,2	10,1	11,8	9,8
V	11,0	13,2	12,0	14,3	13,2	14,3
VI	16,9	17,7	18,0	18,6	18,7	17,8
VII	18,2	19,5	19,3	20,5	20,9	20,0
VIII	19,8	19,5	20,8	20,3	22,6	19,8
IX	15,4	14,1	16,3	15,2	16,6	14,4
X	10,3	9,2	10,9	10,0	11,7	9,5
XI	4,8	5,4	5,9	5,8	5,9	5,3
XII	1,7	1,1	2,6	1,8	3,7	3,1
Średnia	9,8	9,2	10,7	10,1	11,5	9,7
Średnia IV-X	14,3	14,5	14,2	15,6	16,5	15,1


Tab. 3. Sumy miesięczne opadów w punktach doświadczalnych województwa opolskiego w roku 2020 i w wieloleciu (mm).

Miesiąc	SDOO Głubczyce		OODR Łosiów		HZ Zamarte O/Stare Olesno	
	2020	2010-2019	2020	2010-2019	2020	2010-2019
I	16,5	40,1	10,3	34,6	25,8	52,1
II	39,8	28,7	78,6	25,2	79,8	29,2
III	37,8	29,2	29,9	32,0	22,5	38,7
IV	7,5	50,4	7,9	40,7	8,2	40,6
V	66,7	89,4	58,9	72,5	67,1	84,7
VI	195,7	78,1	198,1	71,1	200,0	74,6
VII	87,9	105,9	77,1	86,4	46,2	91,8
VIII	88,6	63,1	111,9	53,2	64,7	55,3
IX	126,0	63,0	100,9	58,1	105,1	65,2
X	156,8	49,8	179,5	41,0	135,6	48,7
XI	37,2	32,4	30,8	34,0	22,2	39,8
XII	21,2	25,5	33,6	31,3	21,9	42,6
Suma	881,7	655,6	917,5	580,0	799,1	663,3
Suma IV-X	729,2	499,7	734,3	456,9	626,9	460,9


Wykresy przedstawiające przebieg warunków wilgotnościowo-termicznych
w Głubczycach w sezonie 2019/2020 w stosunku do wielolecia




Miesięczne temperatury - monthly temperature (°C)



Suma opadów - cumulative rainfall (mm)





IV

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

1. PSZENICA OZIMA

Pszenica ozima jest najważniejszą rośliną uprawianą w Polsce i w województwie opolskim również. Doceniając jej znaczenie w naszym województwie, od kilkunastu lat obok doświadczeń strictly odmianowych, zakładanych po rzepaku ozimym kontynuuje się badania z plonowaniem odmian pszenicy wysiewanej po różnych przedplonach: pszenicy ozimej, kukurydzy uprawianej na ziarno, soi oraz buraku cukrowym. Zestaw odmian był taki sam we wszystkich doświadczeniach. W roku 2018 założone zostały doświadczenia z obniżoną gęstością siewu 200 sztuk/m² po przedplonie rzepak ozimy w Głubczycach, Bąkowie i Pągowie oraz z nawożeniem azotowym w formie RSM i saletry amonowej po przedplonie rzepak ozimy i obniżonym nawożeniu po przedplonie soja w Głubczycach.

PRZEDPLON RZEPAK OZIMY, OPTIMALNY TERMIN SIEWU

Doświadczenia wykonano w: Głubczycach, Bąkowie, Łosiowie i w Pągowie. Pszenicę wysiano w optymalnym terminie siewu po rzepaku ozimym. Łącznie w doborze wojewódzkim było 44 odmian, w tym 14, które znajdują się na Liście Odmian Zalecanych. Dobór odmian co roku ulega zmianom z powodu nowych rejestracji i wykreślenia słabszych odmian z Krajowego Rejestru i doboru wojewódzkiego. W Głubczycach w doborze poszerzonym występowało 52 odmiany. Doświadczenia prowadzone były na dwóch poziomach agrotechniki:

1. przeciętny – a1

2. intensywny – a2, na którym zastosowano: wyższe o 40 kg N/ha nawożenie azotem, zwalczanie chorób grzybowych i szkodników, opryskiwanie regulatorami wzrostu i doliczne dokarmianie mikronawozami.

Doświadczenia zakładano w 2 powtórzeniach. W trakcie wegetacji na obydwóch poziomach agrotechniki oceniano: wyleganie, stan roślin w różnych fazach rozwojowych w skali 9°. Wykonano pomiary wysokości roślin (cm), ocenę porażenia przez pleśń śniegową oraz określono procent martwych roślin po zimie. Na poziomie a1 dokonano bonitacji porażenia roślin przez najważniejsze choroby grzybowe. Po zbiorach oceniano wilgotność i mtz oraz analizy jakościowe. Plony ziarna przeliczono na 14% wilgotności. Informacja ta dotyczy wszystkich gatunków zbóż. W tabelach wynikowych wzorzec stanowi średni plon dla wszystkich badanych odmian. Plony odmian podano w procentach wzorca. Ogólne informacje i wyniki doświadczeń zawarto w poniższych tabelach.

Średni plon ziarna badanych odmian w 3-leciu wynosił 82,2 dt/ha na przeciętnym i 94,7 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechniki. Do wyróżniających się odmian w województwie należały Artist, Formacja, RGT Bilanz oraz Plejada, KWS Donovan, RGT Specjalist na poziomie a1 oraz Artist, Arkadia, Linus oraz Plejada, KWS Donovan i Opoka na poziomie a2 (wszystkie z Listy Odmian Zalecanych). Wyższe przyrosty plonu ziarna na intensywnym poziomie agrotechniki uzyskano na najlepszych glebach (w Głubczycach i Pągowie). W 3-leciu plony wahały się od 75,3 dt/ha w Bąkowie do 92,7 dt/ha w Głubczycach na przeciętnym i od 84,6 dt/ha w Bąkowie do 111,1 dt/ha w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki. Na poszerzonym doborze w Głubczycach najlepiej plonowały odmiany Frisky, RGT Kilimanjaro, Rivero i Sikorka. Badane odmiany reagowały średnio obniżeniem wzrostu i wylegania roślin na intensywnym poziomie agrotechniki. W większym nasileniu z chorób grzybowych na przeciętnym poziomie agrotechniki wystąpiły mączniak właściwy, septorioza liści, fuzarioza i septorioza kłosów.

Intensyfikacja agrotechniki miała średnio pozytywny wpływ na zwiększenie gęstości ziarna, zawartości białka i ilości glutenu oraz wskaźnika sedymentacji. Nie stwierdzono żadnego wpływu na liczbę opadania.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajduje się 14 odmian:

ARKADIA, ARTIST, FORMACJA, KWS DAKOTANA, LINUS, MEDALISTKA, OWACJA, PLEJADA, RGT BILANZ, RGT KILIMANJARO oraz KWS DONOVAN, OPOKA, RGT SPECJALIST i VENECJA wstępnie.

Tab. 4. Pšenica ozima. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głęboczyce		Bąków		Łosów		Pąków	
Powiat		Głęboczyce		Kluczbork		Brzeg		Namysłów	
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1		3		2		2	
Klasa bonitacyjna gleby		II		IV a		III b		III a	
pH gleby w KCl		6,5		6,4		6,7		6,6	
Przedplon				Rzepak ozimy					
Data siewu (dzień, m-c)		11.10		26.09		15.10		28.09	
Obsada roślin $a_1 + a_2$ (szt./m ²)		400		450		400		400	
Data zbioru (dzień, m-c)		09.08		27.07		25.07		07.08	
N na poziomie a_1 (kg/ha)		105		105		90		104	
N na poziomie a_2 (kg/ha)		148		145		130		144	
P_2O_5 (kg/ha)		46		40		-		27	
K_2O (kg/ha)		90		60		-		65	
Nawożenie dolistne na poziomie a_2 (kg./l/ha)		MgSO ₄ – 5 + ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 6-12-6 – 5 MgSO ₄ – 5 ADOB Fe – 0,1		MgSO ₄ – 5 + ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 6-12-6 – 5 MgSO ₄ – 5		MgSO ₄ – 5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Mn – 3 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 36 Extra – 5 MgSO ₄ – 5		Plonvit – 2 + Nitromag – 4 + ADOB Bor – 0,15	
Zaprawa nasienna				Gizmo 060 FS					
Herbicydy (g./l/ha)		Boxer Evo EC – 1,5 + Bizon – 1 + Glean 75 WG – 9 Granstar SX 50 SG - 25 + Trend 90 EC – 0,1		Bizon – 1		Maraton 375 SC – 4		Komplet 560 SC – 0,5 + Glean 75 WG – 5	
Insektycydy (g, kg, l/ha)		Insodex 480 EC – 0,2 Danadim 400 EC – 0,5 Los Ovados 200 SE – 0,2 + Cyperkill Max 500 EC – 0,05 Capalo 337,5 SE – 0,8 + Atak 450 EC – 0,4 + Halny 200 EC – 0,1 + Tern 750 EC – 0,1		Inazuma 130 WG – 0,15 Karate Zeon 050 CS – 0,12		Delmetros 100 EC 0,05 Delux 050 CS – 0,1		Sparviero – 0,05 Inzuma 130 WG – 0,15	
Fungicydy – pierwszy zabieg na poziomie a_2 (l/ha)		Capalo 337,5 SE – 0,8 + Atak 450 EC – 0,4 + Halny 200 EC – 0,1 + Tern 750 EC – 0,1		Capalo 337,5 EC – 1,5		Capalo 337,5 EC – 1,5		Capalo 337,5 EC – 1,5	
Fungicydy – drugi zabieg na poziomie a_2 (l/ha)		Plexeo 60 EC – 0,3 + Priaxor – 0,75		Adexar Plus – 2		Adexar Plus – 2		-	
Fungicydy – trzeci zabieg na poziomie a_2 (l/ha)		Plexeo 60 EC – 0,3 + Bukat 500 SC – 0,3		Bukat 500 SC – 0,5		Amistar 250 SC – 1		-	
Regulatory wzrostu na poziomie a_2 (l/ha)		Moddus 250 EC – 0,2 + Stabilan 750 SL – 0,7 Medax Max – 0,33		Moddus 250 EC – 0,2 + Stabilan 750 SL – 0,8 Moddus 250 EC – 0,2		Moddus 250 EC – 0,2 + Stabilan 750 SL – 0,8 Moddus 250 EC – 0,2		Medax Max – 0,7	

Tab. 5. Pszenica ozima. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Klasa jakości	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej – pełnomocnika w Polsce
1	Artist	2013	2016	DE	B	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
2	Formacja	2017	2021	PL	A	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. - Tulce
3	RGT Kilimanjaro	2014	2017	FR	A	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
4	Venecja	2019	2021 w	PL	B	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
5	Arkadia	2011	2012	PL	A	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
6	Linus	2011	2012	FR	A	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
7	Patras	2012		DE	A	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
8	Franz	2014		DE	A	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
9	Hondia	2014		PL	A	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
10	KWS Dakotana	2014	2016	DE	A	KWS Lochow Polska sp. z o.o. - Kondratowice
11	Belissa	2014		PL	B	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" - Kobylin
12	Pokusa	2015		PL	B	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
13	Bonanza	2016		DE	B	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
14	Hybery F ₁	2016		FR	B	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
15	LG Jutta	2016		FR	B	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Poznań
16	Medalistka	2016	2020	PL	B	Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. - Kraków
17	KWS Spencer	2017		DE	A	KWS Lochow Polska sp. z o.o. - Kondratowice
18	KWS Firebird	2017		DE	A	KWS Lochow Polska sp. z o.o. - Kondratowice
19	RGT Metronom	2017		FR	A	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
20	RGT Bilanz	2017	2020	FR	B	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
21	Tytanika	2017		PL	B	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
22	Owacja	2017	2020	PL	B	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
23	Apostel	2018		DE	A	IGP Polska sp. z o.o. sp. k. - Poznań
24	Comandor	2018		PL	A	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
25	Euforia	2018		PL	A	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" - Kobylin
26	Plejada	2018	2020	PL	B	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
27	Sfera	2018		PL	B	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
28	SY Orofino	2018		DE	B	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
29	Titanus	2018		DE	B	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
30	Sikorka	2018		PL	C	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
31	Lokata	2019		PL	A	Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. - Kraków
32	Admont	2019		DE	B	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
33	Bosporus	2019		DE	B	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
34	Bataja	2019		PL	B	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
35	Lawina	2019		PL	C	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. - Kościan
36	KWS Donovan	2019	2021 w	DE	B	KWS Lochow Polska sp. z o.o. - Kondratowice
37	LG Keramik	2019		FR	B	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Poznań
38	Moschus	2019		DE	A	IGP Polska sp. z o.o. sp. k. - Poznań
39	RGT Specialist	2019	2021 w	FR	B	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
40	Opoka	2019	2021 w	PL	A	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
41	Godnik	2019		DE	C	Strube Polska sp. z o.o. - Wrocław
42	SY Dubaj	2019		DE	A	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
43	SY Yukon	2019		DE	B	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
44	Tonnage	2019		DK	C	Saatbau Polska sp. z o.o. - Środa Śląska

LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiany: Bellisa w latach 2017 – 2020, Bonanza 2019-2020,

Franz 2016–2020, Hondia 2017-2020, LG Jutta 2019-2020, Patras 2014-2020, Pokusa 2019-2020 na LOZ)

w- odmiana zalecana wstępnie; A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna;

F₁- odmiana miweszańcowa

Tab. 6. Pszenica ozima. Zbiorecze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głęboczyce		Baków		Łosiów		Pagów	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
1	Stan roślin przed zimą	9	9	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Stan roślin po zimie	9	9	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
3	Rośliny martwe	0	0	-	-	-	-	0	0
4	Termin kłoszenia	24.05	28.05	25.05	27.05	27.05	29.05	20.05	22.05
5	Termin dojrzałości woskowej	01.07	03.07	-	-	30.06	01.07	-	-
6	Wysokość roślin	102	90	96	90	89	81	104	99
7	Wyleganie roślin w fazie dojrzałości młecznej	8,9	9,0	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Wyleganie roślin przed zbiorem	8,9	9,0	-	-	9,0	9,0	7,6	9,0
9	Porażenie przez choroby	(skala 9°)							
	Mączniak właściwy	6,9	9,0	5,9	9,0	-	-	6,1	9,0
	Septorioza liści	7,0	9,0	5,1	9,0	7,6	9,0	7,5	9,0
	Septorioza kłosów	8,2	9,0	-	-	7,6	9,0	-	-
	Fuzarioza kłosów	8,4	9,0	-	-	6,6	9,0	-	-
	Rdza brunatna liści	8,7	9,0	-	-	8,8	9,0	6,8	9,0
	Brunatna plamistość liści	8,5	9,0	-	-	8,8	9,0	7,3	9,0
	Choroby podsuszkowe	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-
10	Masa 1000 ziaren	44,4	44,0	49,6	49,8	43,8	44,7	-	-
11	Wilgotność ziarna podczas zbioru	13,8	13,0	12,8	12,5	9,6	9,7	13,7	13,8
12	Plon ziarna	96,3	110,0	82,4	93,8	79,3	85,1	87,1	102,6
		(dt/ha)							

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian, a₁ - przedzięty, a₂ - intensywny poziom agrotechniki

Tab. 7. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na dwóch poziomach agrotechniki. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana		Poziom a ₁					Poziom a ₂				
			2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha		86,3	81,8	78,6	84,0	82,2	97,9	92,8	93,3	95,4	94,7
1	Artist	LOZ	109	107	105	108	107	107	107	112	107	109
2	Formacja	LOZ	110	101	101	105	104	106	99	101	103	102
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	103	103	104	103	103	107	105	104	106	105
4	Venecja	LOZ w	107	-	-	-	-	108	-	-	-	-
5	Arkadia	LOZ	99	101	101	100	100	104	106	107	105	106
6	Linus	LOZ	105	106	95	105	102	101	108	104	105	104
7	Patras		92	104	101	98	99	90	106	104	98	100
8	Franz		96	97	101	96	98	102	102	101	102	102
9	Hondia		94	103	99	98	99	98	94	97	96	96
10	KWS Dakotana	LOZ	102	107	101	104	103	100	105	99	103	101
11	Belissa		96	106	104	101	102	94	104	100	99	99
12	Pokusa		101	101	100	101	101	98	100	101	99	100
13	Bonanza		104	98	106	101	103	105	94	105	100	101
14	Hybery	F ₁	110	98	97	104	102	110	94	99	102	101
15	LG Jutta		98	86	99	92	94	98	87	103	92	96
16	Medalistka	LOZ	104	100	101	102	102	101	97	98	99	99
17	KWS Spencer		97	104	97	101	99	98	101	94	99	98
18	KWS Firebird		90	88	98	89	92	93	91	99	92	94
19	RGT Metronom		96	93	102	94	97	95	94	101	94	97
20	RGT Bilanz	LOZ	98	101	114	100	104	99	102	107	101	103
21	Tytanika		89	89	95	89	91	92	91	89	91	91
22	Owacja	LOZ	101	102	100	102	101	102	104	97	103	101
23	Apostel		97	103	-	100	-	99	106	-	103	-
24	Comandor		97	108	-	103	-	95	106	-	101	-
25	Euforia		101	106	-	104	-	100	105	-	102	-
26	Plejada	LOZ	104	113	-	108	-	99	109	-	104	-
27	Sfera		98	92	-	95	-	99	94	-	96	-
28	SY Orofino		95	103	-	99	-	98	100	-	99	-
29	Titanus		98	100	-	99	-	98	100	-	99	-
30	Sikorka		100	99	-	99	-	102	101	-	102	-
31	Lokata		90	-	-	-	-	93	-	-	-	-
32	Admont		103	-	-	-	-	102	-	-	-	-
33	Bosporus		100	-	-	-	-	99	-	-	-	-
34	Bataja		101	-	-	-	-	102	-	-	-	-
35	Lawina		96	-	-	-	-	96	-	-	-	-
36	KWS Donovan	LOZ w	111	-	-	-	-	112	-	-	-	-
37	LG Keramik		106	-	-	-	-	102	-	-	-	-
38	Moschus		93	-	-	-	-	95	-	-	-	-
39	RGT Specialist	LOZ w	109	-	-	-	-	102	-	-	-	-
40	Opoka	LOZ w	105	-	-	-	-	108	-	-	-	-
41	Godnik		100	-	-	-	-	98	-	-	-	-
42	SY Dubaj		104	-	-	-	-	104	-	-	-	-
43	SY Yukon		99	-	-	-	-	97	-	-	-	-
44	Tonnage		91	-	-	-	-	92	-	-	-	-
	Liczba doswiadczeń		4	4	4	8	12	4	4	4	8	12

LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiany: Bellisa w latach 2017 – 2020, Bonanza 2019-2020,

Franz 2016–2020, Hondia 2017-2020, LG Jutta 2019-2020, Patras 2014-2020, Pokusa 2019-2020 na LOZ)

w- odmiana zalecana wstępnie;

A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebową, C – odmiana pastewna lub inna; F₁ – odmiana mieszańcowa

Tab. 8. Pszenica ozima . Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności w miejscowościach (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana		Poziom a ₁					Poziom a ₂				
			2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha		86,3	81,8	78,6	84,0	82,2	97,9	92,8	93,3	95,4	94,7
1	Artist	LOZ	109	107	105	108	107	107	107	112	107	109
2	Formacja	LOZ	110	101	101	105	104	106	99	101	103	102
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	103	103	104	103	103	107	105	104	106	105
4	Venecja	LOZ w	107	-	-	-	-	108	-	-	-	-
5	Arkadia	LOZ	99	101	101	100	100	104	106	107	105	106
6	Linus	LOZ	105	106	95	105	102	101	108	104	105	104
7	Patras		92	104	101	98	99	90	106	104	98	100
8	Franz		96	97	101	96	98	102	102	101	102	102
9	Hondia		94	103	99	98	99	98	94	97	96	96
10	KWS Dakotana	LOZ	102	107	101	104	103	100	105	99	103	101
11	Belissa		96	106	104	101	102	94	104	100	99	99
12	Pokusa		101	101	100	101	101	98	100	101	99	100
13	Bonanza		104	98	106	101	103	105	94	105	100	101
14	Hybery	F ₁	110	98	97	104	102	110	94	99	102	101
15	LG Jutta		98	86	99	92	94	98	87	103	92	96
16	Medalistka	LOZ	104	100	101	102	102	101	97	98	99	99
17	KWS Spencer		97	104	97	101	99	98	101	94	99	98
18	KWS Firebird		90	88	98	89	92	93	91	99	92	94
19	RGT Metronom		96	93	102	94	97	95	94	101	94	97
20	RGT Bilanz	LOZ	98	101	114	100	104	99	102	107	101	103
21	Tytanika		89	89	95	89	91	92	91	89	91	91
22	Owacja	LOZ	101	102	100	102	101	102	104	97	103	101
23	Apostel		97	103	-	100	-	99	106	-	103	-
24	Comandor		97	108	-	103	-	95	106	-	101	-
25	Euforia		101	106	-	104	-	100	105	-	102	-
26	Plejada	LOZ	104	113	-	108	-	99	109	-	104	-
27	Sfera		98	92	-	95	-	99	94	-	96	-
28	SY Orofino		95	103	-	99	-	98	100	-	99	-
29	Titanus		98	100	-	99	-	98	100	-	99	-
30	Sikorka		100	99	-	99	-	102	101	-	102	-
31	Lokata		90	-	-	-	-	93	-	-	-	-
32	Admont		103	-	-	-	-	102	-	-	-	-
33	Bosporus		100	-	-	-	-	99	-	-	-	-
34	Bataja		101	-	-	-	-	102	-	-	-	-
35	Lawina		96	-	-	-	-	96	-	-	-	-
36	KWS Donovan	LOZ w	111	-	-	-	-	112	-	-	-	-
37	LG Keramik		106	-	-	-	-	102	-	-	-	-
38	Moschus		93	-	-	-	-	95	-	-	-	-
39	RGT Specialist	LOZ w	109	-	-	-	-	102	-	-	-	-
40	Opoka	LOZ w	105	-	-	-	-	108	-	-	-	-
41	Godnik		100	-	-	-	-	98	-	-	-	-
42	SY Dubaj		104	-	-	-	-	104	-	-	-	-
43	SY Yukon		99	-	-	-	-	97	-	-	-	-
44	Tonnage		91	-	-	-	-	92	-	-	-	-
	Liczba doswiadczeń		4	4	4	8	12	4	4	4	8	12

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, .

a₁- przeciętny, a₂ – intensywny poziom agrotechniki, F₁ – odmiana mieszańcowa

Tab. 9. Pszenica ozima. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	96,1	95,5	85,7	95,8	92,4	109,9	103,1	117,6	106,5	110,2
1	Artist	102	105	94	104	100	104	105	103	104	104
2	Formacja	106	98	108	102	104	102	105	103	103	103
3	RGT Kilimanjaro	99	107	107	103	104	105	106	106	105	106
4	Venecja	100	-	-	-	-	99	-	-	-	-
5	Ostroga	99	93	91	96	95	97	95	93	96	95
6	Arkadia	100	104	99	102	101	104	108	105	106	105
7	Linus	103	107	85	105	98	102	110	99	106	104
8	Patras	104	102	104	103	103	98	101	101	100	100
9	Franz	92	97	90	95	93	97	101	97	99	98
10	Hondia	95	97	110	96	101	96	95	103	95	98
11	KWS Dakotana	104	100	104	102	103	101	105	100	103	102
12	Rotax	91	106	90	98	95	99	103	92	101	98
13	Belissa	92	96	106	94	98	96	99	100	98	98
14	Delawar	96	95	105	96	99	97	98	102	98	99
15	Pokusa	96	106	90	101	97	99	105	96	102	100
16	Bonanza	97	99	100	98	99	101	90	102	96	98
17	Frisky	97	105	118	101	107	103	108	101	105	104
18	Hybery F ₁	103	96	98	99	99	101	102	106	102	103
19	LG Jutta	102	90	94	96	95	102	92	94	97	96
20	Medalistka	102	98	106	100	102	107	102	103	104	104
21	Rivero	103	107	105	105	105	104	104	105	104	104
22	KWS Spencer	101	101	104	101	102	103	105	100	104	103
23	KWS Firebird	92	93	93	93	93	95	95	100	95	97
24	RGT Metronom	100	100	94	100	98	102	90	100	96	97
25	RGT Bilanz	102	100	101	101	101	98	106	105	102	103
26	Tytanika	93	98	104	96	99	94	101	97	97	97
27	Owacja	104	108	108	106	107	99	106	95	102	100
28	Apostel	93	107	-	100	-	98	102	-	100	-
29	Comandor	101	105	-	103	-	98	105	-	101	-
30	Euforia	96	100	-	98	-	98	101	-	99	-
31	Reduta	99	95	-	97	-	97	97	-	97	-
32	Błyskawica	103	101	-	102	-	101	110	-	106	-
33	Plejada	97	103	-	100	-	97	106	-	102	-
34	RGT Treffer	101	-	-	-	-	101	-	-	-	-
35	Sfera	99	102	-	100	-	96	103	-	99	-
36	SY Orofino	101	102	-	102	-	98	103	-	101	-
37	Titanus	100	101	-	101	-	99	102	-	101	-
38	Sikorka	107	106	-	107	-	108	105	-	106	-
39	Lokata	94	-	-	-	-	101	-	-	-	-
40	Admont	99	-	-	-	-	97	-	-	-	-
41	Bosporus	105	-	-	-	-	102	-	-	-	-
42	Bataja	104	-	-	-	-	100	-	-	-	-
43	Lawina	103	-	-	-	-	99	-	-	-	-
44	KWS Donovan	108	-	-	-	-	111	-	-	-	-
45	LG Keramik	104	-	-	-	-	101	-	-	-	-
46	Moschus	90	-	-	-	-	92	-	-	-	-
47	RGT Specialist	107	-	-	-	-	103	-	-	-	-
48	Opoka	109	-	-	-	-	102	-	-	-	-
49	Godnik	102	-	-	-	-	101	-	-	-	-
50	SY Dubaj	100	-	-	-	-	94	-	-	-	-
51	SY Yukon	98	-	-	-	-	95	-	-	-	-
52	Tonnage	102	-	-	-	-	103	-	-	-	-

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian, a₁ - przeciętny, a₂ - intensywny poziom agrotechniki

F₁ - odmiana mieszańcowa

Tab. 10. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian na dwóch poziomach agrotechniki. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020.

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość* (skala 9°)	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)				
			2020		2018-2020		2020		2018-2020		2020		2018-2020		
			a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	
Wzorzec			98	90	93	84	8,5	9,0	7,0	7,5	46,0	46,2	40,0	40,1	
1	Artist	4	96	92	93	85	8,5	9,0	7,0	7,8	46,6	47,2	41,9	42,3	
2	Formacja	4,5	99	89	98	84	8,7	9,0	7,2	8,3	41,5	43,4	37,9	38,7	
3	RGT Kilimanjaro	4	91	86	86	81	8,5	9,0	7,0	7,5	48,8	47,8	41,6	40,7	
4	Venecja	4	97	90	-	-	8,7	9,0	-	-	47,1	47,4	-	-	
5	Arkadia	6	102	93	103	90	8,5	9,0	7,1	7,5	49,3	49,4	43,3	43,3	
6	Linus	4	98	90	90	82	8,5	9,0	7,0	7,4	44,4	44,5	38,8	38,8	
7	Patras	4	97	91	91	84	8,3	9,0	6,9	7,6	51,7	52,8	44,8	45,0	
8	Franz	3	100	91	96	86	8,5	9,0	7,0	7,5	44,8	45,2	38,0	39,3	
9	Hondia	5,5	103	92	96	85	8,5	9,0	6,9	7,8	50,3	52,6	42,4	42,9	
10	KWS Dakotana	3	98	87	91	80	8,5	9,0	6,9	7,4	47,4	47,8	40,4	40,3	
11	Belissa	5	93	87	89	81	8,8	9,0	7,0	7,4	46,9	46,3	41,2	41,3	
12	Pokusa	3	100	87	98	83	8,7	9,0	7,1	7,4	45,5	46,4	40,1	40,2	
13	Bonanza	4	98	91	92	85	8,7	9,0	7,1	7,6	46,2	45,5	40,2	39,6	
14	Hybery	F ₁	3,5	102	93	98	87	8,8	9,0	7,1	7,6	44,1	46,5	38,7	39,8
15	LG Jutta		5,5	94	87	89	81	8,7	9,0	7,0	7,5	44,7	42,5	37,7	36,3
16	Medalistka		5,5	103	94	103	90	8,7	9,0	7,0	7,5	47,4	46,2	42,1	42,0
17	KWS Spencer		4,5	95	88	90	83	8,7	9,0	7,0	7,5	48,5	49,0	41,9	42,2
18	KWS Firebird		3,5	95	90	92	84	8,5	9,0	6,9	7,5	44,0	45,8	38,7	38,7
19	RGT Metronom		4,5	99	91	94	87	8,7	9,0	7,0	7,3	48,9	49,8	41,6	41,9
20	RGT Bilanz		4,5	98	92	94	85	8,5	9,0	6,9	7,5	45,7	47,0	39,8	40,5
21	Tytanika		5	93	88	91	83	8,3	9,0	6,9	7,3	42,7	43,2	36,7	37,1
22	Owacja		4,5	101	89	101	84	8,5	9,0	7,0	7,8	44,2	44,1	40,2	39,4
23	Apostel		3,5	99	91	-	-	8,5	9,0	-	-	48,8	48,3	-	-
24	Comandor		4,5	97	90	-	-	8,3	9,0	-	-	42,8	43,9	-	-
25	Euforia		5,5	97	89	-	-	8,8	9,0	-	-	44,4	44,3	-	-
26	Plejada		5	104	98	-	-	8,7	9,0	-	-	47,2	45,0	-	-
27	Sfera		4	99	92	-	-	8,5	9,0	-	-	47,0	45,8	-	-
28	SY Orofino		4	97	89	-	-	8,5	9,0	-	-	46,5	47,0	-	-
29	Titanus		3	99	90	-	-	8,5	9,0	-	-	47,6	48,1	-	-
30	Sikorka		3	97	90	-	-	8,7	9,0	-	-	45,7	47,1	-	-
31	Lokata		5,5	101	92	-	-	8,2	9,0	-	-	44,9	46,0	-	-
32	Admont		4,5	96	89	-	-	8,7	9,0	-	-	42,8	41,9	-	-
33	Bosporus		4	102	94	-	-	8,5	9,0	-	-	46,3	43,7	-	-
34	Bataja		4,5	103	88	-	-	8,5	9,0	-	-	45,9	46,5	-	-
35	Lawina		4,5	93	85	-	-	8,3	9,0	-	-	41,4	40,0	-	-
36	KWS Donovan		3	95	88	-	-	8,3	9,0	-	-	46,4	47,3	-	-
37	LG Keramik		4	98	87	-	-	8,7	9,0	-	-	44,0	47,8	-	-
38	Moschus		3,5	102	91	-	-	7,8	9,0	-	-	44,7	45,5	-	-
39	RGT Specialist		3,5	87	82	-	-	8,7	9,0	-	-	43,7	44,4	-	-
40	Opoka		4,5	103	93	-	-	8,5	9,0	-	-	48,8	47,3	-	-
41	Godnik		3,5	96	86	-	-	8,3	9,0	-	-	43,2	42,5	-	-
42	SY Dubaj		4,5	103	94	-	-	8,5	9,0	-	-	47,6	48,3	-	-
43	SY Yukon		5	99	91	-	-	8,5	9,0	-	-	45,7	45,6	-	-
44	Tonnage		4	96	87	-	-	8,7	9,0	-	-	46,1	45,1	-	-
Liczba doświadczeń			4	4	12	12	4	4	12	12	3	3	11	11	

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian,

F₁ - odmiana mieszańcowa

* - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała)

Tab. 11. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki – a1.
Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Mączniak właściwy				Septorioza liści				Septorioza kłosów				Rdza brunatna				Brunatna plamistość liści				Choroby poduszkowe				Fuzarioza kłosów			
		G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P
Wzorzec (skala 9°)		6,9	5,9	-	6,1	7,0	5,1	7,6	7,5	8,2	-	7,6	-	8,7	-	8,8	6,8	8,5	-	8,8	7,3	9,0	-	8,4	-	6,6	-		
1	Artist	7,5	5,0	-	7,0	8,0	6,0	8,0	8,0	8,0	-	8,0	-	8,0	-	9,0	6,0	7,5	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
2	Formacja	9,0	5,5	-	7,0	5,5	5,0	8,0	7,3	8,5	-	8,0	-	9,0	-	9,0	8,0	8,0	-	9,0	8,0	9,0	-	8,5	-	7,0	-		
3	RGT Kilimanjaro	6,5	5,0	-	6,5	7,5	5,5	8,0	8,0	8,5	-	8,0	-	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
4	Venecja	8,5	7,0	-	7,0	9,0	6,0	7,5	8,0	9,0	-	7,5	-	7,0	-	9,0	7,5	8,5	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
5	Arkadia	1,0	4,5	-	6,0	9,0	5,5	7,5	8,0	8,5	-	8,0	-	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	8,5	-	7,0	-		
6	Linus	4,5	4,5	-	6,5	3,0	4,5	7,5	7,8	7,0	-	7,0	-	9,0	-	8,5	6,0	9,0	-	9,0	7,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
7	Patras	7,5	8,0	-	5,0	7,5	5,5	8,0	7,0	7,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	6,0	9,0	-	9,0	6,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
8	Franz	8,0	5,5	-	6,0	8,0	4,0	8,0	8,0	7,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	9,0	-	8,0	7,0	9,0	-	8,5	-	6,0	-		
9	Hondia	9,0	8,5	-	5,0	6,5	5,5	7,5	7,0	8,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	7,5	-	9,0	7,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
10	KWS Dakotana	8,5	6,0	-	6,0	6,0	5,5	7,0	7,0	7,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	6,0	7,0	-	8,5	7,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
11	Belissa	4,0	5,0	-	6,0	8,0	5,5	7,5	7,0	7,5	-	8,0	-	9,0	-	8,5	6,0	9,0	-	9,0	7,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
12	Pokusa	5,0	4,0	-	6,0	8,0	4,5	7,0	7,0	8,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	6,0	8,5	-	9,0	7,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
13	Bonanza	8,5	8,5	-	6,5	7,5	4,5	7,5	7,3	8,0	-	7,0	-	9,0	-	8,5	8,0	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	8,0	-	6,5	-		
14	Hybery	4,5	4,0	-	7,0	5,0	4,5	7,5	8,0	8,0	-	7,5	-	7,5	-	8,5	8,0	9,0	-	8,5	8,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
15	LG Jutta	9,0	7,5	-	6,5	7,5	6,0	8,0	7,0	9,0	-	7,5	-	8,5	-	8,5	6,0	8,0	-	9,0	7,0	9,0	-	8,0	-	6,5	-		
16	Medalistka	2,0	4,5	-	7,0	9,0	5,0	8,0	8,0	9,0	-	8,0	-	8,5	-	8,5	7,0	8,5	-	8,5	8,0	9,0	-	8,5	-	6,0	-		
17	KWS Spencer	8,5	6,5	-	6,0	8,0	5,5	7,0	7,8	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	6,5	8,5	-	9,0	7,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
18	KWS Firebird	6,5	6,0	-	5,0	4,0	5,5	7,5	7,0	7,0	-	7,5	-	8,5	-	8,5	6,0	9,0	-	8,5	6,5	9,0	-	8,0	-	6,5	-		
19	RGT Metronom	5,0	7,5	-	6,0	8,0	6,5	7,0	7,0	9,0	-	7,5	-	8,0	-	9,0	6,0	8,0	-	9,0	7,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
20	RGT Bilanz	8,0	8,0	-	6,5	4,5	5,5	7,5	8,0	7,5	-	7,5	-	9,0	-	8,5	7,0	8,5	-	9,0	7,0	9,0	-	8,0	-	6,0	-		
21	Tytanika	2,5	4,5	-	6,0	7,5	6,0	7,0	7,0	9,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	6,0	9,0	-	8,5	7,0	9,0	-	6,5	-	6,5	-		
22	Owacja	6,0	7,5	-	6,0	8,0	5,5	8,0	8,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	9,0	-	8,5	8,0	9,0	-	8,0	-	6,5	-		
23	Apostel	7,0	4,5	-	6,5	9,0	4,5	8,0	8,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	8,0	8,5	-	9,0	8,0	9,0	-	7,5	-	7,0	-		
24	Comandor	7,5	7,0	-	5,0	7,5	4,5	8,0	7,0	9,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	6,0	9,0	-	9,0	6,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
25	Euforia	7,5	4,5	-	6,5	8,5	5,5	7,5	8,0	9,0	-	8,0	-	9,0	-	8,5	7,5	8,0	-	8,5	8,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
26	Plejada	9,0	5,5	-	7,0	8,0	6,5	7,5	8,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,5	8,0	-	9,0	8,0	7,0	-	7,5	-	6,5	-		
27	Sfera	9,0	4,5	-	6,0	8,0	4,0	7,5	8,0	7,5	-	7,5	-	8,5	-	9,0	7,0	8,0	-	9,0	7,0	9,0	-	8,0	-	7,0	-		
28	SY Orofino	8,5	5,5	-	5,0	5,5	4,0	8,0	7,8	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	8,5	-	9,0	7,0	9,0	-	8,0	-	7,0	-		
29	Titanus	6,0	3,5	-	5,5	7,0	3,0	7,5	7,0	8,5	-	7,5	-	8,5	-	9,0	7,0	8,5	-	9,0	6,0	9,0	-	7,5	-	7,0	-		
30	Sikorka	2,0	3,5	-	6,0	7,5	4,5	7,5	7,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	6,5	8,5	-	9,0	7,0	9,0	-	7,0	-	7,0	-		
31	Lokata	7,5	6,0	-	5,0	6,5	6,5	8,0	7,0	9,0	-	8,0	-	8,0	-	9,0	6,5	9,0	-	8,5	6,0	9,0	-	8,0	-	7,0	-		
32	Admont	9,0	3,5	-	7,0	8,5	5,0	8,0	8,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	7,5	-	9,0	8,0	9,0	-	8,5	-	7,0	-		
33	Bosporus	7,5	6,0	-	6,0	8,0	6,5	8,0	7,0	8,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	7,0	8,5	-	8,5	7,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
34	Bataja	9,0	7,5	-	6,0	3,0	3,5	8,0	7,0	6,5	-	7,5	-	9,0	-	8,0	6,0	8,0	-	9,0	7,0	9,0	-	9,0	-	6,0	-		
35	Lawina	9,0	9,0	-	5,0	7,0	5,5	7,0	7,0	9,0	-	8,0	-	8,0	-	9,0	6,0	7,5	-	8,5	6,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
36	KWS Donovan	7,0	3,5	-	7,0	7,0	3,5	8,0	8,0	9,0	-	7,5	-	6,0	-	9,0	8,0	8,0	-	8,5	8,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
37	LG Keramik	7,5	6,5	-	7,0	7,0	5,0	8,0	8,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	8,5	7,0	8,5	-	8,5	8,0	9,0	-	8,5	-	6,5	-		
38	Moschus	5,5	6,5	-	6,5	5,5	5,0	8,0	7,0	7,5	-	7,5	-	9,0	-	8,5	7,0	9,0	-	8,0	7,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
39	RGT Specialist	8,0	8,0	-	6,0	7,0	5,5	8,0	7,0	9,0	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	8,0	-	8,0	7,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
40	Opoka	6,5	8,5	-	6,0	8,0	5,0	7,5	8,0	8,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	8,0	9,0	-	8,0	-	6,5	-		
41	Godnik	5,5	5,0	-	6,0	7,0	5,5	7,5	7,8	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	6,0	8,5	-	9,0	6,0	9,0	-	7,0	-	6,5	-		
42	SY Dubaj	6,5	5,5	-	7,0	7,0	4,5	8,0	7,3	8,0	-	8,0	-	9,0	-	8,5	7,0	9,0	-	8,5	8,0	9,0	-	9,0	-	6,5	-		
43	SY Yukon	8,5	6,5	-	6,0	4,5	6,0	7,0	7,5	7,5	-	7,5	-	9,0	-	9,0	7,0	8,5	-	9,0	8,0	9,0	-	9,0	-	7,0	-		
44	Tonnage	9,0	4,5	-	5,5	8,0	5,0	7,0	7,8	7,0	-	7,0	-	9,0	-	9,0	6,0	9,0	-	8,0	6,5	9,0	-	7,0	-	6,5	-		

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian; G - Glubczyce, B - Bąków, Ł - Łosiów, P - Pagów

F₁ - odmiana mieszańcowa

Tab. 12. Pšenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1.
Rok zбору 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zżyznym (kg/hl)				Zawartość białka (% s.m.)				Ilość glutenu (%)				Wskaźnik sedymentacji (ml)				Liczba opadania (sek.)			
			G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P
1	Artist	B	70,8	77,1	74,0	69,7	12,7	14,4	16,3	15,2	20,9	27,5	29,1	29,3	42	55	57	57	276	375	368	311
2	Formacja	A	69,9	76,3	72,6	68,3	12,1	12,6	15,9	14,9	22,0	23,9	29,0	28,7	48	56	64	61	306	489	398	386
3	RGT Kilimanjaro	A	71,2	77,8	74,5	72,7	12,9	15,3	16,6	14,7	23,3	33,2	30,7	28,3	40	63	51	60	285	422	246	379
4	Venecja	B	74,5	79,7	75,8	75,0	11,8	14,1	17,5	15,0	19,4	26,7	28,5	26,9	46	63	58	61	352	479	438	413
5	Arkadia	A	69,7	75,3	74,2	68,8	12,1	13,5	15,5	14,1	22,7	26,1	29,0	28,0	53	60	40	40	225	465	359	402
6	Linus	A	73,6	77,4	74,9	73,4	12,4	14,3	15,4	15,1	22,6	30,0	28,4	31,1	48	58	56	60	233	362	374	314
7	Patras	A	67,6	75,5	71,3	65,8	12,7	14,0	17,2	16,6	24,9	28,2	31,8	33,5	46	63	57	66	180	383	422	106
8	Franz	A	71,0	76,3	73,1	69,7	11,3	14,0	17,4	15,8	22,7	27,0	30,1	29,6	48	56	55	53	282	475	424	439
9	Hondia	A	71,6	78,9	73,6	69,3	12,8	13,0	16,2	16,0	25,5	27,0	29,3	31,3	50	58	64	65	342	397	361	360
10	KWS Dakotana	A	69,9	77,3	73,8	69,2	12,2	13,8	16,8	16,0	20,7	28,0	31,0	27,4	44	62	59	55	342	410	382	245
11	Belissa	B	72,0	79,4	75,7	71,1	12,1	13,3	16,6	14,7	21,4	27,5	30,7	27,9	42	58	61	65	215	262	330	241
12	Pokusa	B	68,2	73,5	72,2	68,4	13,6	14,4	16,0	15,4	21,5	30,5	31,1	29,5	38	55	59	68	324	406	349	396
13	Bonanza	B	69,8	76,3	74,3	67,5	13,1	14,7	17,3	16,0	23,1	31,4	31,5	32,3	39	56	55	52	256	309	387	111
14	Hybry F ₁	B	68,9	76,4	72,3	69,5	10,6	12,2	14,8	14,9	19,0	23,6	23,3	28,5	34	43	46	62	159	350	291	188
15	LG Jutta	B	69,3	76,6	71,5	71,0	10,9	13,4	14,1	14,4	16,6	24,9	20,6	25,8	30	42	36	46	238	310	331	191
16	Medalistka	B	70,4	78,1	74,5	68,1	11,8	13,2	16,5	15,1	18,5	25,3	28,7	27,5	35	50	55	52	240	326	381	323
17	KWS Spencer	A	72,9	77,3	74,4	74,5	13,1	13,9	16,9	15,2	20,1	28,0	31,2	28,5	37	57	65	45	297	368	379	381
18	KWS Firebird	A	71,3	74,0	74,6	68,6	12,5	13,3	16,4	15,2	16,9	25,3	28,4	27,4	44	54	36	65	339	418	402	332
19	RGT Metronom	A	69,1	78,2	74,8	65,2	15,5	10,8	16,1	16,9	18,6	24,0	29,1	30,9	52	50	56	66	352	394	412	237
20	RGT Bilanz	A	72,6	79,6	73,5	69,1	13,7	13,7	15,8	16,6	21,6	27,4	26,8	33,9	46	61	53	65	328	395	401	380
21	Tytanika	B	72,3	78,1	75,0	72,6	12,9	14,8	15,8	14,7	18,6	29,6	27,6	28,3	44	62	61	60	341	454	391	395
22	Owacja	B	68,1	72,8	72,9	66,2	13,3	13,8	16,5	14,1	19,1	28,1	28,7	28,6	34	52	53	51	333	339	423	340
23	Apostel	A	74,0	78,7	77,2	73,1	14,4	13,0	15,9	15,0	21,1	25,8	28,8	29,9	38	38	59	55	227	267	339	279
24	Comandor	A	72,1	75,9	74,7	71,1	15,5	14,2	16,5	15,8	21,7	27,4	28,7	28,6	35	53	63	63	204	385	395	243
25	Euforia	A	71,4	75,1	73,6	70,4	15,2	15,7	17,2	16,3	21,8	35,2	32,9	32,0	36	58	62	51	267	436	423	374
26	Plejada	B	69,8	78,6	75,2	71,5	14,4	13,2	17,0	15,1	24,1	28,8	30,8	33,0	39	48	57	57	382	382	369	319
27	Sfera	B	74,3	80,5	75,5	73,6	15,4	12,9	15,6	13,5	22,0	26,6	27,4	29,5	44	49	60	54	294	365	352	292
28	SY Orfino	B	70,4	76,7	74,2	66,6	14,7	14,7	16,1	16,6	18,0	26,8	28,4	30,3	30	42	54	57	296	322	408	307
29	Titanus	B	69,5	78,2	69,9	66,9	17,2	15,2	15,7	14,9	20,5	29,7	25,2	27,7	45	60	59	54	185	284	356	181
30	Sikorka	C	69,0	76,7	73,6	67,7	13,1	13,9	15,5	14,5	19,6	27,9	26,1	26,7	45	60	56	64	186	347	349	187
31	Lokata	A	69,9	76,4	73,5	68,8	11,1	13,5	17,0	14,9	18,5	28,2	29,5	30,9	31	48	50	51	54	284	349	187
32	Admont	B	72,7	78,5	75,2	71,6	12,8	14,5	16,8	14,9	22,4	33,5	32,5	29,7	44	63	63	61	262	309	345	329
33	Bosporus	B	67,9	75,7	73,3	69,4	11,2	13,6	16,8	14,5	17,3	25,8	29,5	26,8	34	49	60	48	344	415	337	450
34	Batalja	B	71,0	75,8	74,5	65,5	11,2	12,9	16,2	16,7	20,1	23,5	30,1	30,7	37	55	69	61	188	371	417	276
35	Lawina	C	71,4	76,9	74,4	70,7	11,7	15,8	16,5	14,5	18,7	26,2	27,9	27,2	43	53	60	56	240	325	368	227
36	KWS Donovan	B	71,3	75,8	73,6	64,6	12,0	15,8	15,6	15,6	19,2	25,7	28,6	30,9	25	30	40	35	266	382	356	326
37	LG Keramik	B	71,9	79,8	76,2	72,2	11,7	15,5	16,0	15,9	23,6	28,2	29,5	32,4	36	54	54	53	233	403	411	228
38	Moschus	A	70,5	77,8	75,2	71,5	12,5	20,4	16,3	15,2	24,7	34,7	29,4	29,6	46	67	63	65	237	426	374	178
39	RGT Specialist	B	73,4	78,7	75,3	73,0	13,6	17,6	17,7	16,3	26,2	30,3	34,3	35,2	57	62	64	65	230	406	349	468
40	Opoka	A	73,1	79,7	73,9	72,1	11,6	15,1	15,3	14,2	22,0	23,3	27,9	26,2	44	48	58	59	286	358	343	379
41	Godnik	B	71,8	77,1	75,1	70,0	11,8	15,5	16,2	16,0	24,6	24,2	30,4	31,4	44	44	60	61	281	318	326	396
42	SY Dubaj	C	69,7	77,1	73,6	67,1	10,8	15,6	16,3	14,0	17,4	22,1	27,3	23,5	34	60	55	46	232	306	362	343
43	SY Yukon	A	72,9	78,3	74,2	72,8	12,1	17,0	17,4	15,8	22,0	31,0	30,6	31,2	59	67	64	69	377	420	398	404
44	Tonnage	B	72,5	78,6	75,2	73,0	12,3	16,3	17,8	15,1	21,3	28,7	31,2	27,5	62	69	68	66	383	440	328	407
		C	65,0	74,3	71,4	62,7	10,0	14,8	16,5	13,3	13,2	22,4	26,7	22,6	24	66	47	34	129	255	274	189

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian; G - Głubczyce, B - Bąków, Ł - Łosów, P - Pagów

F₁ - odmiana mieszańcowa

A - odmiana pastewna lub inna

Tab. 13. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2.
Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)				Zawartość białka (% s.m.)				Ilość glutenu (%)				Wskaźnik sedymentacji (ml)				Liczba opadania (sek.)					
			G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P		
Wzorzec																								
1	Artist	B	71,5	78,3	75,4	70,9	13,3	16,0	15,5	14,9	23,7	31,6	29,9	28,8	47	59	60	56	278	374	355	327		
2	Formacja	A	70,5	77,3	74,2	70,6	12,5	15,0	17,1	15,4	23,6	30,8	30,2	29,1	57	66	56	63	356	429	401	348		
3	RGT Kilimanjaro	A	70,9	77,1	75,1	72,7	13,1	12,9	16,6	14,6	24,8	26,0	31,3	28,1	44	54	55	59	290	386	351	400		
4	Venecja	B	74,9	80,6	76,3	75,2	12,4	14,8	16,9	15,1	20,4	31,7	29,1	27,5	53	68	60	46	406	473	362	429		
5	Arkadia	A	70,5	75,9	74,7	69,8	12,7	15,1	15,2	14,5	24,5	33,1	31,2	29,4	57	66	65	56	308	464	418	373		
6	Linus	A	73,4	79,0	77,6	75,9	13,2	15,7	14,5	15,0	23,2	36,5	29,3	29,8	44	61	53	64	224	344	340	314		
7	Patras	A	71,0	76,7	72,7	67,9	13,8	15,1	17,5	17,0	28,3	31,5	32,4	34,6	54	58	57	52	222	343	352	154		
8	Franz	A	72,8	79,9	76,0	71,8	13,4	14,8	15,7	15,7	26,1	31,8	32,4	31,1	53	62	66	54	367	427	423	413		
9	Hondia	A	71,9	78,4	76,3	70,2	13,3	17,9	15,9	15,6	23,7	36,0	32,6	27,4	48	68	65	64	335	417	406	340		
10	KWS Dakotana	A	72,1	80,6	75,4	71,5	12,5	14,4	16,9	14,9	24,5	30,4	31,5	27,6	56	64	60	62	175	238	327	289		
11	Belissa	B	69,8	75,5	74,0	70,0	13,6	16,2	14,9	15,5	23,5	37,2	31,5	29,6	44	60	64	58	243	399	306	315		
12	Pokusa	B	70,1	77,7	75,8	68,6	13,0	15,4	14,6	15,4	24,5	34,4	30,2	31,3	44	61	64	59	233	308	283	122		
13	Bonanza	B	69,0	78,3	76,4	69,2	12,2	14,1	13,3	14,3	21,6	27,6	24,6	26,4	38	56	64	58	171	325	258	214		
14	Hybery F ₁	B	69,6	78,5	75,1	72,1	11,9	14,0	12,9	14,0	17,9	25,0	23,1	23,2	32	42	65	40	226	327	378	236		
15	LG Jutta	B	70,7	79,8	74,3	63,9	13,1	15,0	14,5	15,2	22,0	30,3	30,5	30,9	37	62	64	46	257	370	332	418		
16	Medalistka	B	73,5	78,0	76,5	74,9	13,6	16,5	16,6	14,4	21,4	33,6	32,3	26,7	42	64	58	57	332	368	408	400		
17	KWS Spencer	A	73,5	75,7	73,5	71,8	14,9	16,2	16,7	15,1	21,7	30,6	29,5	26,1	56	59	57	64	327	506	413	399		
18	KWS Firebird	A	68,9	79,0	75,3	69,4	14,4	15,1	15,2	16,1	24,2	31,4	31,4	28,9	54	63	68	64	328	368	359	305		
19	RGT Metronom	A	73,5	79,7	76,3	71,6	14,9	15,6	14,7	14,9	25,0	32,4	29,3	30,5	51	63	64	62	325	373	375	471		
20	RGT Bilanz	B	72,5	79,1	77,0	73,5	15,4	15,9	16,3	14,3	23,7	32,2	28,4	26,2	54	66	59	64	344	402	403	391		
21	Tytanika	B	68,6	74,6	73,3	65,9	13,9	15,3	16,5	13,3	24,1	32,6	29,7	29,6	35	58	52	42	252	336	395	355		
22	Owacja	B	73,2	80,1	77,2	73,4	14,2	14,5	17,0	14,0	24,8	29,6	29,0	26,8	44	53	57	60	258	321	340	274		
23	Apostel	A	72,6	76,4	75,8	71,8	15,5	16,7	16,6	15,1	23,4	30,7	29,8	27,6	40	62	63	59	197	368	375	272		
24	Comandor	A	71,3	77,3	75,5	71,6	14,7	17,4	15,5	15,2	27,1	38,1	32,6	31,5	39	64	63	56	364	369	372	392		
25	Euforia	A	73,3	79,1	76,0	71,6	16,1	16,0	14,9	15,6	28,4	35,3	31,7	33,8	48	61	63	59	281	401	301	354		
26	Plejada	B	75,5	81,6	77,5	74,6	16,2	14,9	14,5	14,7	25,9	32,4	29,4	31,2	46	56	64	53	239	389	296	281		
27	Sfera	B	69,8	77,8	75,3	68,8	14,9	16,4	14,9	15,4	20,9	28,1	28,3	27,8	33	44	54	45	255	410	309	286		
28	SV Orofino	B	71,6	78,3	74,5	68,6	15,1	15,8	13,9	14,3	24,5	29,7	25,8	27,8	49	65	60	59	206	300	329	231		
29	Titanus	B	71,6	77,1	75,8	68,2	12,4	15,4	13,7	14,5	21,7	29,9	26,8	27,6	37	65	58	63	262	375	379	228		
30	Sikorka	C	71,0	78,2	74,5	71,6	12,5	15,9	16,5	14,5	24,0	34,9	30,5	28,9	46	58	59	56	228	324	291	344		
31	Lokata	A	73,2	79,9	75,9	72,7	13,2	16,1	15,6	15,1	26,4	34,7	33,9	30,7	53	65	66	54	289	358	403	293		
32	Admont	B	71,4	78,3	75,1	70,7	12,4	14,8	15,2	14,4	23,5	28,4	30,0	26,6	41	57	64	58	239	385	289	308		
33	Bosporus	B	71,1	76,8	73,6	69,3	12,3	15,0	15,0	15,1	23,5	28,9	31,2	31,1	44	50	63	56	218	366	327	326		
34	Bataja	B	71,0	78,4	76,9	71,3	12,1	18,3	14,1	14,2	22,1	30,1	27,8	27,7	50	63	60	62	243	304	403	353		
35	Lawina	C	71,2	77,3	75,1	69,1	11,8	17,6	14,7	14,4	21,3	30,8	29,4	27,3	24	38	48	31	228	381	418	269		
36	KWS Donovan	B	73,4	80,9	76,8	73,6	12,8	18,1	16,1	14,6	23,8	32,7	30,1	30,4	42	60	55	47	285	389	339	317		
37	LG Keramik	B	71,8	77,4	76,1	71,3	13,0	19,4	16,8	15,2	25,3	30,5	29,5	29,6	56	63	62	64	309	328	374	336		
38	Moschus	A	71,8	79,5	76,6	73,3	13,6	19,7	15,7	15,9	27,9	34,5	32,5	34,4	63	61	66	66	422	484	391	500		
39	RGT Specialist	B	73,3	80,2	74,6	73,5	12,6	17,4	15,9	14,0	26,0	29,3	29,9	26,1	50	62	52	56	239	373	448	331		
40	Opoka	A	73,4	78,4	76,8	-	12,5	16,8	14,6	14,5	27,1	30,8	28,5	28,8	46	61	63	60	264	364	317	355		
41	Godnik	C	69,4	78,0	75,8	68,1	9,7	17,1	14,2	15,0	18,8	28,6	27,4	26,2	39	59	64	54	255	352	364	298		
42	SV Dubaj	A	71,8	79,9	75,1	73,8	13,2	17,1	17,4	15,1	24,7	34,7	29,8	29,7	66	69	60	67	364	405	410	411		
43	SV Yukon	B	70,5	79,8	75,3	71,5	13,5	18,1	15,6	15,9	25,6	32,9	32,4	29,6	67	39	68	68	411	413	399	353		
44	Tonnage	C	67,0	76,4	72,9	65,9	10,4	16,4	16,3	12,9	13,9	27,3	27,4	18,8	22	36	44	30	113	265	220	169		

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian; G - Głubczyce, B - Bąków, Ł - Łosiów, P - Pagów

F₁ - odmiana mieszańcowa

A - odmiana jakościowa, B - odmiana chlebowa, C - odmiana pastewna lub inna

PRZEDPLON RZEPAK OZIMY, OPTYMALNY TERMIN SIEWU. PORÓWNANIE GĘSTOŚCI SIEWU.

Doświadczenia założone zostały w Głubczycach, Bąkowie i Pągowie w 2018 roku po rzepaku ozimym na intensywnym poziomie agrotechniki. Wysiewano odmiany z Listy Odmian Zalecanych. Porównano gęstości siewu 200 i 400 sztuk/m². Wyniki przedstawiono w poniższych tabelach.

Doświadczenia obrazują potencjał plonowania odmian przy obniżonej gęstości siewu.

W Głubczycach średni plon ziarna przy 200 szt./m² był niższy o 8,9 dt/ha niż przy 400 szt./m², w Bąkowie o 5,8 dt/ha, a w Pągowie był wyższy o 1,7 dt/ha. Średnio był niższy o 4,4 dt/ha.

Do odmian, które reagowały najniższym obniżeniem plonu przy 200 szt./m² Patras, Hondia i Belissa oraz Pokusa i LG Jutta, a największy spadek notowano u odmian KWS Dakotana, Linus i Franz. Przy średniej wysokości roślin 94 cm przy 200 szt/m² i 91 cm przy 400 szt/m² do wyższych odmian należały Arkadia i Hondia. Nieco wyższe wyleganie roślin notowano przy wysiewie 400 szt/m². Na mtz gęstość siewu nie miała wpływu.

W badaniach jakościowych ziarna przy wysiewie 400 szt/m² uzyskano średnio wyższą gęstość zsywową ziarna i liczbę opadania. Zawartość białka, ilość glutenu i wskaźnik sedymentacji były wyższe przy wysiewie 200 szt/m².



Tab. 14. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głęboczyce, Bąków i Pagów. Lata zbioru 2019–2020.

Lp.	Odmiana	200 szt. /m ²						400 szt. /m ²									
		Głęboczyce		Bąków		Pagów		Średnia		Głęboczyce		Bąków		Pagów		Średnia	
		2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020
	Wzorzec dt /ha	107,8	99,9	89,1	81,2	106,3	103,1	101,1	94,7	110,5	108,8	94,1	87,0	101,1	101,4	101,9	99,1
1	Artist	LOZ	106,8	102,7	94,8	86,4	113,0	110,3	99,8	114,5	111,2	96,6	89,1	112,1	108,8	107,8	103,0
2	Patras		107,6	97,3	89,6	80,6	102,6	99,4	92,4	108,2	106,3	88,7	86,0	75,6	88,1	90,8	93,5
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	114,3	103,8	96,7	81,4	108,5	104,7	106,5	115,8	112,4	99,3	88,6	110,4	106,0	108,5	102,3
4	Arkadia	LOZ	113,1	103,6	87,4	85,2	125,5	112,8	108,6	113,9	112,4	93,3	89,3	114,9	109,4	107,4	103,7
5	Linus	LOZ	107,9	101,1	92,4	82,9	93,2	102,4	97,8	111,7	112,4	102,0	92,7	99,2	102,8	104,3	102,6
6	Franz		104,1	94,9	88,4	79,9	97,7	102,2	96,8	107,2	105,6	92,3	85,4	107,8	107,1	102,4	99,4
7	Hondia		107,7	99,2	81,6	75,4	106,8	98,2	98,7	105,7	101,7	86,3	79,6	102,3	96,2	98,1	92,5
8	KWS Dakotana	LOZ	110,0	100,2	81,5	76,4	110,7	102,0	100,7	110,8	109,3	104,2	92,3	88,4	98,4	101,1	100,0
9	Belissa		100,5	93,0	82,9	79,6	108,4	104,6	97,3	105,9	104,0	81,4	81,3	92,2	96,8	93,2	94,0
10	Pokusa		106,3	-	91,5	-	101,5	-	99,8	-	109,4	-	94,4	-	97,1	-	100,3
11	Bonanza		107,9	-	88,9	-	111,8	-	102,9	-	111,4	-	98,6	-	116,1	-	108,7
12	LG Jutta		107,9	-	94,0	-	96,1	-	99,3	-	111,8	-	92,3	-	97,1	-	100,4

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian;

LOZ-Lista Odmian Zalecanych (odmiany: Bellisa 2017 – 2021, Bonanza 2019-2020, Franz 2016–2020, Hondia 2017-2021, LG Jutta 2019-2021, Patras 2014-2021,

Pokusa 2019-2021 na LOZ)

Tab. 15. Pšenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce, Bąków i Pągów. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość* (skala 9°)	200 szt. /m ²												400 szt. /m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Wysokość roślin (cm)						Wyleganie (skala 9°)						Wysokość roślin (cm)						Wyleganie (skala 9°)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Głubczyce		Bąków		Średnia		Głubczyce		Bąków		Średnia		Głubczyce		Bąków		Średnia		Głubczyce		Bąków		Średnia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian.

* - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 - bardzo mała)

Tab. 16. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2.
Głubczyce i Pągów. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)		Zawartość białka (% s.m.)		Ilość glutenu (%)		Wskaźnik sedimentacji (ml)		Liczba opadania (sek.)	
			G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
200 sztuk/m²												
Wzorzec			69,9	70,6	13,7	15,2	25,8	30,6	54	54	265	305
1	Artist	B	68,7	69,9	13,5	14,5	25,6	31,2	66	62	298	353
2	Patras	A	70,7	72,8	14,1	15,8	25,7	30,6	61	60	328	398
3	RGT Kilimanjaro	A	73,6	74,6	13,1	15,2	23,2	27,3	59	62	351	369
4	Arkadia	A	72,7	73,2	14,3	13,8	25,9	28,3	54	57	178	293
5	Linus	A	68,4	68,8	14,3	16,0	27,7	34,8	53	54	281	175
6	Franz	A	70,3	70,8	13,6	15,5	26,2	33,3	59	57	326	383
7	Hondia	A	70,2	71,1	14,0	14,5	25,6	29,4	55	55	184	310
8	KWS Dakotana	A	71,0	70,6	13,9	14,8	26,4	29,3	59	52	335	215
9	Belissa	B	68,2	68,7	14,3	16,1	28,1	33,6	49	46	314	264
10	Pokusa	B	69,7	67,5	13,7	16,2	28,4	32,3	50	48	220	362
11	Bonanza	B	67,7	69,7	12,8	14,6	23	29,2	42	46	141	224
12	LG Jutta	B	68,2	69,7	12,9	15,0	23,5	28,0	42	51	224	310
400 sztuk/m²												
Wzorzec			71,5	70,9	13,0	14,9	23,8	28,8	49	56	277	327
1	Artist	B	70,5	70,6	12,5	15,4	23,6	29,1	57	63	356	348
2	Patras	A	72,0	70,8	13,2	15,5	24,3	30,2	54	64	332	417
3	RGT Kilimanjaro	A	74,9	75,2	12,4	15,1	20,4	27,5	53	46	406	429
4	Arkadia	A	73,4	75,9	13,2	15,0	23,2	29,8	44	64	224	314
5	Linus	A	71,0	67,9	13,8	17,0	28,3	34,6	54	52	222	154
6	Franz	A	72,8	71,8	13,4	15,7	26,1	31,1	53	54	367	413
7	Hondia	A	71,9	70,2	13,3	15,6	23,7	27,4	48	64	335	340
8	KWS Dakotana	A	72,1	71,5	12,5	14,9	24,5	27,6	56	62	175	289
9	Belissa	B	69,8	70,0	13,6	15,5	23,5	29,6	44	58	243	315
10	Pokusa	B	70,1	68,6	13,0	15,4	24,5	31,3	44	59	233	122
11	Bonanza	B	69,0	69,2	12,2	14,3	21,6	26,4	38	58	171	214
12	LG Jutta	B	70,7	63,9	13,1	15,2	22,0	30,9	37	46	257	418

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian,
G – Głubczyce, P - Pągów
A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa

PRZEDPLON RZEPAK OZIMY, OPTIMALNY TERMIN SIEWU. ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH FORM NAWOZÓW AZOTOWYCH.

Doświadczenie prowadzone było w Głubczycach po rzepaku ozimym na intensywnym poziomie agrotechniki. Wysiewano odmiany z Listy Odmian Zalecanych. Zastosowane zostały różne formy nawozów azotowych, trzykrotnie w okresie wegetacji w łącznej dawce 145 kg N/ha.

Terminy nawożenia to ruszenie wegetacji, koniec krzewienia i faza liścia flagowego. W pierwszej wersji zastosowano RSM 32% w dawkach 63, 42 i 40 kg N/ha, a w drugiej RSM 32% w pierwszej dawce (63 kg N/ha), a saletrę amonową 32% w drugiej i w trzeciej dawce (42 i 40 kg N/ha). Wyniki przedstawiono w poniższych tabelach.

Średni plon 12 odmian przy użyciu RSM 32% i saletry amonowej 32% był niższy o 8,0 dt/ha niż po zastosowaniu tylko nawozu azotowego RSM 32% w trzech dawkach. Najwyższe różnice w plonowaniu stwierdzono u odmian RGT Kilimanjaro, Franz, Linus i Belissa, a najmniejsze u Patras, Hondii i Pokusy.

Średnio w 2-leciu wyższe rośliny były w drugiej kombinacji. W wyleganiu roślin i mtz nie stwierdzono różnic. W badaniach jakościowych tylko gęstość zsympowa ziarna była nieco wyższa w pierwszej kombinacji, a pozostałe wyróżniki były zbliżone.

Tab. 17. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych. Plon ziarna przy 14% wilgotności (dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2019-2020.

Lp.	Odmiana		Głubczyce					
			148 kg N/ha (RSM 32% w trzech dawkach)			148 kg N/ha (RSM 32% + saletra amonowa 32% w dwóch dawkach)		
			2020	2019	2019-2020	2020	2019	2019-2020
Wzorzec dt /ha			110,5	107,2	108,8	105,1	96,4	100,8
1	Artist	LOZ	114,5	107,8	111,2	111,2	98,9	105,1
2	Patras		108,2	104,4	106,3	105,3	99,7	102,5
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	115,8	108,9	112,4	106,6	96,3	101,4
4	Arkadia	LOZ	113,9	110,9	112,4	110,1	99,4	104,8
5	Linus	LOZ	111,7	113,1	112,4	103,5	100,9	102,2
6	Franz		107,2	104,1	105,6	96,0	93,2	94,6
7	Hondia		105,7	97,6	101,7	104,4	91,5	98,0
8	KWS Dakotana	LOZ	110,8	107,8	109,3	108,5	96,2	102,3
9	Belissa		105,9	102,1	104,0	99,9	89,4	94,7
10	Pokusa		109,4	-	-	106,9	-	-
11	Bonanza		111,4	-	-	104,8	-	-
12	LG Jutta		111,8	-	-	104,0	-	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian.

LOZ-Lista Odmian Zalecanych (odmiany: Bellisa 2017 – 2021, Bonanza 2019-2020, Franz 2016–2020, Hondia 2017-2021, LG Jutta 2019-2021, Patras 2014-2021, Pokusa 2019-2021 na LOZ)

RSM 32%:

I dawka N : RSM 32% - 62 kg N/ha
II dawka N : RSM 32% - 43 kg N/ha
III dawka N : RSM 32% - 43 kg N/ha

RSM 32% + saletra amonowa 32%:

I dawka N : RSM 32% - 62 kg N/ha
II dawka N : saletra amonowa 32% - 43 kg N/ha
III dawka N : saletra amonowa 32% - 43 kg N/ha

Tab. 18. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głębokość, Lata zbioru 2019-2020.

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość* (skala 9°)	148 kg N/ha (RSM 32% w trzech dawkach)						148 kg N/ha (RSM 32% + saletra amonowa 32% w dwóch dawkach)					
			Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)		Masa 1000 ziaren (g)		Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)		Masa 1000 ziaren (g)	
			2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020
			90	89	9,0	9,0	45,6	43,7	98	92	9,0	9,0	44,0	43,8
1	Artist	4	92	92	9,0	9,0	46,7	44,2	99	92	9,0	9,0	46,1	45,8
2	Patras	4	93	91	9,0	9,0	54,0	50,1	100	94	9,0	9,0	51,1	49,4
3	RGT Kilimanjaro	4	86	86	9,0	9,0	46,4	43,2	96	88	9,0	9,0	41,4	43,0
4	Arkadia	6	95	95	9,0	9,0	48,4	47,2	101	99	9,0	9,0	50,9	49,3
5	Linus	4	86	86	9,0	9,0	43,4	42,2	96	89	9,0	9,0	39,6	40,6
6	Franz	3	95	95	9,0	9,0	43,3	42,2	98	93	9,0	9,0	42,9	42,8
7	Hondia	5,5	96	92	9,0	9,0	51,0	45,4	103	96	9,0	9,0	48,2	44,2
8	KWS Dakotana	3	84	84	9,0	9,0	45,4	43,1	93	88	9,0	9,0	43,0	43,4
9	Belissa	5	89	88	9,0	9,0	46,7	45,4	93	89	9,0	9,0	46,3	44,8
10	Pokusa	3	87	-	9,0	-	43,1	-	100	-	9,0	-	42,1	-
11	Bonanza	4	87	-	9,0	-	39,3	-	95	-	9,0	-	40,0	-
12	LG Jutta	5,5	91	-	9,0	-	40,0	-	100	-	9,0	-	36,8	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian.

*.- wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 - bardzo mała)

Tab. 19. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)	Zawartość białka (% s.m.)	Ilość glutenu (%)	Wskaźnik sedimentacji (ml)	Liczba opadania (sek.)
RSM 32%							
148 kg N/ha							
Wzorzec			71,5	13,0	23,8	49	277
1	Artist	B	70,5	12,5	23,6	57	356
2	Patras	A	72,0	13,2	24,3	54	332
3	RGT Kilimanjaro	A	74,9	12,4	20,4	53	406
4	Arkadia	A	73,4	13,2	23,2	44	224
5	Linus	A	71,0	13,8	28,3	54	222
6	Franz	A	72,8	13,4	26,1	53	367
7	Hondia	A	71,9	13,3	23,7	48	335
8	KWS Dakotana	A	72,1	12,5	24,5	56	175
9	Belissa	B	69,8	13,6	23,5	44	243
10	Pokusa	B	70,1	13,0	24,5	44	233
11	Bonanza	B	69,0	12,2	21,6	38	171
12	LG Jutta	B	70,7	13,1	22,0	37	257
RSM 32% + saletra amonowa 32%							
148 kg N/ha							
Wzorzec			70,9	13,2	23,9	49	256
1	Artist	B	70,4	12,6	23,6	55	342
2	Patras	A	70,9	13,4	24,7	49	330
3	RGT Kilimanjaro	A	73,9	12,4	21,2	49	328
4	Arkadia	A	73,4	12,6	23,6	44	218
5	Linus	A	68,5	13,6	27,3	47	208
6	Franz	A	70,8	14,4	28,3	54	307
7	Hondia	A	71,8	13,4	23,2	57	369
8	KWS Dakotana	A	72,3	13,4	24,2	59	149
9	Belissa	B	70,4	13,8	25,1	44	286
10	Pokusa	B	70,4	13,2	23,1	44	171
11	Bonanza	B	69,5	12,8	20	41	156
12	LG Jutta	B	69,3	12,3	22,7	40	210

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian
A - odmiana jakościowa, B - odmiana chlebowa

PRZEDPLON PSZENICA OZIMA, OPTYMALNY TERMIN SIEWU

Doświadczenia przeprowadzono w Głubczycach i w Łosiu na intensywnym poziomie agrotechniki. Wyniki porównano z przedplonem pszenica ozima po rzepaku ozimym w optymalnym terminie siewu. Dla Głubczyc w sezonie 2018/2020 średnio o 22,3 dt/ha korzystniejszym przedplonem był rzepak ozimy (w latach 2019 – 2020 o 17,6 dt/ha). W Łosiu w latach 2019-2020 pszenica ozima po pszenicy plonowała tylko o 2,4 dt/ha słabiej niż po rzepaku. Wyniki przedstawiono w poniższych tabelach.

W 3-leciu w Głubczycach najwyżej w stanowisku pszenica po pszenicy plonowały odmiany RGT Bilanz i Owacja, a naj słabiej RGT Metronom. Po tym przedplonie, w stosunku do rzepaku ozimego uzyskano średnio niższą wysokość roślin, mniejsze wyleganie i niższą masę tysiąca ziaren oraz mniejszą zawartość białka i wartość wskaźnika sedymentacji. Gęstość zsympowa ziarna, ilość glutenu i liczba opadania były wyższe. W Łosiu wszystkie wyróżniki jakościowe, z wyjątkiem liczby opadania były wyraźnie korzystniejsze po przedplonie rzepak ozimy.



Tab. 20. Pszenica ozima. Przedplon pszenica ozima i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2.
Głubczyce i Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018 - 2020.

Lp.	Odmiana	2020					2019					2018			2018-2020		
		pszenica		średnia	rzepak		średnia	pszenica		rzepak	średnia	pszenica		rzepak	pszenica	rzepak	
		Głubczyce	Łosiów		Głubczyce	Łosiów		Głubczyce	Łosiów			Głubczyce	Łosiów		Głubczyce	Głubczyce	
1	Wzorzec dt /ha	101,4	80,1	90,7	110,0	85,1	97,5	79,0	88,2	83,6	105,5	88,2	96,9	86,0	117,8	88,8	111,1
2	Artist	101	102	102	104	110	107	102	106	104	102	115	109	101	103	101	103
3	Formacja	100	100	100	102	114	108	102	99	100	102	102	102	96	103	99	102
4	RGT Klimanajaro	104	106	105	105	107	106	98	106	102	103	115	109	104	106	102	105
5	Venecja	102	102	102	99	109	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Arkadia	107	104	106	104	102	103	107	114	111	105	105	105	95	105	103	104
7	Linus	96	96	96	102	99	100	101	97	99	107	110	109	107	99	102	103
8	Patras	99	100	100	98	94	96	104	104	104	99	117	108	101	101	101	99
9	Franz	100	95	98	97	108	103	100	91	95	99	103	101	107	97	102	98
10	Hondia	95	93	94	96	103	99	97	99	98	92	101	97	96	102	96	97
11	KWS Dakotana	94	108	101	101	102	102	104	104	104	102	106	104	107	100	102	101
12	Belissa	99	104	102	96	102	99	107	97	102	97	113	105	94	100	100	98
13	Pokusa	97	98	97	99	99	99	107	106	102	102	104	103	95	96	97	99
14	Bonanza	92	97	95	101	102	102	93	98	96	88	98	93	102	102	96	97
15	Hybery F ₁	106	109	107	101	109	105	96	96	96	100	85	93	107	106	103	102
16	LG Jutta	95	97	96	102	96	99	89	89	89	90	90	90	100	94	95	95
17	Medalistka	104	108	106	107	99	103	100	102	101	100	96	98	103	103	101	103
18	KWS Spencer	103	95	99	103	99	101	97	104	100	103	100	101	99	100	99	102
19	KWS Firebird	96	96	92	95	87	91	96	89	93	93	83	88	96	100	96	96
20	RGT Mietronom	105	102	104	102	89	96	103	96	99	87	103	95	70	100	93	96
21	RGT Bilanz	106	100	103	98	97	98	112	104	108	104	91	97	106	105	108	102
22	Tytanika	101	91	96	94	86	90	86	86	86	99	86	93	103	96	97	96
23	Owacja	96	102	99	99	103	101	101	100	100	104	108	106	119	95	105	99
24	Apostel	97	105	101	98	102	100	105	110	107	100	111	106	-	-	-	-
25	Comandor	96	103	99	98	99	99	104	111	107	103	112	107	-	-	-	-
26	Euforia	103	95	99	98	98	98	109	110	109	98	96	97	-	-	-	-
27	Plejada	98	104	101	97	98	98	107	113	110	104	112	108	-	-	-	-
28	Sfera	96	88	92	96	98	97	100	94	97	101	80	90	-	-	-	-
29	SY Orofino	123	98	110	98	105	101	100	99	100	100	87	93	-	-	-	-
30	Titanus	106	99	103	99	103	101	92	92	92	102	90	96	-	-	-	-
31	Sikorka	96	105	100	108	97	102	101	98	99	104	96	100	-	-	-	-
32	Lokata	99	107	103	101	90	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Admont	95	101	98	97	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Bosporus	101	100	100	101	89	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Bataja	100	108	104	100	105	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Lawina	93	99	96	99	104	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KWS Donovan	106	109	107	111	110	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	LG Keramik	102	104	103	101	96	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Moschus	95	93	94	92	85	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	RGT Specialist	100	102	101	103	113	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Opoka	102	93	97	102	100	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Godnik	100	101	103	101	103	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SY Dubaj	98	101	99	94	108	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	SY Yukon	91	96	94	95	100	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Tonnage	101	94	98	103	84	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń		1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	3

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, F₁ – odmiana mieszańcowa

Tab. 21. Pšenica ozima. Przedplon pszenica ozima i rzepak oziny, optymalny termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość* (skala 9°)	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)			
			2020		2018-2020		2020		2018-2020		2020		2018-2020	
			pszenica	rzepak	pszenica	rzepak	pszenica	rzepak	pszenica	rzepak	pszenica	rzepak	pszenica	rzepak
			84	86	77	82	9,0	6,6	44,5	44,4	39,9	40,7		
1	Artist	4	81	86	77	83	9,0	8,1	44,9	45,6	41,1	43,3		
2	Formacja	4,5	84	85	78	82	9,0	8,4	41,8	43,0	37,8	40,0		
3	RGT Kilimanjaro	4	82	83	73	80	9,0	8,0	45,4	45,8	40,5	41,6		
4	Venecja	4	84	85	-	-	9,0	-	45,3	46,2	-	-		
5	Arkadia	6	88	89	82	89	9,0	7,7	47,3	46,9	40,9	44,1		
6	Linus	4	85	90	76	82	9,0	7,6	43,2	44,4	39,4	39,4		
7	Patras	4	84	86	74	82	9,0	6,6	51,5	50,2	44,7	46,3		
8	Franz	3	85	94	79	86	9,0	8,0	44,9	42,8	39,1	40,2		
9	Hondia	5,5	87	90	80	84	9,0	8,1	46,5	49,9	41,5	43,8		
10	KWS Dakotana	3	81	84	76	81	9,0	7,1	43,7	45,3	38,7	39,7		
11	Belissa	5	82	84	75	82	9,0	7,7	45,6	44,9	40,2	43,0		
12	Pokusa	3	84	80	76	80	9,0	8,2	44,0	45,7	39,2	41,7		
13	Bonanza	4	86	86	78	82	9,0	7,2	43,5	43,7	38,5	39,8		
14	Hybery F ₁	3,5	88	86	80	83	9,0	8,6	44,1	44,8	40,0	38,8		
15	LG Jutta	5,5	82	83	76	79	9,0	8,3	43,9	39,9	38,8	36,5		
16	Medalistka	5,5	89	90	83	87	9,0	7,3	45,2	43,8	42,7	43,3		
17	KWS Spencer	4,5	86	86	78	84	9,0	7,3	46,9	47,9	42,0	44,3		
18	KWS Firebird	3,5	83	85	77	82	9,0	7,1	41,3	40,1	37,1	36,9		
19	RGT Metronom	4,5	85	88	78	85	9,0	7,0	47,1	48,8	42,1	42,9		
20	RGT Bilanz	4,5	85	88	77	83	9,0	8,3	45,3	45,8	41,3	41,4		
21	Tytanika	5	83	83	77	80	9,0	7,4	42,1	42,1	35,2	36,8		
22	Owacja	4,5	81	80	77	80	9,0	8,2	44,1	43,1	40,2	40,1		
23	Apostel	3,5	86	85	-	-	9,0	-	47,0	46,9	-	-		
24	Comandor	4,5	84	84	-	-	9,0	-	43,1	43,2	-	-		
25	Euforia	5,5	79	86	-	-	9,0	-	43,4	42,8	-	-		
26	Plejada	5	91	95	-	-	9,0	-	47,5	41,8	-	-		
27	Sfera	4	87	86	-	-	9,0	-	44,0	43,5	-	-		
28	SY Orofino	4	82	84	-	-	9,0	-	43,2	46,3	-	-		
29	Titanus	3	82	84	-	-	9,0	-	47,0	45,7	-	-		
30	Sikorka	3	83	83	-	-	9,0	-	41,8	45,6	-	-		
31	Lokata	5,5	86	87	-	-	9,0	-	44,5	44,4	-	-		
32	Admont	4,5	83	83	-	-	9,0	-	42,0	40,1	-	-		
33	Bosporus	4	87	91	-	-	9,0	-	43,5	40,7	-	-		
34	Bataja	4,5	84	80	-	-	9,0	-	44,3	45,1	-	-		
35	Lawina	4,5	80	82	-	-	9,0	-	40,9	39,2	-	-		
36	KWS Donovan	3	83	83	-	-	9,0	-	45,8	46,4	-	-		
37	LG Keramik	4	82	83	-	-	9,0	-	43,3	48,0	-	-		
38	Moschus	3,5	87	86	-	-	9,0	-	43,9	43,7	-	-		
39	RGT Specialist	3,5	78	81	-	-	9,0	-	45,0	42,9	-	-		
40	Opoka	4,5	86	86	-	-	9,0	-	47,2	43,9	-	-		
41	Godnik	3,5	83	80	-	-	9,0	-	40,0	40,9	-	-		
42	SY Dubaj	4,5	84	85	-	-	9,0	-	46,4	47,4	-	-		
43	SY Yukon	5	83	86	-	-	9,0	-	43,6	43,6	-	-		
44	Tonnage	4	80	79	-	-	9,0	-	45,1	42,2	-	-		
Liczba doświadczeń			2	2	5	5	2	5	2	2	5	5		

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian; F₁ – odmiana mieszańcowa

* - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 - bardzo mała)

Tab. 22. Pszenica ozima. Przedplon pszenica ozima i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce, Łosiów. Rok zбору 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zrypnym (kg/ha)				Zawartość białka (% s.m.)				Ilość glutenu (%)				Wskaźnik sedymentacji (ml)				Liczba opadania (sek.)			
			pszenica		rzepak		pszenica		rzepak		pszenica		rzepak		pszenica		rzepak		pszenica		rzepak	
			G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł	G	Ł
	Wzorzec		71,9	73,4	71,5	75,4	12,9	13,5	13,3	15,5	24,8	21,4	23,7	29,9	48	31	53	60	319	329	278	355
1	Artist	B	71,9	74,4	70,5	74,2	12,5	14,0	12,5	17,1	24,2	20,3	23,6	30,2	55	31	57	56	338	375	356	401
2	Formacja	A	70,7	73,8	70,9	75,1	13,7	11,7	13,1	16,6	27,2	21,5	24,8	31,3	47	32	44	44	334	357	290	351
3	RGT Kilimanjaro	A	75,4	74,8	74,9	76,3	12,3	12,5	12,4	16,9	22,7	22,3	20,4	29,1	50	31	53	60	381	437	406	362
4	Venecja	B	71,3	72,6	70,5	74,7	13,0	11,8	12,7	15,2	26,1	20,7	24,5	31,2	52	30	57	65	412	389	308	418
5	Arkadia	A	74,2	73,8	73,4	77,6	13,0	13,1	13,2	14,5	26,1	20,3	23,2	29,3	41	28	44	53	255	308	224	340
6	Linus	A	70,1	71,7	71,0	72,7	14,0	13,5	13,8	17,5	31,3	21,9	28,3	32,4	55	29	54	57	340	351	222	352
7	Patras	A	72,5	73,0	72,0	73,6	12,8	13,6	13,2	14,9	25,6	21,3	24,3	30,0	50	33	54	55	383	295	332	253
8	Franz	A	72,3	73,6	72,8	76,0	13,1	14,7	13,4	15,7	26,3	22,5	26,1	32,4	50	39	53	66	397	431	367	423
9	Hondia	A	72,0	73,3	71,9	76,3	12,7	12,4	13,3	15,9	23,4	20,0	23,7	32,6	44	29	48	65	388	378	335	406
10	KWS Dakotana	A	73,0	74,4	72,1	75,4	13,1	14,7	12,5	16,9	26,9	22,9	24,5	31,5	53	34	56	60	222	251	175	327
11	Belissa	B	70,9	71,4	69,8	74,0	13,0	14,0	13,6	14,9	27,9	22,7	23,5	31,5	40	32	44	64	269	384	243	306
12	Pokusa	B	71,1	73,1	70,1	75,8	13,3	13,9	13,0	14,6	26,5	23,7	24,5	30,2	44	33	44	64	251	169	233	283
13	Bonanza	A	69,6	73,0	69,0	76,4	13,0	13,5	12,2	13,3	22,8	19,3	21,6	24,6	51	26	38	64	250	364	171	258
14	Hybery F1	B	70,4	73,5	69,6	75,1	12,5	14,1	11,9	12,9	23,1	21,2	17,9	23,1	35	25	32	65	270	246	226	378
15	Lg Jutta	B	71,8	73,5	70,7	74,3	12,1	13,9	13,1	14,5	22,7	21,2	22,0	30,5	42	29	37	64	297	283	257	332
16	Medalistka	B	73,7	74,2	73,5	76,5	12,3	13,6	13,6	16,6	22,8	21,7	21,4	32,3	44	31	42	58	336	393	332	408
17	KWS Spencer	A	72,6	73,3	73,5	73,5	12,8	13,9	14,9	16,7	22	19,8	21,7	29,5	55	32	56	57	333	412	327	413
18	KWS Firebird	A	69,3	73,7	68,9	75,3	13,6	14,0	14,4	15,2	24,7	20,7	24,2	31,4	54	30	54	68	262	339	328	359
19	RGT Metronom	A	72,9	74,9	73,5	76,3	13,3	12,7	14,9	14,7	25,7	22,8	25,0	29,3	59	34	51	64	334	411	325	375
20	RGT Bilanz	B	73,8	73,7	72,5	77,0	12,5	13,7	15,4	16,3	22,6	19,8	23,7	28,4	47	29	54	59	354	248	344	403
21	Tytanika	B	67,6	72,1	68,6	73,3	12,6	14,6	13,9	16,5	24,1	22,4	24,1	29,7	42	29	35	52	370	225	252	395
22	Owacja	B	72,6	73,5	73,2	77,2	12,6	13,8	14,2	17,0	22,9	22,5	24,8	29,0	44	27	44	57	280	247	258	340
23	Apostel	A	73,1	73,9	72,6	75,8	12,1	14,8	15,5	16,6	22	22,3	23,4	29,8	43	33	40	63	252	341	197	375
24	Comandor	A	71,9	72,3	71,3	75,5	13,0	13,7	14,7	15,5	25,7	20,9	27,1	32,6	46	30	39	63	267	296	364	372
25	Euforia	A	73,0	73,9	73,3	76,0	13,0	14,5	16,1	14,9	27,5	25,5	28,4	31,7	46	34	48	63	349	313	281	301
26	Plejada	B	76,1	74,8	75,5	77,5	13,5	13,8	16,2	14,5	25,8	21,1	25,9	29,4	43	33	46	64	318	315	239	296
27	Sfera	B	71,5	72,5	69,8	75,3	12,6	12,5	14,9	14,9	21,5	21,8	20,9	28,3	33	25	33	54	258	379	255	309
28	SY Orofino	B	71,1	74,1	71,6	74,5	12,7	14,2	15,1	13,9	23,9	20,5	24,5	25,8	50	34	49	60	327	288	206	329
29	Titanus	B	72,0	72,3	71,6	75,8	12,6	13,4	12,4	13,7	23,7	20,4	21,7	26,8	52	33	37	58	279	367	262	379
30	Sikorka	C	69,6	73,0	71,0	74,5	13,0	13,4	12,5	16,5	24,5	20,6	24,0	30,5	46	31	46	59	343	306	228	291
31	Lokata	A	72,6	74,6	73,2	75,9	13,0	11,9	13,2	15,6	25,7	22,0	26,4	33,9	49	34	53	66	356	352	289	403
32	Admont	B	69,9	73,5	71,4	75,1	13,4	14,4	12,4	15,2	26,5	21,5	23,5	30,0	46	33	41	64	334	348	239	289
33	Bosporus	B	72,2	73,0	71,1	73,6	12,3	14,1	12,3	15,0	23,9	23,3	23,5	31,2	42	30	44	63	277	260	218	327
34	Bataja	B	72,0	74,1	71,0	76,9	13,1	11,5	12,1	14,1	26,1	20,9	22,1	27,8	50	27	50	60	284	336	243	403
35	Lawina	C	70,3	73,5	71,2	75,1	12,8	12,1	11,8	14,7	23,5	22,4	21,3	29,4	28	26	24	48	281	276	228	418
36	KWS Donovan	B	73,8	73,8	73,4	76,8	12,5	13,4	12,8	16,1	24,8	20,9	23,8	30,1	44	34	42	55	324	278	285	339
37	LG Keramik	B	71,9	72,1	71,8	76,1	13,3	13,9	13,0	16,8	24,5	19,9	25,3	29,5	55	29	56	62	302	319	309	374
38	Moschus	A	75,2	75,0	71,8	76,6	14,1	14,2	13,6	15,7	30,6	24,4	27,9	32,5	61	37	63	66	428	387	422	391
39	RGT Specialist	B	73,7	74,4	73,3	74,6	12,8	13,2	12,6	15,9	22,5	20,7	26,0	29,9	58	30	50	52	381	357	239	448
40	Opoka	A	72,9	72,7	73,4	76,8	12,9	13,9	12,5	14,6	25,7	20,5	27,1	28,5	52	29	46	63	340	344	264	317
41	Godnik	C	69,0	71,8	69,4	75,8	12,5	13,5	9,7	14,2	22	19,3	18,8	27,4	48	24	39	64	289	298	255	364
42	SV Dubaj	A	73,5	73,7	71,8	75,1	14,5	14,0	13,2	17,4	27,9	22,5	24,7	29,8	62	38	364	60	416	420	364	410
43	SY Yukon	B	72,7	74,5	70,5	75,3	14,1	13,9	13,5	15,6	27,4	21,2	25,6	32,4	62	39	67	68	385	391	411	399
44	Tonnage	C	67,7	71,5	67,0	72,9	10,8	13,3	10,4	16,3	18,7	19,0	13,9	27,4	28	24	22	44	185	215	113	220

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

G – Głubczyce, Ł – Łosiów

F₁ – odmiana mieszańcowa

A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna

PRZEDPLON SOJA, OPTYMALNY TERMIN SIEWU. ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH DAWEK AZOTU.

Doświadczenie założone zostało w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki. Wysiano 12 odmian z Listy Odmian Zalecanych. Zastosowano nawożenie azotem 106 kg N/ha (RSM 32% w dwóch dawkach) w porównaniu z nawożeniem 148 kg N/ha (RSM 32% w trzech dawkach). Wyniki przedstawiono w poniższych tabelach.

Średni plon ziarna w latach 2019-2020 przy zastosowaniu 106 kg N/ha po soi był niższy o 14,8 dt/ha niż przy 148 kg N/ha po rzepaku ozimym. Większe obniżenie plonowania wystąpiło u odmian KWS Dakotana, Linus i Artist oraz LG Jutta, Pokusa i Bonanza, w 2019 roku, a mniejsze u Franz, Patras i Hondia.

Wzrost i wyleganie roślin oraz mtz nie różniły się istotnie między przedplonami i dawkami azotu, a w badaniach jakościowych na wyższym nawożeniu azotem po rzepaku ozimym uzyskano większą gęstość zsypaną ziarna, a mniejszą zawartość białka i ilość glutenu.

Tab. 23. Pszenica ozima. Przedplon soja i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu.
Plon ziarna przy 14% wilgotności (dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2019-2020.

Lp.	Odmiana		Głubczyce					
			148 kg N/ha (RSM 32% w trzech dawkach)			106 kg N/ha (RSM 32% w dwóch dawkach)		
			rzepak ozimy			soja		
2020	2019	2019-2020	2020	2019	2019-2020			
Wzorzec dt /ha			110,5	107,2	108,8	89,9	98,0	94,0
1	Artist	LOZ	114,5	107,8	111,2	92,1	96,0	94,1
2	Patras		108,2	104,4	106,3	95,8	94,5	95,2
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	115,8	108,9	112,4	90,2	101,0	95,6
4	Arkadia	LOZ	113,9	110,9	112,4	95,7	103,5	99,6
5	Linus	LOZ	111,7	113,1	112,4	87,0	100,1	93,5
6	Franz		107,2	104,1	105,6	93,1	97,7	95,4
7	Hondia		105,7	97,6	101,7	87,4	92,8	90,1
8	KWS Dakotana	LOZ	110,8	107,8	109,3	85,0	95,5	90,3
9	Belissa		105,9	102,1	104,0	86,8	93,7	90,2
10	Pokusa		109,4	-	-	88,0	-	-
11	Bonanza		111,4	-	-	91,5	-	-
12	LG Jutta		111,8	-	-	86,1	-	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian.
LOZ - Lista Odmian Zalecanych

Tab. 24. Pszenica ozima. Przedplon soja i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020.

Lp.		Odmiana	Zimotrwałość* (skala 9°)	148 kg N/ha (RSM 32% w trzech dawkach)						106 kg N/ha (RSM 32% w dwóch dawkach)					
				rzepak ozimy			soja								
				Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)	Masa 1000 ziaren (g)	Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)		Masa 1000 ziaren (g)			
				2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020	2020	2019- 2020		
Wzorzec dt /ha				90	89	9,0	9,0	45,6	43,7	93	90	8,8	8,9	43,4	44,5
1	Artist	4	92	92	9,0	9,0	46,7	44,2	101	94	8,3	8,7	45,0	45,8	
2	Patras	4	93	91	9,0	9,0	54,0	50,1	95	89	9,0	9,0	50,2	49,2	
3	RGT Kilimanjaro	4	86	86	9,0	9,0	46,4	43,2	90	90	9,0	9,0	42,3	44,0	
4	Arkadia	6	95	95	9,0	9,0	48,4	47,2	97	92	9,0	9,0	48,8	48,3	
5	Linus	4	86	86	9,0	9,0	43,4	42,2	95	93	9,0	9,0	40,1	42,2	
6	Franz	3	95	95	9,0	9,0	43,3	42,2	98	95	9,0	9,0	41,2	43,5	
7	Hondia	5,5	96	92	9,0	9,0	51,0	45,4	94	92	8,3	8,7	47,3	45,9	
8	KWS Dakotana	3	84	84	9,0	9,0	45,4	43,1	85	86	8,0	8,5	42,3	44,0	
9	Belissa	5	89	88	9,0	9,0	46,7	45,4	91	90	9,0	9,0	45,3	45,3	
10	Pokusa	3	87	-	9,0	-	43,1	-	93	-	9,0	-	41,4	-	
11	Bonanza	4	87	-	9,0	-	39,3	-	90	-	9,0	-	39,9	-	
12	LG Jutta	5,5	91	-	9,0	-	40,0	-	87	-	9,0	-	37,2	-	

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian.

* - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 - bardzo mała)

Tab. 25. Pszenica ozima. Przedplon soja i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)	Zawartość białka (% s.m.)	Ilość glutenu (%)	Wskaźnik sedimentacji (ml)	Liczba opadania (sek.)
rzepak ozimy							
148 kg N/ha (RSM 32% w trzech dawkach)							
	Wzorzec		71,5	13,0	23,8	49	277
1	Artist	B	70,5	12,5	23,6	57	356
2	Patras	A	72,0	13,2	24,3	54	332
3	RGT Kilimanjaro	A	74,9	12,4	20,4	53	406
4	Arkadia	A	73,4	13,2	23,2	44	224
5	Linus	A	71,0	13,8	28,3	54	222
6	Franz	A	72,8	13,4	26,1	53	367
7	Hondia	A	71,9	13,3	23,7	48	335
8	KWS Dakotana	A	72,1	12,5	24,5	56	175
9	Belissa	B	69,8	13,6	23,5	44	243
10	Pokusa	B	70,1	13,0	24,5	44	233
11	Bonanza	B	69,0	12,2	21,6	38	171
12	LG Jutta	B	70,7	13,1	22,0	37	257
soja							
106 kg N/ha (RSM 32% w dwóch dawkach)							
	Wzorzec		68,8	13,8	25,9	49	260
1	Artist	B	69,5	13,8	25,1	60	328
2	Patras	A	71,1	13,7	25,4	51	316
3	RGT Kilimanjaro	A	71,1	13,7	24	33	364
4	Arkadia	A	68,6	13,5	25,3	46	185
5	Linus	A	67,4	14,5	27,4	53	275
6	Franz	A	68,3	13,6	27,2	51	268
7	Hondia	A	67,0	13,8	25,3	51	294
8	KWS Dakotana	A	71,1	13,6	27	57	150
9	Belissa	B	67,9	14,5	27,5	44	208
10	Pokusa	B	68,3	14,1	27,5	49	232
11	Bonanza	B	66,2	14,0	25,1	51	236
12	LG Jutta	B	69,3	13,2	24,4	46	264

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

A – odmiana jakościowa, B odmiana chlebowa

PRZEDPLON KUKURYDZA NA ZIARNO, OPÓŹNIONY TERMIN SIEWU

Kukurydza jest obecnie, obok rzepaku istotnym przedplonem dla pszenicy ozimej. Uprawiana na ziarno schodzi z pola na przełomie października i listopada. Celem prowadzonych doświadczeń było zbadanie, które z odmian pszenicy ozimej są najbardziej tolerancyjne na późny siew. Doświadczenia przeprowadzono w Głubczycach i Pągowie (w 2020 roku tylko w Pągowie). Prowadzono je na intensywnym poziomie agrotechniki. Wyniki przedstawiono w poniższych tabelach.

W Głubczycach średni plon ziarna był wysoki i wynosił w latach 2018-2019 91,9 dt/ha. Do wyżej plonujących odmian należały RGT Kilimanjaro, RGT Metronom i Franz. W Pągowie średni plon ziarna wynosił 59,4 dt/ha w 3-leciu i 61,8 dt/ha w latach 2018-2020. Do najwyższej plonujących należały odmiany Belissa, Arkadia i Formacja. Średnio z 2 miejscowości wyróżniały się Arkadia, Belissa, Formacja, RGT Kilimanjaro i RGT Bilanz.

Przy średniej wysokości roślin 76 cm, przeciętnym wyleganiu, masa tysiąca ziaren wynosiła 38,0 g. Większym wzrostem odznaczały się odmiany Franz, Linus, Medalistka i RGT Metronom, większą odpornością na wyleganie Franz, LG Jutta i RGT Bilanz, a wyższą mtz RGT Metronom, Medalistka, KWS Spencer i Artist. Do wyższych odmian w Pągowie należały Medalistka, Hondia, Formacja, Arkadia, Patras, Franz i Owacja, nie stwierdzono istotnych różnic w wyleganiu, a masa tysiąca ziaren była bardzo niska.

W porównaniu do przedplonu rzepak ozimy, pszenica ozima po kukurydzy na ziarno charakteryzowała się w Pągowie w 2020 roku średnio nieco niższą gęstością ziarna i wskaźnika sedymentacji, a wyższą zawartością białka, ilością glutenu i liczby opadania.



Tab. 26. Pszenica ozima. Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności. (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce, Pagów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020		2019			2018			2019-2020		2018-2019		2018-2020		2018-2019		2018-2020*	
		Pagów	Głubczyce	Pagów	średnia	Głubczyce	Pagów	średnia	Pagów	Pagów	średnia	Pagów	Głubczyce	Pagów	średnia	Pagów	Głubczyce	średnia	średnia
	Wzorzec dt / ha	54,7	88,9	73,4	81,2	94,9	50,2	72,5	64,1	61,8	59,4	91,9	76,9	61,8	61,8	91,9	76,9	61,8	61,8
1	Artist	113	103	97	100	100	102	101	105	100	104	102	102	104	100	104	102	100	105
2	Formacja	116	103	109	106	96	100	98	113	104	108	100	100	108	104	103	100	102	107
3	RGT Killmanjaro	110	105	102	104	104	96	100	106	99	103	106	105	103	99	103	105	102	105
4	Venecja	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Arkadia	134	98	99	99	100	104	102	117	101	112	99	100	112	101	99	100	100	112
6	Linus	93	93	88	88	104	95	99	88	89	90	99	94	90	93	99	94	90	93
7	Patras	104	93	101	97	95	101	98	103	101	102	94	98	102	101	94	98	100	100
8	Franz	79	101	96	98	107	98	102	88	97	91	104	100	91	97	104	100	93	93
9	Hondia	102	100	89	95	103	101	102	96	95	97	102	98	97	102	102	98	100	100
10	KWS Dakotana	85	96	114	105	102	95	98	100	105	98	99	102	98	102	99	102	96	96
11	Bellisa	121	102	119	110	94	95	95	120	107	112	98	103	103	107	98	103	103	109
12	Pokusa	114	96	96	96	95	103	99	105	99	104	96	98	104	99	96	98	103	103
13	Bonanza	103	100	93	96	103	94	98	94	93	97	102	99	97	102	97	102	99	99
14	Hybery F ₁	100	101	90	95	102	104	103	95	97	98	102	99	98	97	102	99	99	99
15	LG Jutta	86	107	92	99	97	107	102	89	99	95	102	102	95	99	102	102	101	96
16	Medalistka	91	100	97	99	94	101	97	94	99	96	97	98	96	99	96	97	98	96
17	KWS Spencer	79	91	97	94	99	100	100	88	99	92	95	97	92	99	92	95	97	91
18	KWS Firebird	93	99	91	95	97	97	97	92	94	94	98	96	94	94	98	96	95	95
19	RGT Metronom	103	105	96	100	104	97	101	100	96	99	105	101	99	101	105	101	101	101
20	RGT Bilanz	111	99	97	98	105	104	105	111	104	104	102	102	104	101	104	102	101	105
21	Tytanika	82	96	88	92	97	112	104	85	100	94	97	98	94	97	98	97	98	93
22	Owacja	90	98	107	103	97	103	100	99	105	100	98	102	100	105	100	98	102	98
23	Apostel	102	99	103	101	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Comandor	115	103	107	105	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Euforia	118	101	101	100	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Plejada	104	99	115	107	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Siera	87	108	108	108	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SY Orofino	83	94	96	95	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Titanus	100	105	88	97	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sikorka	87	100	106	103	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Lokata	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Admont	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Bosporus	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Bataja	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Lawina	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KWS Donovan	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	LG Keramik	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Moschus	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	RGT Specialist	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Opoka	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Godnik	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	SY Dubaj	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SY Yukon	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Tonnage	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian, F₁ – odmiana mieszańcowa

*w 2020 roku dane tylko z Pagowa

Tab. 27. Pszenica ozima. Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce, Pagów.
Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Zimotwałość *	Wysokość roślin (cm)						Wyleganie (skala 9°)						Masa 1000 ziaren (g)		
			2020	Pagów				2018-2019	2020	2018-2019	2019-2020	2018-2020	2018-2019	2019-2020	2018-2020	Głębzyce	Pagów
				2018-2019	2019-2020	2018-2020	Głębzyce										
			92	67	88	76	76	7,5	8,6	8,3	8,3	8,3	6,9	38,0	28,1		
1	Artist	4	88	66	86	73	74	8,0	9,0	8,5	8,7	9,0	7,7	40,0	26,5		
2	Formacja	4,5	100	70	94	80	76	7,5	9,0	8,3	8,5	8,5	8,5	38,5	27,3		
3	RGT Kilimanjaro	4	88	64	85	72	85	7,5	9,0	8,3	8,5	8,5	7,7	36,4	27,5		
4	Venecja	4	90	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
5	Arkadia	6	105	70	97	82	78	8,0	8,7	8,5	8,4	39,3	3,2	39,3	29,8		
6	Linus	4	90	68	84	75	80	7,0	8,7	8,0	8,1	8,1	6,8	36,4	27,3		
7	Patras	4	88	70	88	76	76	7,5	8,5	8,3	8,2	38,9	3,3	38,9	28,7		
8	Franz	3	92	70	90	77	82	6,5	9,0	7,8	8,2	39,4	9,0	39,4	26,4		
9	Hondia	5,5	93	71	89	78	73	7,5	8,7	8,3	8,3	37,9	8,7	37,9	28,5		
10	KWS Dakotana	3	90	66	86	74	73	7,5	8,0	8,3	7,8	36,0	6,2	36,0	28,5		
11	Belissa	5	90	66	85	74	78	8,0	9,0	8,5	8,7	38,5	5,7	38,5	28,5		
12	Pokusa	3	97	69	92	78	76	8,0	8,5	8,5	8,3	37,7	5,7	37,7	28,2		
13	Bonanza	4	93	68	87	76	78	8,0	8,5	8,5	8,3	28,3	6,8	28,3	28,2		
14	Hybery	3,5	100	69	92	79	75	8,0	9,0	8,5	8,7	39,1	7,5	39,1	29,6		
15	LG Jutta	5,5	83	62	78	69	73	8,5	8,5	8,8	8,5	38,0	8,5	38,0	28,0		
16	Medalistka	5,5	102	73	97	83	80	7,5	8,2	8,3	7,9	41,3	5,5	41,3	30,1		
17	KWS Spencer	4,5	85	67	84	73	75	8,0	8,8	8,5	8,6	41,1	5,8	41,1	31,8		
18	KWS Firebird	3,5	90	69	88	76	78	7,5	9,0	8,3	8,5	37,7	6,2	37,7	27,5		
19	RGT Metronom	4,5	88	68	86	75	80	7,5	8,5	8,3	8,2	41,9	8,0	41,9	30,6		
20	RGT Bilanz	4,5	93	65	87	74	73	8,0	8,3	8,5	8,2	28,9	8,7	28,9	26,3		
21	Tytanika	5	87	66	83	73	75	6,5	8,0	7,8	7,5	37,4	6,0	37,4	26,3		
22	Owacja	4,5	98	70	91	79	75	7,0	8,8	8,0	8,2	37,0	8,2	37,0	28,5		
23	Apostel	3,5	90	-	89	-	-	7,0	-	8,0	-	-	-	-	-		
24	Comandor	4,5	92	-	89	-	-	7,5	-	8,3	-	-	-	-	-		
25	Euforia	5,5	88	-	84	-	-	8,0	-	8,5	-	-	-	-	-		
26	Plejada	5	97	-	95	-	-	8,0	-	8,5	-	-	-	-	-		
27	Sfera	4	95	-	90	-	-	8,0	-	8,5	-	-	-	-	-		
28	SY Orofino	4	88	-	85	-	-	7,0	-	8,0	-	-	-	-	-		
29	Titanus	3	90	-	85	-	-	7,0	-	8,0	-	-	-	-	-		
30	Sikorka	3	87	-	86	-	-	7,0	-	8,0	-	-	-	-	-		
31	Lokata	5,5	90	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
32	Admont	4,5	90	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
33	Bosporus	4	93	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-		
34	Bataja	4,5	102	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
35	Lawina	4,5	87	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
36	KWS Donovan	3	93	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-		
37	LG Keramik	4	88	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
38	Moschus	3,5	100	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
39	RGT Specialist	3,5	87	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-		
40	Opoka	4,5	105	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-		
41	Godnik	3,5	80	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
42	SY Dubaj	4,5	98	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
43	SY Yukon	5	92	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-		
44	Tonnage	4	85	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-		

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian.

F₁ – odmiana mieszańcowa

* - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 - bardzo mała)

Tab. 28. Pszenica ozima. Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Pagów. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)			Zawartość białka (% s.m.)		Ilość glutenu (%)		Wskaźnik sedymentacji (ml)		Liczba opadania (sek.)						
			kukurydza na ziarno	rzepak ozimy	70,1	70,9	kukurydza na ziarno	rzepak ozimy	15,4	14,9	29,8	29,8	28,8	56	kukurydza na ziarno	rzepak ozimy	363	327
1	Artist	B	69,4	70,6	70,6	70,9	14,5	15,4	29,4	29,1	60	63	367	348				
2	Formacja	A	72,6	72,7	72,7	72,7	14,6	14,6	28,0	28,1	43	59	385	400				
3	RGT Kilimanjaro	A	74,8	75,2	75,2	75,2	15,6	15,1	26,7	27,5	52	46	420	429				
4	Venecja	B	69,3	69,8	69,8	69,8	15,8	14,5	28,9	29,4	63	56	337	373				
5	Arkadia	A	73,9	75,9	75,9	75,9	15,4	15,0	29,7	29,8	56	64	361	314				
6	Linus	A	62,8	67,9	67,9	67,9	19,0	17,0	36,6	34,6	63	52	300	154				
7	Patras	A	71,4	70,8	70,8	70,8	16,1	15,5	30,4	30,2	51	64	389	417				
8	Franz	A	72,4	71,8	71,8	71,8	16,1	15,7	30,9	31,1	53	54	412	413				
9	Hondia	A	65,9	70,2	70,2	70,2	16,9	15,6	30,0	27,4	52	64	380	340				
10	KWS Dakotana	A	70,3	71,5	71,5	71,5	17,1	14,9	31,6	27,6	55	62	303	289				
11	Belissa	B	69,5	70,0	70,0	70,0	17,2	15,5	32,5	29,6	50	58	402	315				
12	Pokusa	B	71,0	68,6	68,6	68,6	16,7	15,4	30,5	31,3	51	59	249	122				
13	Bonanza	B	69,7	69,2	69,2	69,2	15,9	14,3	28,4	26,4	57	58	309	214				
14	Hybery F ₁	B	70,1	72,1	72,1	72,1	16,3	14,0	26,9	23,2	37	40	217	236				
15	LG Jutta	B	71,5	63,9	63,9	63,9	14,6	15,2	25,7	30,9	35	46	353	418				
16	Medalistka	B	69,7	74,9	74,9	74,9	16,7	14,4	30,1	26,7	59	57	363	400				
17	KWS Spencer	A	70,3	71,8	71,8	71,8	15,2	15,1	26,6	26,1	54	64	393	399				
18	KWS Firebird	A	67,2	69,4	69,4	69,4	17,1	16,1	27,5	28,9	52	64	365	305				
19	RGT Metronom	A	67,0	71,6	71,6	71,6	18,5	14,9	34,8	30,5	59	62	376	471				
20	RGT Bilanz	B	71,5	73,5	73,5	73,5	15,0	14,3	27,8	26,2	60	64	403	391				
21	Tytanika	B	65,1	65,9	65,9	65,9	14,5	13,3	30,1	29,6	42	42	383	355				
22	Owacja	B	71,0	73,4	73,4	73,4	15,1	14,0	29,7	26,8	48	60	260	274				
23	Apostel	A	73,0	71,8	71,8	71,8	14,6	15,1	28,0	27,6	38	59	346	272				
24	Comandor	A	70,9	71,6	71,6	71,6	15,3	15,2	32,2	31,5	43	56	391	392				
25	Euforia	A	73,6	71,6	71,6	71,6	14,1	15,6	32,5	33,8	44	59	352	354				
26	Plejada	B	75,1	74,6	74,6	74,6	14,2	14,7	30,1	31,2	41	53	379	281				
27	Sfera	B	67,8	68,8	68,8	68,8	15,7	15,4	29,9	28,7	39	45	358	286				
28	SY Orofino	B	67,7	68,6	68,6	68,6	13,8	14,3	26,9	27,8	57	59	316	231				
29	Titanus	B	67,2	68,2	68,2	68,2	15,3	14,5	29,5	27,6	62	63	365	228				
30	Sikorka	C	70,9	71,6	71,6	71,6	14,3	14,5	28,9	28,9	38	56	299	344				
31	Lokata	A	71,0	72,7	72,7	72,7	13,3	15,1	28,7	30,7	40	54	415	293				
32	Admont	B	68,6	70,7	70,7	70,7	14,1	14,4	26,4	26,6	38	58	393	308				
33	Bosporus	B	68,0	69,3	69,3	69,3	15,0	15,1	28,9	31,1	46	56	372	326				
34	Batalja	B	72,8	71,3	71,3	71,3	14,1	14,2	26,6	27,7	52	62	364	353				
35	Lawina	C	68,6	69,1	69,1	69,1	14,8	14,4	31,5	27,3	30	31	388	269				
36	KWS Donovan	B	73,0	73,6	73,6	73,6	14,9	14,6	32,6	30,4	35	47	397	317				
37	LG Keramik	B	71,5	71,3	71,3	71,3	14,6	15,2	30,7	29,6	60	64	344	336				
38	Moschus	A	72,8	73,3	73,3	73,3	16,1	15,9	36,2	34,4	63	66	455	500				
39	RGT Specialist	B	70,1	73,5	73,5	73,5	15,0	14,0	29,2	26,1	45	56	400	331				
40	Opoka	A	72,9	-	-	-	14,6	14,5	31,5	28,8	48	60	420	355				
41	Godnik	C	64,1	68,1	68,1	68,1	16,2	15,0	29,6	26,2	46	54	396	298				
42	SY Dubaj	A	72,7	73,8	73,8	73,8	15,7	15,1	34,3	29,7	66	67	398	411				
43	SY Yukon	B	72,1	71,5	71,5	71,5	15,0	15,9	29,4	29,6	63	68	408	353				
44	Tonnage	C	66,1	65,9	65,9	65,9	13,6	12,9	24,0	18,8	31	30	274	169				

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

F₁ – odmiana mieszańcowa;

A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna

PRZEDPLON BURAK CUKROWY, OPTYMALNY TERMIN SIEWU

Doświadczenia przeprowadzono w Głubczycach w latach 2018-2020, na intensywnym poziomie agrotechniki. Wyniki porównano dla tych samych odmian z przedplonem rzepak ozimy i przedstawiono je w poniższych tabelach.

W 3-leciu pszenica ozima wyżej plonowała po rzepaku ozimym niż po buraku cukrowym. Średnia różnica w plonowaniu wynosiła 15,4 dt/ha. Najlepiej po buraku cukrowym plonowały odmiany Artist, Linus, Arkadia, RGT Bilanz, KWS Dakotana i RGT Metronom.

Średnia wysokość roślin i wyleganie oraz mtz były niższe po buraku cukrowym. W badaniach jakościowych niższe były wartości gęstości zsypanej ziarna, zawartości białka, ilości glutenu i wskaźnika sedymentacji, a nieco wyższe liczby opadania po buraku cukrowym w stosunku do rzepaku ozimego.

Tab. 29. Pszenica ozima. Przedplon burak cukrowy i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020		2019		2018		2018-2020	
		burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy
	Wzorzec dt /ha	94,4	110,0	88,6	105,5	104,1	117,8	95,7	111,1
1	Artist	104	104	109	102	102	103	105	103
2	Formacja	101	102	101	102	99	103	100	102
3	RGT Kilimanjaro	107	105	98	103	99	106	102	105
4	Venecja	102	99	-	-	-	-	-	-
5	Arkadia	105	104	108	105	99	105	104	104
6	Linus	107	102	106	107	103	99	105	103
7	Patras	100	98	102	99	99	101	101	99
8	Franz	89	97	99	99	102	97	96	98
9	Hondia	97	96	92	92	100	102	96	97
10	KWS Dakotana	106	101	102	102	101	100	103	101
11	Belissa	94	96	101	97	97	100	98	98
12	Pokusa	108	99	98	102	93	96	100	99
13	Bonanza	98	101	96	88	104	102	99	97
14	Hybery F ₁	81	101	100	100	101	106	94	102
15	LG Jutta	104	102	85	90	98	94	96	95
16	Medalistka	104	107	99	100	93	103	99	103
17	KWS Spencer	95	103	99	103	102	100	99	102
18	KWS Firebird	95	95	93	93	99	100	96	96
19	RGT Metronom	113	102	96	87	100	100	103	96
20	RGT Bilanz	97	98	105	104	109	105	104	102
21	Tytanika	95	94	93	99	97	96	95	96
22	Owacja	102	99	98	104	92	95	97	99
23	Apostel	105	98	106	100	-	-	-	-
24	Comandor	101	98	101	103	-	-	-	-
25	Euforia	96	98	106	98	-	-	-	-
26	Plejada	85	97	101	104	-	-	-	-
27	Sfera	93	96	96	101	-	-	-	-
28	SY Orofino	97	98	101	100	-	-	-	-
29	Titanus	103	99	106	102	-	-	-	-
30	Sikorka	113	108	99	104	-	-	-	-
31	Lokata	96	101	-	-	-	-	-	-
32	Admont	98	97	-	-	-	-	-	-
33	Bosporus	110	101	-	-	-	-	-	-
34	Bataja	95	100	-	-	-	-	-	-
35	Lawina	105	99	-	-	-	-	-	-
36	KWS Donovan	118	111	-	-	-	-	-	-
37	LG Keramik	95	101	-	-	-	-	-	-
38	Moschus	89	92	-	-	-	-	-	-
39	RGT Specialist	103	103	-	-	-	-	-	-
40	Opoka	101	102	-	-	-	-	-	-
41	Godnik	105	101	-	-	-	-	-	-
42	SY Dubaj	84	94	-	-	-	-	-	-
43	SY Yukon	87	95	-	-	-	-	-	-
44	Tonnage	113	103	-	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń				1				3	

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian;

F₁ – odmiana mieszańcowa

Tab. 30. Pszenica ozima. Przedplon burak cukrowy i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość* (skala 9°)	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)			
			2020		2018-2020		2020		2018-2020		2020		2018-2020	
			burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy
1	Wzorzec													
1	Artist	4	86	90	83	86	8,9	9,0	7,4	6,6	44,1	44,0	40,6	41,1
2	Formacja	4,5	83	92	84	87	9,0	9,0	8,3	7,0	46,7	46,7	43,3	43,5
3	RGT Kilimanjaro	4	84	86	79	83	9,0	9,0	8,1	9,0	40,9	41,5	38,8	40,0
4	Venecja	4	88	90	-	-	9,0	9,0	8,2	6,3	44,3	46,4	40,0	41,9
5	Arkadia	6	95	95	89	94	9,0	9,0	6,6	6,3	44,3	45,0	-	-
6	Linus	4	87	86	82	83	9,0	9,0	7,1	6,3	48,6	48,4	44,7	45,9
7	Patras	4	90	93	85	87	9,0	9,0	6,3	6,3	43,2	43,4	40,3	40,5
8	Franz	3	86	95	85	89	9,0	9,0	7,2	6,3	53,0	54,0	47,7	47,7
9	Hondia	5,5	85	96	85	88	9,0	9,0	8,4	7,7	42,2	43,3	39,7	40,5
10	KWS Dakotana	3	84	84	80	82	9,0	9,0	6,3	6,3	45,8	51,0	42,6	44,1
11	Belissa	5	82	89	79	85	9,0	9,0	7,1	6,3	44,9	45,4	39,7	40,8
12	Pokusa	3	84	87	82	84	9,0	9,0	7,2	6,5	43,1	43,1	40,0	40,5
13	Bonanza	4	86	87	84	84	9,0	9,0	6,3	6,3	42,3	39,3	38,9	39,0
14	Hybery F ₁	3,5	91	92	88	87	8,7	9,0	8,8	6,5	41,7	43,7	40,0	38,9
15	LG Jutta	5,5	88	91	80	83	9,0	9,0	8,3	6,3	41,5	40,0	35,2	35,9
16	Medalistka	5,5	91	97	87	93	9,0	9,0	6,9	6,3	44,8	41,9	42,8	43,6
17	KWS Spencer	4,5	87	89	84	86	8,7	9,0	6,3	6,3	50,2	50,2	44,7	45,9
18	KWS Firebird	3,5	85	90	84	85	8,7	9,0	7,9	6,3	40,8	36,4	37,7	36,2
19	RGT Metronom	4,5	90	96	86	91	8,7	9,0	7,0	6,3	50,4	47,6	44,6	43,6
20	RGT Bilanz	4,5	86	92	83	86	9,0	9,0	8,1	6,3	44,6	45,2	42,6	42,7
21	Tytanika	5	89	86	83	83	9,0	9,0	6,4	6,3	36,7	38,3	34,2	36,0
22	Owacja	4,5	83	86	81	84	9,0	9,0	8,7	8,0	42,4	41,1	38,8	39,3
23	Apostel	3,5	87	89	-	-	8,7	9,0	-	-	48,9	47,5	-	-
24	Comandor	4,5	90	90	-	-	9,0	9,0	-	-	40,5	41,1	-	-
25	Euforia	5,5	79	89	-	-	8,7	9,0	-	-	43,5	42,5	-	-
26	Plejada	5	93	98	-	-	8,7	9,0	-	-	45,4	44,9	-	-
27	Sfera	4	87	92	-	-	8,7	9,0	-	-	41,3	41,8	-	-
28	SY Orofino	4	86	88	-	-	9,0	9,0	-	-	46,2	47,1	-	-
29	Titanius	3	86	89	-	-	9,0	9,0	-	-	45,9	44,3	-	-
30	Sikorka	3	86	83	-	-	8,7	9,0	-	-	46,0	44,0	-	-
31	Lokata	5,5	95	91	-	-	9,0	9,0	-	-	44,3	42,4	-	-
32	Admont	4,5	87	87	-	-	9,0	9,0	-	-	40,9	41,2	-	-
33	Bosporus	4	90	95	-	-	9,0	9,0	-	-	44,3	39,9	-	-
34	Bataja	4,5	83	85	-	-	8,7	9,0	-	-	42,9	44,6	-	-
35	Lawina	4,5	84	87	-	-	9,0	9,0	-	-	37,1	39,2	-	-
36	KWS Donovan	3	80	89	-	-	9,0	9,0	-	-	43,1	43,9	-	-
37	LG Keramik	4	77	88	-	-	8,7	9,0	-	-	42,3	50,8	-	-
38	Moschus	3,5	91	95	-	-	9,0	9,0	-	-	43,9	41,6	-	-
39	RGT Specialist	3,5	79	83	-	-	8,7	9,0	-	-	42,6	43,6	-	-
40	Opoka	4,5	93	93	-	-	9,0	9,0	-	-	49,3	42,7	-	-
41	Godnik	3,5	84	84	-	-	8,7	9,0	-	-	39,3	39,7	-	-
42	SY Dubaj	4,5	92	94	-	-	9,0	9,0	-	-	46,5	48,3	-	-
43	SY Yukon	5	87	93	-	-	8,7	9,0	-	-	43,4	44,9	-	-
44	Tonnage	4	85	84	-	-	9,0	9,0	-	-	44,4	43,2	-	-
Liczba doświadczeń			1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, F₁ – odmiana mieszańcowa

* - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała)

Tab. 31. Pszenica ozima. Przedplon burak cukrowy i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Klasa jakości	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)		Zawartość białka (% s.m.)		Ilość glutenu (%)		Wskaźnik sedimentacji (ml)		Liczba opadania (sek.)		
			burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	burak cukrowy	rzepak ozimy	
			70,0	71,5	12,7	13,3	22,6	23,7	49	53	293	278	
Wzorzec													
1	Artist	B	70,5	70,5	12,8	12,5	24,6	23,6	54	57	285	356	
2	Formacja	A	69,7	70,9	12,5	13,1	23,9	24,8	41	44	333	290	
3	RGT Kilimanjaro	A	73,4	74,9	12,5	12,4	21,5	20,4	46	53	385	406	
4	Venecja	B	69,8	70,5	12,5	12,7	23,0	24,5	54	57	196	308	
5	Arkadia	A	73,8	73,4	12,7	13,2	20,7	23,2	41	44	315	224	
6	Linus	A	70,9	71,0	13,4	13,8	26,1	28,3	45	54	234	222	
7	Patras	A	71,8	72,0	14,0	13,2	23,2	24,3	49	54	329	332	
8	Franz	A	72,2	72,8	13,8	13,4	27,2	26,1	53	53	322	367	
9	Hondia	A	71,7	71,9	12,8	13,3	22,4	23,7	50	48	340	335	
10	KWS Dakotana	A	72,0	72,1	12,7	12,5	23,9	24,5	50	56	180	175	
11	Belissa	B	68,7	69,8	13,4	13,6	23,9	23,5	44	44	345	243	
12	Pokusa	B	70,0	70,1	12,3	13,0	22,2	24,5	43	44	271	233	
13	Bonanza	B	69,3	69,0	12,7	12,2	21,1	21,6	36	38	151	171	
14	Hybery	F1	B	67,3	69,6	12,9	11,9	21,4	17,9	33	32	182	226
15	LG Jutta	B	69,4	70,7	11,9	13,1	21,0	22,0	41	37	265	257	
16	Medalistka	B	72,3	73,5	12,2	13,6	22,4	21,4	54	42	321	332	
17	KWS Spencer	A	71,5	73,5	12,0	14,9	20,2	21,7	64	56	390	327	
18	KWS Firebird	A	67,8	68,9	12,7	14,4	22,2	24,2	63	54	367	328	
19	RGT Metronom	A	69,0	73,5	13,5	14,9	25,5	25,0	62	51	362	325	
20	RGT Bilanz	B	69,4	72,5	12,6	15,4	21,6	23,7	58	54	372	344	
21	Tytanika	B	67,2	68,6	12,2	13,9	22,4	24,1	42	35	284	252	
22	Owacja	B	71,1	73,2	12,4	14,2	20,7	24,8	43	44	228	258	
23	Apostel	A	71,2	72,6	13,1	15,5	20,1	23,4	41	40	200	197	
24	Comandor	A	71,4	71,3	12,7	14,7	23,3	27,1	44	39	342	364	
25	Euforia	A	70,6	73,3	13,3	16,1	25,3	28,4	56	48	370	281	
26	Plejada	B	73,5	75,5	13,0	16,2	24,2	25,9	52	46	271	239	
27	Sfera	B	66,9	69,8	12,6	14,9	19,2	20,9	35	33	255	255	
28	SY Orofino	B	67,7	71,6	12,4	15,1	21,2	24,5	50	49	209	206	
29	Titanus	B	67,4	71,6	12,4	12,4	21,3	21,7	59	37	274	262	
30	Sikorka	C	70,2	71,0	12,2	12,5	21,5	24,0	38	46	282	228	
31	Lokata	A	71,8	73,2	13,1	13,2	25,8	26,4	56	53	364	289	
32	Admont	B	69,2	71,4	12,7	12,4	21,7	23,5	47	41	257	239	
33	Bosporus	B	70,7	71,1	11,4	12,3	20,5	23,5	44	44	299	218	
34	Bataja	B	70,0	71,0	12,6	12,1	21,8	22,1	54	50	330	243	
35	Lawina	C	69,4	71,2	12,6	11,8	20,6	21,3	27	24	240	228	
36	KWS Donovan	B	71,4	73,4	12,3	12,8	22,3	23,8	44	42	317	285	
37	LG Keramik	B	67,7	71,8	13,1	13,0	23,1	25,3	61	56	317	309	
38	Moschus	A	71,1	71,8	13,8	13,6	27,0	27,9	64	63	404	422	
39	RGT Specialist	B	70,2	73,3	13,4	12,6	23,9	26,0	52	50	285	239	
40	Opoka	A	69,5	73,4	12,7	12,5	22,2	27,1	48	46	228	264	
41	Godnik	C	68,5	69,4	11,3	9,7	18,1	18,8	40	39	261	255	
42	SY Dubaj	A	70,9	71,8	14,1	13,2	27,1	24,7	68	364	429	364	
43	SY Yukon	B	69,3	70,5	13,5	13,5	24,1	25,6	65	67	397	411	
44	Tonnage	C	66,3	67,0	10,9	10,4	17,0	13,9	28	22	110	113	

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

F₁ – odmiana mieszańcowa;

E – odmiana elitarna, A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebową, C – odmiana pastewna lub inna

PORÓWNANIE PLONOWANIA ODMIAN W RÓŻNYCH WARIANTACH AGROTECHNICZNYCH

Poniżej w tabelach przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w różnych wariantach agrotechnicznych w Głubczycach, Łosiowie i Pągowie. Średnio w latach 2018-2020 w Głubczycach najwyżej pszenica ozima plonowała po rzepaku ozimym (111,1 dt/ha), a najslabiej po pszenicy ozimej (88,8 dt/ha). W 2-leciu 2019-2020 plon ziarna po buraku cukrowym był o 1,3 dt/ha wyższy niż po pszenicy ozimej. Średnio z wszystkich wariantów agrotechnicznych, przy plonie 98,5 dt/ha do najwyżej w 3-leciu plonujących odmian należały Arkadia, RGT Bilanz, Artist, RGT Kilimanjaro i Linus.

W Łosiowie średni plon ziarna pszenicy ozimej w optymalnym terminie siewu po rzepaku ozimym w latach 2019-2020 był wyższy tylko o 2,6 dt/ha niż po pszenicy ozimej. Do wyżej plonujących średnio w 2-leciu odmian należały Artist, RGT Kilimanjaro, Apostel, Plejada, Arkadia, Comandor i KWS Dakotana.

W Pągowie plon ziarna pszenicy ozimej po rzepaku ozimym był wyraźnie wyższy niż po kukurydzy na ziarno. W latach 2018-2020 różnica wynosiła aż 28,6, a w dwuleciu 22,5 dt/ha. Średnio wyżej plonowały odmiany Arkadia, Formacja, Artist i RGT Bilanz oraz Euforia i Plejada..

Tab. 32. Pšenica ozima. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2 .
Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Optymalny termin siewu przedplon rzepak ozimy			Optymalny termin siewu przedplon burak cukrowy			Optymalny termin siewu przedplon pszenica ozima			Opóźniony termin siewu przedplon kukurydza			Średnia	
		2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2018-2020	2019-2020	2018-2020	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	110,0	107,7	111,1	94,4	91,5	95,7	101,4	90,2	88,8	91,9	101,9	101,9	96,5	98,5
1	Artist	104	103	103	104	106	105	101	102	101	102	103	103	104	103
2	Formacja	102	102	102	101	101	100	100	101	99	100	101	101	101	101
3	RGT Killmanjaro	105	104	105	107	103	102	100	101	102	105	106	106	103	103
4	Veneja	99	-	-	102	-	-	102	-	-	-	101	101	-	-
5	Arkadia	104	104	104	105	107	104	107	107	103	99	105	105	106	104
6	Linus	102	104	103	106	106	105	96	99	102	99	102	102	103	103
7	Patras	98	99	99	100	101	101	99	101	101	94	99	99	100	100
8	Franz	97	98	98	89	94	96	100	100	102	104	95	97	97	99
9	Hondia	96	94	97	97	94	96	95	96	96	102	96	96	95	96
10	KWS Dakotana	101	101	101	106	104	103	94	99	102	99	100	101	101	102
11	Belissa	96	97	98	94	98	98	99	103	100	98	96	96	99	98
12	Pokusa	99	101	99	108	103	100	97	98	97	96	101	101	101	99
13	Bonanza	101	94	97	98	97	99	92	93	96	102	97	97	95	98
14	Hybery	101	100	102	81	91	94	106	101	103	102	96	97	102	100
15	LG Jutta	102	96	95	104	95	96	95	92	95	102	100	100	94	95
16	Medalistka	107	103	103	104	101	99	104	102	101	97	105	105	102	101
17	KWS Spencer	103	103	102	95	97	99	95	100	99	95	100	100	100	100
18	KWS Firebird	95	94	96	95	94	96	96	96	96	98	96	96	95	96
19	RGT Metronom	102	95	96	113	104	103	105	104	93	105	107	107	101	97
20	RGT Bilanz	98	101	102	97	101	104	106	109	108	102	100	100	104	104
21	Tyranika	94	96	96	95	94	95	101	94	97	97	97	97	95	96
22	Owacja	99	101	99	102	100	97	96	98	105	98	99	99	100	101
23	Apostel	98	99	-	105	105	-	97	101	-	-	100	102	102	-
24	Comandor	98	100	-	101	101	-	96	100	-	-	98	100	100	-
25	Euforia	98	98	-	96	101	-	103	106	-	-	99	99	102	-
26	Plejada	97	101	-	85	93	-	98	102	-	-	93	93	99	-
27	Sfera	96	98	-	93	95	-	96	98	-	-	95	95	97	-
28	SY Orofino	98	99	-	97	99	-	123	112	-	-	106	103	103	-
29	Titanus	99	101	-	103	105	-	106	99	-	-	103	102	102	-
30	Sikorka	108	106	-	113	106	-	96	98	-	-	106	103	103	-
31	Lokata	101	-	-	96	-	-	99	-	-	-	99	-	-	-
32	Admont	97	-	-	98	-	-	95	-	-	-	97	-	-	-
33	Bosporus	101	-	-	110	-	-	101	-	-	-	104	-	-	-
34	Bataja	100	-	-	95	95	-	100	-	-	-	98	-	-	-
35	Lawina	99	-	-	105	-	-	93	-	-	-	99	-	-	-
36	KWS Donovan	111	-	-	118	-	-	106	-	-	-	112	-	-	-
37	LG keramik	101	-	-	101	-	-	95	102	-	-	99	-	-	-
38	Moschus	92	-	-	89	-	-	95	-	-	-	92	-	-	-
39	RGT Specialist	103	-	-	103	-	-	100	-	-	-	102	-	-	-
40	Opoka	102	-	-	101	-	-	101	-	-	-	102	-	-	-
41	Godnik	101	-	-	105	-	-	102	-	-	-	103	-	-	-
42	SY Dubaj	94	-	-	84	-	-	98	-	-	-	92	-	-	-
43	SY Yukon	95	-	-	87	-	-	91	-	-	-	91	-	-	-
44	Tonnage	103	-	-	113	-	-	101	-	-	-	106	-	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian;

F₁ – odmiana mieszańcowa;

LOZ – Lista Odmian Zalecanych, w- odmiany zalecane wstępnie

Tab. 33. Pszenica ozima. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2 . Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Optymalny termin siewu przedplon rzepak ozimy			Optymalny termin siewu przedplon pszenica ozima		Średnia	
			2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2020	2019-2020
Wzorzec dt/ha			85,1	86,7	85,0	80,1	84,1	82,6	85,4
1	Artist	LOZ	110	113	113	102	104	106	108
2	Formacja	LOZ	114	108	105	100	99	107	104
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	107	111	107	106	106	107	108
4	Venecja	LOZ w	109	-	-	102	-	105	-
5	Arkadia	LOZ	102	103	103	104	109	103	106
6	Linus	LOZ	99	105	103	96	97	97	101
7	Patras		94	105	105	100	102	97	104
8	Franz		108	105	104	95	93	102	99
9	Hondia		103	102	99	93	96	98	99
10	KWS Dakotana	LOZ	102	104	105	108	106	105	105
11	Belissa		102	108	104	104	101	103	104
12	Pokusa		99	102	101	98	102	98	102
13	Bonanza		102	100	99	97	98	100	99
14	Hybery	F ₁	109	97	99	109	102	109	100
15	LG Jutta		96	93	99	97	93	96	93
16	Medalistka	LOZ	99	98	100	108	105	104	101
17	KWS Spencer		99	100	98	95	99	97	100
18	KWS Firebird		87	85	87	87	88	87	87
19	RGT Metronom		89	96	99	102	99	96	98
20	RGT Bilanz	LOZ	97	94	98	100	102	99	98
21	Tytanika		86	86	89	91	88	88	87
22	Owacja	LOZ	103	105	102	102	101	102	103
23	Apostel		102	107	-	105	107	103	107
24	Comandor		99	106	-	103	107	101	106
25	Euforia		98	97	-	95	102	96	99
26	Plejada	LOZ	98	105	-	104	109	101	107
27	Sfera		98	89	-	88	91	93	90
28	SY Orofino		105	96	-	98	98	101	97
29	Titanus		103	96	-	99	95	101	96
30	Sikorka		97	97	-	105	102	101	99
31	Lokata		90	-	-	107	-	99	-
32	Admont		99	-	-	101	-	100	-
33	Bosporus		89	-	-	100	-	94	-
34	Bataja		105	-	-	108	-	107	-
35	Lawina		104	-	-	99	-	102	-
36	KWS Donovan	LOZ w	110	-	-	109	-	109	-
37	LG Keramik		96	-	-	104	-	100	-
38	Moschus		85	-	-	93	-	89	-
39	RGT Specialist	LOZ w	113	-	-	102	-	107	-
40	Opoka	LOZ w	100	-	-	93	-	97	-
41	Godnik		103	-	-	100	-	101	-
42	SY Dubaj		108	-	-	101	-	104	-
43	SY Yukon		100	-	-	96	-	98	-
44	Tonnage		84	-	-	94	-	89	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian;

F₁ – odmiana mieszańcowa;

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

w- odmiany zalecane wstępnie

Tab. 34. Pszenica ozima. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Pągów.
Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Optymalny termin siewu przedplon rzepak ozimy			Opóźniony termin siewu przedplon kukurydza na ziarno			Średnia		
			2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha			102,6	101,5	98,0	84,7	79,0	69,4	93,6	90,3	83,7
1	Artist	LOZ	109	107	108	113	105	104	111	106	106
2	Formacja	LOZ	112	106	106	116	112	108	114	109	107
3	RGT Kilimanjaro	LOZ	108	104	104	110	106	103	109	105	103
4	Venecja	LOZ w	115	-	-	103	-	-	109	-	-
5	Arkadia	LOZ	112	108	110	134	116	112	123	112	111
6	Linus	LOZ	97	101	102	92	87	90	94	94	96
7	Patras		74	87	91	104	103	102	89	95	97
8	Franz		105	105	107	79	88	91	92	97	99
9	Hondia		100	95	96	102	96	98	101	95	97
10	KWS Dakotana	LOZ	86	97	99	85	99	98	85	98	99
11	Belissa		90	95	97	121	120	112	105	108	104
12	Pokusa		95	96	96	114	105	104	104	100	100
13	Bonanza		113	103	104	103	98	97	108	101	100
14	Hybery	F ₁	123	111	106	100	95	98	112	103	102
15	LG Jutta		95	91	95	86	89	95	90	90	95
16	Medalistka	LOZ	108	103	100	91	94	97	100	99	98
17	KWS Spencer		100	101	98	79	88	92	90	95	95
18	KWS Firebird		90	94	96	93	92	94	91	93	95
19	RGT Metronom		92	93	97	103	100	99	98	96	98
20	RGT Bilanz	LOZ	98	105	105	111	104	104	104	104	105
21	Tytanika		91	89	85	82	85	94	87	87	90
22	Owacja	LOZ	105	102	101	90	99	100	98	100	101
23	Apostel		110	107	-	102	103	-	106	105	-
24	Comandor		85	94	-	115	111	-	100	102	-
25	Euforia		108	110	-	118	109	-	113	110	-
26	Plejada	LOZ	104	108	-	104	109	-	104	109	-
27	Sfera		98	97	-	87	98	-	93	98	-
28	SY Orofino		91	101	-	83	89	-	87	95	-
29	Titanus		89	94	-	100	94	-	95	94	-
30	Sikorka		100	103	-	87	96	-	93	100	-
31	Lokata		89	-	-	104	-	-	96	-	-
32	Admont		109	-	-	107	-	-	108	-	-
33	Bosporus		98	-	-	77	-	-	88	-	-
34	Bataja		89	-	-	110	-	-	100	-	-
35	Lawina		86	-	-	82	-	-	84	-	-
36	KWS Donovan	LOZ w	125	-	-	101	-	-	113	-	-
37	LG Keramik		108	-	-	132	-	-	120	-	-
38	Moschus		101	-	-	94	-	-	98	-	-
39	RGT Specialist	LOZ w	88	-	-	98	-	-	93	-	-
40	Opoka	LOZ w	126	-	-	105	-	-	116	-	-
41	Godnik		84	-	-	73	-	-	79	-	-
42	SY Dubaj		112	-	-	118	-	-	115	-	-
43	SY Yukon		102	-	-	109	-	-	106	-	-
44	Tonnage		82	-	-	81	-	-	82	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian;

F₁ – odmiana mieszańcowa;

LOZ – Lista Odmian Zalecanych, w- odmiany zalecane wstępnie

PSZENICA OZIMA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA	ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9°	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020	
						a1	a2
1	ARKADIA	2011	2012	A	6	100	106
2	ARTIST	2013	2016	B	4	107	109
3	FORMACJA	2017	2021	A	4,5	104	102
4	KWS DAKOTANA	2014	2016	A	3	103	101
5	KWS DONOVAN	2019	2021 w	B	3	111**	112**
6	LINUS	2011	2012	A	4	102	104
7	MEDALISTKA	2016	2020	B	5,5	102	99
8	OPOKA	2019	2021 w	A	4,5	105**	108**
9	OWACJA	2017	2020	B	4,5	101	101
10	PLEJADA	2018	2020	B	5	108*	104*
11	RGT BILANZ	2017	2020	B	4,5	104	103
12	RGT KILIMANJARO	2014	2017	A	4	103	105
13	RGT SPECJALIST	2019	2021 w	B	4	109**	102**
14	WENECJA	2019	2021 w	B	4	107**	108**

KR – Krajowy Rejestr Odmian

w – odmiana zalecana wstępnie

A – odmiana jakościowa

B – odmiana chlebowa

3 – 6 – zimotrwałość w skali 9o

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

a1 – 82,2 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a2 – 94,7 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

*- dla odmiany Plejada wzorzec z lat 2019-2020 (a1 – 84,0 dt/ha a2 – 95,4 dt/ha)

** - dla odmian KWS Donovan, Opoka, RGT Specjalist, Wenecja wzorzec z 2020 roku (a1 – 86,3 dt/h a2 – 97,9 dt/ha)

2. JĘCZMIENŃ OZIMY

Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doбором - 18 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doбором wojewódzkim - 16 odmian. Badania przeprowadzono na dwóch poziomach agrotechniki: a1 – przeciętny, a2 – intensywny. Łącznie w latach 2018-2020 wykonano 12 doświadczeń. W ostatnim roku tylko 1 odmiana była polskiej hodowli (Zenek), a pozostałe pochodziły z Niemiec. Tabele poniżej zawierają przegląd warunków agrotechnicznych, pochodzenie odmian oraz wyniki plonowania i ważniejsze właściwości rolnicze w 2020 roku.

Średni plon ziarna w 3-leciu, na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosił 80,6 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany Jakubus, KWS Kosmos i Zenek. Na poziomie intensywnym przyrost plonu ziarna w latach 2018-2020 wyniósł średnio 14,1 dt/ha, a do czołowych należały odmiany Jakubus i KWS Kosmos. Plon ziarna wahał się od 76,9 dt/ha w Bąkowie do 89,6 dt/ha w Głubczycach na przeciętnym i od 87,1 dt/ha w Bąkowie do 105,1 dt/ha w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki. W Głubczycach na poszerzonym doborze najwyżej plonowały odmiany KWS Higgins, Jakubus, KWS Astaire, KWS Kosmos oraz Yukon i Impala.

Odmiany cechowały się średnio niższym wzrostem, mniejszym wyleganiem, wyższą mtz oraz zawartością białka na intensywnym poziomie agrotechniki. Z chorób grzybowych w ostatnim roku w większym nasileniu wystąpiły rdza jęczmienia i brunatna plamistość.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

JAKUBUS, KWS HIGGINS, KWS KOSMOS, ZENEK, ZITA 2 rz oraz KWS FLEMMING i SU LAUTINE wstępnie.

Tab. 35. Jęczmień ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020

Miejscowość		Głubczyce	Bąków	Łosiów	Pągów
Powiat		Głubczyce	Kluczbork	Brzeg	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	2	2	2
Klasa bonitacyjna gleby		II	IVa	IIIb	IIIa
pH gleby w KCl		6,9	6,4	6,7	6,6
Przedplon		Burak cukrowy	Rzepak ozimy		
Data siewu (dzień, m-c, rok)		23.09	23.09	26.09	28.09
Obsada roślin (szt./m ²)		300			
Data zbioru (dzień, m-c, rok)		10.07	13.07	07.07	15.07
Nawożenie mineralne					
N na poziomie	a ₁ (kg/ha)	79	66	50	114
	a ₂ (kg/ha)	119	106	90	154
P ₂ O ₅ (kg/ha)		40	40	0	27
K ₂ O (kg/ha)		79	60	0	65
Nawożenie dolistne na poziomie a ₂ (kg,g,l/ha)		Basfoliar 6-12-6 – 5 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu-1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Basfoliar 36 Extra – 5 + ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + MgSO ₄ – 5 Basfoliar 36 Extra – 5	MgSO ₄ – 5 + ADOB Mn – 3 + ADOBCu – 1 + ADOBZn – 0,5 + Basfoliar 36 Extra – 5 MgSO ₄ – 5	Plonvit – 2 + Nitromag – 4 + ADOB B – 0,15
Środki ochrony roślin					
Zaprawa nasienna (nazwa)		Kinto Duo 080 FS			
Herbicydy (l,g/ha)		Glean 75 WG – 4,5 + Arubis 50 SG – 6,25 + Adiunkt 500 SC – 0,05 + Bizon – 1 + Boxer 800EC 1,25	Bizon - 1	Maraton 375 SC - 4	Komplet 560 SC – 0,5 + Glean 75 WG - 5
Insektycydy (l,g/ha)		Insodex 480 EC – 0,2 Los Ovados 200 SE – 0,02 + Karate Zeon 050 SC – 0,02 Danadim 400 EC – 0,5 + Decis Mega 50 EW – 0,1	Inazuma 130 WG – 150 Karate Zeon 050 SC – 0,12	Delmetros 100 SC – 0,05 Deluz 050 – 0,1	Sparviero – 0,075 Inazuma 130 WG – 150
Tylko na poziomie a ₂					
Fungicydy jesienią (l/ha)		-			
Fungicydy – pierwszy zabieg (l/ha)		Adexar Plus – 1,5 + Tilt Turbo 575 EC – 0,5	Adexar Plus – 1,5		Capalo 337,5 SE – 1,5
Fungicydy - drugi zabieg (l/ha)		Duet Star 334 SE – 0,6 + Tern 750 EC – 0,1	Duet Star 334 SE - 1		-
Regulatory wzrostu – pierwszy zabieg (l,kg/ha)		Cuadro NT 50 EC – 0,2 + Stabilar 750 SL – 0,5	Moddus 250 EC – 0,2 + Stabilar 750 SL – 0,75	Moddus 250 EC – 0,2 + Stabilar 750 SL – 0,8	Medax Max – 0,7
Regulatory wzrostu – drugi zabieg (l,kg/ha)		Medax Max – 0,15	-	Moddus 250 EC – 0,2 + Cerone 480 SL – 0,3	-

Tab. 36. Jęczmień ozimy. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej – pełnomocnika w Polsce
1	Jakubus	2017	2020	DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
2	KWS Kosmos	2015	2016	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
3	Mirabelle	2018		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
4	Titus	2012		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
5	Zenek	2013	2017	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
6	SU Vireni 2rz	2014		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
7	Quadriga	2015		DE	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
8	KWS Astaire	2016		DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
9	KWS Higgins	2016	2021	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
10	Zita 2rz	2017	2020	DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
11	Impala	2018		DE	DSV Polska sp. z o.o.
12	SU Jule	2018		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
13	Yukon	2018		DE	IGP Polska sp. z o.o.
14	KWS Flemming	2019	2021 w	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
15	Melia	2019		DE	IGP Polska sp. z o.o.
16	SU Lautine	2019	2021 w	DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec

* LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiana Titus w latach 2013-2020 na LOZ)

2rz – odmiana dwurzędowa

Tab. 37. Jęczmień ozimy. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głębocze		Bąków		Łosiów		Pągów	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
1	Stan roślin przed zimą (skala 9°)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Stan roślin po zimie (skala 9°)	8,8	9,0	9,0	9,0	8,8	8,8	9,0	9,0
3	Rośliny martwe (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pleśń śniegowa (skala 9°)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5	Termin kłoszenia (dzień, m-c)	06.05	08.05	24.04	24.04	16.05	16.05	-	-
6	Wysokość roślin (cm)	90	89	85	77	100	89	98	86
7	Wyleganie roślin w dojrzałości młecznej (skala 9°)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	6,8	8,2
8	Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9°)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	4,4	5,6
9	Porażenie przez choroby (skala 9°)								
	Mączniak właściwy	9,0	9,0	8,4	9,0	9,0	9,0	7,6	9,0
	Rdza jęczmienia	7,3	9,0	5,7	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0
	Plamistość siatkowa	9,0	9,0	9,0	8,9	7,7	9,0	7,1	9,0
	Rynchosporioza	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,7	7,5
	Brunatna plamistość liści	8,8	9,0	7,5	8,8	9,0	9,0	6,2	9,0
10	Masa 1000 ziaren (g)	49,6	50,7	51,7	51,7	46,2	47,8	-	-
11	Zawartość białka (%)	9,0	10,0	8,7	10,6	12,8	13,0	14,8	14,9
12	Wilgotność ziarna podczas zbioru (%)	10,9	11,4	15,5	15,5	12,7	11,9	9,4	9,8
13	Plon ziarna (dt z ha)	86,8	108,3	65,4	73,6	73,6	84,2	77,6	101,6

Tab. 38. Jęczmień ozimy. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	75,9	88,4	77,6	82,1	80,6	91,9	103,1	89,1	97,5	94,7
1	Jakubus LOZ	110	111	104	111	108	109	110	104	110	108
2	KWS Kosmos LOZ	105	103	103	104	104	105	104	101	104	103
3	Mirabelle	98	101	-	99	-	97	100	-	99	-
4	Titus	90	101	97	95	96	93	100	101	96	98
5	Zenek LOZ	99	104	106	102	103	96	99	103	98	99
6	SU Vireni 2 rz	93	94	105	94	97	85	92	100	89	92
7	Quadriga	103	97	100	100	100	103	98	98	101	100
8	KWS Astaire	103	95	98	99	99	110	96	99	103	102
9	KWS Higgins LOZ	105	100	97	103	101	104	104	99	104	102
10	Zita LOZ 2 rz	98	100	99	99	99	93	98	100	95	97
11	Impala	91	98	-	94	-	94	95	-	95	-
12	SU Jule	93	101	-	97	-	100	103	-	102	-
13	Yukon	102	102	-	102	-	97	103	-	100	-
14	KWS Flemming LOZ w	106	-	-	-	-	107	-	-	-	-
15	Melia	96	-	-	-	-	103	-	-	-	-
16	SU Lautine LOZ w	108	-	-	-	-	102	-	-	-	-
	Liczba doświadczeń	4	4	4	8	12	4	4	4	8	12

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki

2rz – odmiana dwurzędowa

LOZ – Lista Odmian Zalecanych, w – odmiana zalecana wstępnie

Tab. 39. Jęczmień ozimy. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca), Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		Głębzyce		Bąków		Łosiów	Głębzyce		Bąków		Łosiów
		2020	2018-2020	2020	2018-2020		2020	2018-2020	2020	2018-2020	
	Wzorzec dt/ha	86,8	89,6	65,4	76,9	73,6	108,3	105,1	73,6	87,1	84,2
1	Jakubus	116	107	112	111	107	110	106	105	108	102
2	KWS Kosmos	106	105	108	108	95	102	103	106	106	111
3	Mirabelle	94	-	100	-	107	92	-	99	-	96
4	Titus	86	94	76	93	97	86	94	97	103	101
5	Zenek	96	102	101	105	102	94	96	97	102	104
6	SU Vireni	81	85	83	87	108	83	85	76	84	83
7	Quadriga	92	102	109	104	106	87	100	109	99	101
8	KWS Astaire	113	105	114	104	85	115	106	114	103	116
9	KWS Higgins	109	107	122	110	95	93	109	108	105	101
10	Zita	100	95	92	87	114	95	94	81	88	95
11	Impala	100	-	96	-	79	109	-	101	-	82
12	SU Jule	91	-	76	-	101	95	-	97	-	99
13	Yukon	98	-	100	-	104	106	-	104	-	111
14	KWS Flemming	106	-	114	-	94	107	-	109	-	117
15	Mella	101	-	96	-	94	105	-	96	-	114
16	SU Lautine	110	-	102	-	112	104	-	100	-	109

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian; a₁ – przeciętny, a₂ – intensywny poziom agrotechniki LOZ – Lista Odmian Zalecanych, w – odmiana zalecana wstępnie

Tab. 40. Jęczmień ozimy. Głębzyce - poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca), Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		Głębzyce		Bąków		Łosiów	Głębzyce		Bąków		Łosiów
		2020	2018-2020	2020	2018-2020		2020	2018-2020	2020	2018-2020	
	Wzorzec dt/ha	86,6	88,8	90,9	89,9	89,1	108,7	106,6	106,6	107,7	104,8
1	Jakubus	117	106	99	106	107	110	103	106	107	106
2	KWS Kosmos	107	101	109	101	106	102	110	98	106	103
3	Mirabelle	94	-	106	-	-	91	94	--	93	--
4	Antonella	101	100	96	100	99	105	94	102	100	100
5	Titus	86	101	96	101	94	86	93	103	89	94
6	Zenek	96	106	105	106	103	94	97	100	95	97
7	SU Vireni	81	103	72	82	85	82	75	98	79	85
8	Quadriga	92	109	105	109	102	87	104	109	95	100
9	Kaylin	95	102	103	102	100	100	102	109	101	104
10	KWS Astaire	113	103	103	101	106	114	103	103	109	106
11	KWS Higgins	109	111	112	100	107	109	115	102	112	109
12	Zita	100	102	85	102	96	95	86	102	91	94
13	Impala	100	-	106	-	108	108	108	-	108	-
14	SU Jule	92	98	98	95	95	95	96	-	96	-
15	Yukon	98	111	111	-	105	106	115	-	110	-
16	KWS Flemming	106	-	-	-	-	107	-	-	-	-
17	Mella	102	-	-	-	-	105	-	-	-	-
18	SU Lautine	110	-	-	-	-	104	-	-	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian; a₁ – przeciętny, a₂ – intensywny poziom agrotechniki 2rz – odmiana dwurzędowa, LOZ – Lista Odmian Zalecanych, w – odmiana zalecana wstępnie

Tab. 41. Jęczmień ozimy. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020.

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość (skala 9°)*	Wysokość roślin (cm)						Wyleganie (skala 9°)						Masa 1000 ziaren (g)						Zawartość białka (%)				
			2020			2018– 2020			2020			2018– 2020			2020**			2018– 2020			2020		2020		
			a ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	
Wzorzec			93	85	99	91	7,9	8,2	6,3	7,1	49,2	50,0	47,6	48,0	11,3	12,1									
1	Jakubus	5	90	83	96	90	7,8	8,0	6,3	7,0	46,8	49,6	45,7	46,9	11,2	11,0									
2	KWS Kosmos	5	93	85	99	91	7,8	8,0	6,3	7,0	48,1	47,9	46,3	46,3	11,6	12,3									
3	Mirabelle	5	94	91	-	-	8,0	8,3	-	-	51,5	51,0	-	-	11,4	11,9									
4	Titus	5	101	90	108	97	7,9	8,3	6,3	7,2	50,1	50,8	48,6	48,2	11,5	12,0									
5	Zenek	5,5	91	84	99	91	7,9	8,1	6,3	7,0	47,8	45,7	44,3	43,5	11,6	12,1									
6	SU Vireni	5	86	77	93	84	7,9	8,3	6,4	7,1	53,1	52,3	52,5	53,0	11,9	12,0									
7	Quadriga	5	98	87	104	94	7,9	8,3	6,3	6,9	49,9	51,1	47,5	47,6	11,3	12,1									
8	KWS Astaire	4,5	88	83	96	90	8,0	8,1	6,2	7,1	47,7	49,9	47,1	48,2	10,6	11,4									
9	KWS Higgins	4,5	91	88	99	94	7,9	8,1	6,3	7,0	49,5	50,9	47,5	48,3	10,8	12,7									
10	Zita	5	85	80	93	86	7,9	8,1	6,3	7,0	51,3	53,3	52,5	52,5	11,1	13,1									
11	Impala	5,5	94	86	-	-	7,9	8,1	-	-	47,1	48,1	-	-	11,5	12,5									
12	SU Jule	5	99	93	-	-	7,9	8,3	-	-	51,8	52,9	-	-	11,4	12,3									
13	Yukon	5,5	94	87	-	-	7,9	8,1	-	-	46,2	47,5	-	-	11,6	12,3									
14	KWS Flemming	5	97	84	-	-	7,8	8,3	-	-	47,2	49,3	-	-	11,3	12,5									
15	Mella	5,5	98	93	-	-	7,8	8,1	-	-	50,4	51,5	-	-	10,9	11,7									
16	SU Lautine	5	87	77	-	-	7,9	8,1	-	-	48,3	48,8	-	-	11,5	12,0									
Liczba doświadczeń			4	4	12	12	4	4	12	12	3	3	11	11	4	4	4								

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian * - wg COBORU, określana w warunkach provokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała)

** - dane z trzech lokalizacji (Glińskie, Bąków, Łosów)

Tab. 42. Jęczmień ozimy. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Województwo opolskie, Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Plesń śniegowa			Mączniak właściwy			Rdza jęczmienia			Plamistość siatkowa			Rynchosporioza			Brunatna plamistość liści		
		G	B	Ł	G	B	Ł	G	B	Ł	G	B	Ł	G	B	Ł	G	B	Ł
		Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)	Wzorzec (skala 9 ^a)
1	Jakubus	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,6	7,3	5,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	7,5	9,0
2	KWS Kosmos	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	6,0	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	7,0	9,0
3	Mirabelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	7,5	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	9,0
4	Titus	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	5,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0
5	Zenek	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,5	6,5	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
6	SU Vireni	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,5	8,0	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
7	Quadriga	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,5	7,0	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
8	KWS Astaire	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	7,0	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0
9	KWS Higgins	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	7,0	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
10	Zita	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	6,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
11	Impala	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	7,5	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
12	SU Jule	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	7,0	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
13	Yukon	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	7,0	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
14	KWS Flemming	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0
15	Mella	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	7,0	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0
16	SU Lautine	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,0	9,0

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian G – Glińskie, B – Bąków, Ł – Łosów, P – Pagów

JĘCZMIENŃ OZIMY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9°	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020	
					a ₁	a ₂
1	JAKUBUS	2017	2020	5	108	108
2	KWS FLEMMING	2019	2021 w	5	106*	107*
3	KWS KOSMOS	2015	2016	5	104	103
4	KWS HIGGINS	2017	2021	4,5	101	102
5	SU LAUTINE 2 rz	2019	2021 w	5	108*	102*
6	ZENEK	2013	2017	5,5	103	99
7	ZITA 2rz	2017	2020	5	99	97

2 rz – odmiana dwurzędowa

KR – Krajowy Rejestr Odmian

4,5 – 5,5 – zimotrwałość w skali 9°

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

a₁ – 80,6 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a₂ – 94,7 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

*dla odmian KWS Flemming, SU Lautine wzorzec z 2020 roku (a₁ – 75,9 dt/ha a₂ – 91,9 dt/ha)



3. PSZENŻYTO OZIME

Doświadczenia z pszenżytem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym dobozem -23 odmian oraz w Bąkowie, Łosiu i Pągowie z dobozem wojewódzkim - 19 odmian na dwóch poziomach agrotechniki: a1 – przeciętny, i a2 – intensywny. W latach 2018-2020 wykonano łącznie 11 doświadczeń. Z pośród odmian badanych w ostatnim roku – 15 było polskiej hodowli.

W tabelach poniżej przedstawiono warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze.

Średni plon ziarna w 3-leciu, na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosił 78,9 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany Tadeus, Carmelo, Orinoko i Meloman. Na poziomie intensywnym przyrost plonu ziarna w latach 2018-2020 wyniósł średnio 14,9 dt/ha, a do czołowych odmian należały Orinoko, Tadeus, Carmelo i Panteon. Plon ziarna w 3-leciu wahał się od 74,1 dt/ha w Bąkowie do 88,4 dt/ha w Głubczycach na przeciętnym i od 83,6 dt/ha w Łosiu do 103,0 dt/ha w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki.

W Głubczycach na poszerzonym doborze najwyżej plonowały odmiany Meloman, Tadeus, Temuco, Porto i krótkosłone Lombardo.

Odmiany cechowały się średnio niższym wzrostem, mniejszym wyleganiem oraz mtz, a nieco wyższą zawartością białka na intensywnym poziomie agrotechniki. W większym nasileniu z chorób grzybowych wystąpiły mączniak właściwy, septorioza liści i rdza brunatna.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

BELCANTO, CARMELO, KASYNO, LOMBARDO k, MELOMAN, ORINOKO, PANTEON i TADEUS.

Tab. 43. Jęczmień ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020

Miejscowość		Głubczyce	Bąków	Łosów	Pągów
Powiat		Głubczyce	Kluczbork	Brzeg	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	2	2	2
Klasa bonitacyjna gleby		II	IVa	IIIb	IIIa
pH gleby w KCl		6,7	6,6	6,7	6,6
Przedplon		Burak cukrowy		Rzepak ozimy	
Data siewu (dzień, m-c, rok)		23.09	24.09	26.09	28.10
Obsada roślin (szt./m ²)			350		
Data zbioru (dzień, m-c, rok)		31.07	28.07	24.07	07.08
Nawożenie mineralne					
N na poziomie	a ₁ (kg/ha)	79	106	90	114
	a ₂ (kg/ha)	119	146	130	154
P ₂ O ₅ (kg/ha)		40	40	0	27
K ₂ O (kg/ha)		79	60	0	65
Nawożenie dolistne na poziomie a ₂ (kg,g,l/ha)		Basfoliar 6-12-6 – 5 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu – 1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Basfoliar 36 Extra – 5 + ADOB Zn – 0,5 ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Basfoliar 36 Extra – 5 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Plonvit – 2 + Nitromag – 4 + ADOB B – 0,15
Środki ochrony roślin					
Zaprawa nasienna (nazwa)		Kinto Duo 080 FS			
Herbicydy (l,g/ha)		Glean 75 WG – 4,5 + Arubis 50 SG – 6,25 + Adiunkt 500 SC – 0,05 + Bizon – 1 + Boxer 800 EC – 1,25	Bizon - 1	Maraton 375 SC – 4 + Atribut 70 SG – 60	Komplet 560 SC – 0,5 + Glean 75 WG – 5
Insektycydy (l,g/ha)		Insodex 480 EC – 0,2 Los Ovados 200 SE – 0,02 + Karate Zeon 050 SC – 0,02 Danadim 400 EC – 0,5 + Decis Mega 50 EW – 0,1	Inazuma 130 WG – 150 Karate Zeon 050 SC – 0,12	Delmetros 100 SC – 0,05 Decis Mega 50 EW – 0,15	Sparviero – 0,075 Inazuma 130 WG – 150
Tylko na poziomie a ₂					
Fungicydy jesienią (l/ha)		-			
Fungicydy – pierwszy zabieg (l/ha)		Capalo 337,5 SE – 1,5 + Tilt Turbo 575 EC – 0,5	Capalo 337,5 – 1,5		
Fungicydy - drugi zabieg (l/ha)		Adexar Plus – 0,8 + Tern 750 EC – 0,1	Adexar Plus - 2	Duet Star 334 SE - 1	-
Regulatory wzrostu – pierwszy zabieg (l,ha)		CuadroNT50EC – 0,2 + Stablan 750 S – 0,7	Stablan 750 SL – 0,8 + Moddus 250 – 0,2		-
Regulatory wzrostu – drugi zabieg (l/ha)		Medax Max – 0,3	Moddus 250 EC – 0,2		Medax Max – 0,7
Regulatory wzrostu – trzeci zabieg (l/ha)		Medax Max – 0,15	-	Medax Max – 0,4	-

Tab. 44. Pszenżyto ozime. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Belcanto	2018	2021	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
2	Meloman	2014	2016	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
3	Porto	2017		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
4	Borowik	2011		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
5	Lombardo k	2015	2017	NL	Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa
6	Panteon	2015	2020	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
7	Trefl	2015		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
8	Avokado	2016		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
9	Kasyno	2016	2019	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
10	Rufus	2016		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
11	Sekret	2016		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
12	Carmelo	2017	2020	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
13	Octavio	2017		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
14	Orinoko	2017	2021	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
15	Tadeus	2017	2020	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
16	Toro	2018		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
17	Dolindo	2019		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
18	Gringo	2019		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
19	SU Liborius	2019		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec

* LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiany Avokado w latach 2017-2020, Rufus w latach 2019 – 2020 na LOZ) k – odmiana krótkosiłowa

Tab. 45. Pszenżyto ozime. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głębocze		Bąków		Łosiów		Pagów	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
1	Stan roślin przed zimą (skala 9 ^o)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Stan roślin po zimie (skala 9 ^o)	8,9	8,9	9,0	9,0	8,8	8,9	9,0	9,0
3	Rośliny martwe (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pleśń śniegowa (skala 9 ^o)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5	Termin kłoszenia (dzień, m-c)	15.05	17.05	14.05	17.05	04.05	04.05	25.05	25.05
6	Wysokość roślin (cm)	104	100	106	99	113	101	121	115
7	Wyleganie roślin w fazie dojrzałości młecz. (skala 9 ^o)	9,0	9,0	9,0	9,0	6,2	9,0	7,2	7,9
8	Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 ^o)	9,0	9,0	9,0	9,0	6,2	9,0	6,1	7,6
9	Porażenie przez choroby (skala 9 ^o)								
	Mączniak właściwy	8,6	9,0	6,4	9,0	8,0	9,0	6,4	8,0
	Septorioza liści	7,8	8,7	6,5	9,0	8,0	9,0	7,6	9,0
	Rdza brunatna	9,0	9,0	6,5	9,0	8,0	9,0	8,1	9,0
	Brunatna plamistość liści	8,2	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	7,4	9,0
10	Masa 1000 ziaren (g)	47,6	46,2	43,8	44,8	41,8	42,2	-	-
11	Zawartość białka (%)	10,9	10,6	13,9	15,0	14,2	13,8	-	-
12	Wilgotność ziarna podczas zbioru (%)	14,0	13,7	12,5	12,6	13,7	14,5	7,8	7,9
13	Plon ziarna (dt z ha)	86,3	104,3	60,2	79,1	72,9	83,9	67,5	92,9

Tab. 46. Pszenżyto ozime. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020*	2019*	2018**	2019-2020	2018-2020	2020*	2019*	2018**	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	71,7	80,4	84,7	76,1	78,9	90,1	94,4	96,9	92,3	93,8
1	Belcanto LOZ	108	104	-	106	-	105	101	-	103	-
2	Meloman LOZ	101	106	107	103	105	106	103	95	104	101
3	Porto	97	100	105	98	101	102	99	99	101	100
4	Borowik	99	100	90	99	96	92	103	101	98	99
5	Lombardo k LOZ	92	100	101	96	98	92	106	100	99	99
6	Panteon LOZ	101	100	99	101	100	105	104	100	105	103
7	Trefl	100	102	101	101	101	106	97	96	101	100
8	Avokado	93	102	104	97	100	99	100	100	99	100
9	Kasyno LOZ	102	98	102	100	101	95	99	103	97	99
10	Rufus	84	93	96	89	91	93	98	107	95	99
11	Sekret	98	101	97	99	99	90	97	100	93	96
12	Carmelo LOZ	117	106	99	112	107	105	105	101	105	104
13	Octavio	98	95	104	97	99	100	101	102	100	101
14	Orinoko LOZ	116	98	107	107	107	106	100	108	103	105
15	Tadeus LOZ	109	106	112	108	109	106	105	104	106	105
16	Toro	95	96	-	95	-	96	95	-	95	-
17	Dolindo	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-
18	Gringo	95	-	-	-	-	100	-	-	-	-
19	SU Liborius	100	-	-	-	-	107	-	-	-	-
	Liczba doświadczeń	4	4	3	8	11	4	4	3	8	11

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, a1- przeciętny, a2- intensywny poziom agrotechniki, *dane z czterech lokalizacji (Głębocze, Bąków, Łosiów, Pagów)

**dane z trzech lokalizacji (Głębocze, Bąków, Łosiów)

Tab. 47. Pszenżyto ozime. Plon ziarna przy 14% wilgotności w miejscowościach (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Poziom a ₁								Poziom a ₂							
			Głubczyce		Bąków		Łosiów		Pagów		Głubczyce		Bąków		Łosiów		Pagów	
			2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2019-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2019-2020
Wzorzec dt/ha			86,3	88,4	60,2	74,1	72,9	74,2	67,5	76,3	104,3	103,0	79,1	90,0	83,9	83,6	92,9	99,0
1	Belcanto	LOZ	100	-	105	-	108	-	121	113	101	-	116	-	102	-	100	102
2	Meloman	LOZ	112	112	88	99	116	111	86	92	109	106	94	97	107	100	113	105
3	Porto		105	108	76	93	102	100	104	98	99	104	90	92	103	101	117	106
4	Borowik		93	95	96	93	97	95	109	108	92	99	86	96	86	97	105	104
5	Lombardo	k LOZ	101	104	104	102	84	96	81	85	104	106	90	99	93	100	81	89
6	Panteon	LOZ	105	101	112	106	100	101	87	101	102	100	110	105	113	104	97	105
7	Trefl		104	104	95	96	72	94	128	115	103	101	104	100	94	93	124	109
8	Avokado		101	104	101	106	83	91	86	94	101	102	112	102	105	102	77	88
9	Kasyno	LOZ	98	101	119	108	108	103	84	87	99	98	102	103	97	103	83	89
10	Rufus		89	90	92	92	90	99	67	76	92	94	90	96	110	111	78	90
11	Sekret		89	90	111	105	94	102	96	97	86	91	93	100	90	99	89	90
12	Carmelo	LOZ	95	98	104	100	123	111	146	131	94	97	97	101	109	108	119	111
13	Octavio		95	97	95	101	97	100	106	97	96	97	93	100	94	100	116	108
14	Orinoko	LOZ	97	98	110	105	121	109	135	120	99	101	97	99	109	107	120	115
15	Tadeus	LOZ	107	107	104	106	130	118	95	102	107	107	120	107	109	107	89	97
16	Toro		100	-	95	-	102	-	82	95	103	-	96	-	91	-	93	93
17	Dolindo		107	-	94	-	108	-	71		104	-	101	-	96	-	79	
18	Gringo		92	-	103	-	87	-	100		96	-	105	-	89	-	112	
19	SU Liborius		108	-	98	-	79	-	115		111	-	105	-	104	-	109	

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki k – odmiana krótkosłoma

Tab. 48. Pszenżyto ozime. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca).

Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiany		Poziom a ₁					Poziom a ₂				
			2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha		86,4	84,9	94,0	85,7	88,4	105,1	99,6	104,7	102,4	103,1
1	Belcanto	LOZ	100	94	-	97	-	100	97	-	99	-
2	Meloman	LOZ	112	116	106	114	111	108	118	92	113	106
3	Porto		104	117	103	111	108	99	114	99	106	104
4	Borowik		93	93	99	93	95	91	97	108	94	99
5	Subito		94	104	101	99	100	104	106	102	105	104
6	Rotondo		100	107	100	104	102	105	100	100	102	102
7	Lombardo k	K LOZ	101	110	101	105	104	103	113	101	108	106
8	Panteon	LOZ	105	100	98	103	101	101	103	95	102	100
9	Trapero		98	97	104	98	100	97	97	97	97	97
10	Trefl		103	108	101	106	104	103	111	90	107	101
11	Avokado		101	111	100	106	104	100	107	99	104	102
12	Kasyno	LOZ	98	101	103	100	101	99	98	99	98	99
13	Rufus		88	82	99	85	90	91	88	105	89	95
14	Sekret		89	85	97	87	90	86	89	99	87	91
15	Temuco		110	111	96	111	106	109	112	100	111	107
16	Carmelo	LOZ	95	103	98	99	99	94	90	108	92	97
17	Octavio		95	95	102	95	97	95	93	104	94	97
18	Orinoko	LOZ	97	91	107	94	98	98	91	112	94	100
19	Tadeus	LOZ	107	106	107	107	107	106	109	105	108	107
20	Toro		100	92	-	96	-	102	91	-	97	-
21	Dolindo		107	-	-	-	-	104	-	-	-	-
22	Gringo		91	-	-	-	-	95	-	-	-	-
23	SU Liborius		108	-	-	-	-	111	-	-	-	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki k – odmiana krótkosłoma

Tab. 49. Pszenżyto ozime. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Zimotrwałość (skala 9°)*	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)**				Zawartość białka (%s.m.)**	
			2020		2018-2020		2020		2018-2020		2020		2018-2020		2020	
			a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
Wzorzec			111	104	114	105	7,6	8,7	7,6	8,2	44,4	44,4	43,7	42,2	13,0	13,1
1	Belcanto	5,5	113	112	-	-	7,8	8,8	-	-	42,5	44,7	-	-	13,5	13,5
2	Meloman	5,5	107	99	112	99	8,4	8,8	8,0	8,3	41,6	42,3	42,2	39,0	12,2	12,7
3	Porto	5,5	97	92	105	98	8,5	8,8	7,7	8,2	44,6	45,6	43,5	42,9	13,2	12,7
4	Borowik	5	128	119	132	119	8,0	8,8	7,9	8,2	46,0	43,2	46,6	43,8	13,4	13,3
5	Lombardo k	5	110	102	110	104	6,6	8,6	7,0	8,0	45,2	44,3	43,7	42,4	13,0	13,0
6	Panteon	6	113	103	119	107	6,6	8,8	7,3	8,1	41,9	42,4	41,0	38,9	13,0	13,4
7	Trefl	5	114	102	118	102	6,4	8,6	7,4	8,4	46,7	46,7	44,9	42,7	13,5	13,1
8	Avokado	5,5	126	116	127	116	6,8	8,5	7,4	8,3	45,8	43,9	44,5	41,8	12,2	12,4
9	Kasyno	5,5	106	99	107	101	8,0	8,6	7,6	8,0	47,0	48,6	45,1	45,0	13,5	13,8
10	Rufus	4,5	106	99	108	102	6,3	8,5	6,9	8,1	43,6	44,2	41,8	41,1	14,3	13,4
11	Sekret	5,5	119	108	116	107	7,8	8,8	7,6	8,7	40,6	42,9	39,7	39,8	13,0	13,5
12	Carmelo	6	115	108	113	107	8,0	8,6	8,0	8,4	47,7	44,8	47,7	46,8	13,6	12,7
13	Octavio	6	104	101	108	102	8,0	8,8	7,8	8,3	38,0	40,5	39,8	39,6	12,9	13,1
14	Orinoko	6	112	108	112	107	8,1	8,8	7,9	8,3	49,5	48,5	50,3	49,7	13,0	13,4
15	Tadeus	5,5	106	96	106	98	8,1	8,6	7,9	8,1	45,1	46,1	45,4	43,8	12,3	12,9
16	Toro	5	108	100	-	-	7,8	8,6	-	-	43,3	42,5	-	-	12,3	13,7
17	Dolindo	5,5	102	99	-	-	8,5	8,8	-	-	43,1	42,3	-	-	12,5	12,6
18	Gringo	6	102	97	-	-	8,0	8,5	-	-	46,4	45,8	-	-	12,3	13,3
19	SU Liborius	4	119	110	-	-	6,4	8,5	-	-	45,2	44,5	-	-	13,0	12,9
Liczba doświadczeń			4	4	11	11	4	4	11	11	3	3	10	10	3	3

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian * - wg COBORU określana w warunkach prowokacyjnych w Polsce (9 – bardzo duża, 5 – średnia, 1 - bardzo mała)

k – odmiana krótkosłoma, **dane z trzech lokalizacji (Głubczyce, Bąków, Łosiów)

Tab. 50. Pszenżyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Mączniak właściwy				Rdza brunatna				Septorioza liści				Brunatna plamistość liści			
		G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P
	Wzorzec (skala 9°)	8,6	6,4	8,0	6,4	9,0	6,5	8,0	8,1	7,8	6,5	8,0	7,6	8,2	9,0	8,0	7,4
1	Belcanto	8,5	6,5	8,0	6,0	9,0	7,0	8,0	9,0	8,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	8,0	8,0
2	Meloman	8,5	8,0	8,0	6,0	9,0	7,5	8,0	8,0	8,0	7,5	8,0	7,5	8,5	9,0	8,0	7,0
3	Porto	9,0	5,5	8,0	6,0	9,0	6,5	8,0	8,0	7,5	6,5	8,0	8,0	8,5	9,0	8,0	7,5
4	Borowik	8,5	6,0	8,0	7,0	9,0	5,5	8,0	9,0	8,5	5,5	8,0	8,0	7,5	9,0	8,0	8,0
5	Lombardo k	9,0	5,5	8,0	7,0	9,0	6,5	8,0	8,0	8,0	6,5	8,0	7,0	8,0	9,0	8,0	7,0
6	Panteon	9,0	6,5	8,0	7,0	9,0	7,5	8,0	8,0	8,5	7,5	8,0	7,0	8,5	9,0	8,0	7,0
7	Trefl	8,5	6,5	8,0	6,0	9,0	6,5	8,0	9,0	7,5	6,5	8,0	7,5	8,0	9,0	8,0	8,0
8	Avokado	9,0	8,5	8,0	7,0	9,0	7,5	8,0	8,0	7,5	7,5	8,0	7,0	8,5	9,0	8,0	7,0
9	Kasyno	7,5	4,5	8,0	7,0	9,0	5,5	8,0	7,5	7,5	5,5	8,0	7,0	8,0	9,0	8,0	7,0
10	Rufus	9,0	5,0	8,0	6,0	9,0	5,5	8,0	7,0	8,5	5,5	8,0	7,0	7,0	9,0	8,0	7,0
11	Sekret	8,5	7,5	8,0	7,0	9,0	7,0	8,0	8,0	8,5	7,0	8,0	8,0	7,5	9,0	8,0	7,5
12	Carmelo	8,0	7,0	8,0	6,0	9,0	6,5	8,0	9,0	7,5	6,5	8,0	8,0	8,5	9,0	8,0	8,0
13	Octavio	9,0	4,5	8,0	6,0	9,0	6,5	8,0	8,0	7,5	6,5	8,0	8,0	7,5	9,0	8,0	7,5
14	Orinoko	8,5	7,5	8,0	6,0	9,0	7,0	8,0	8,5	8,0	7,0	8,0	8,0	7,5	9,0	8,0	8,0
15	Tadeus	9,0	6,5	8,0	7,0	9,0	5,5	8,0	8,0	7,5	5,5	8,0	8,0	8,0	9,0	8,0	7,0
16	Toro	9,0	7,5	8,0	6,0	9,0	6,0	8,0	8,0	8,0	6,0	8,0	7,0	9,0	9,0	8,0	7,0
17	Dolindo	9,0	9,0	8,0	7,0	9,0	6,5	8,0	7,0	8,0	6,5	8,0	7,0	9,0	9,0	8,0	7,0
18	Gringo	8,0	3,5	8,0	6,0	9,0	6,5	8,0	7,5	7,0	6,5	8,0	8,0	9,0	9,0	8,0	7,0
19	SU Liborius	8,0	6,5	8,0	6,0	9,0	6,5	8,0	8,5	7,5	6,5	8,0	8,0	9,0	9,0	8,0	8,0

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, k – odmiana krótkosłoma, G – Głubczyce, B – Bąków, Ł – Łosiów P - Pagów

PSZENŻYTO OZIME

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9°	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020	
					a ₁	a ₂
1	BELCANTO	2018	2021	5,5	106*	103*
2	CARMELO	2017	2020	6	107	104
3	KASYNO	2016	2019	5,5	101	99
4	LOMBARDO k	2015	2017	5	98	99
5	MELOMAN	2014	2016	5,5	105	101
6	ORINOKO	2017	2021	6	107	105
7	PANTEON	2015	2020	6	100	103
8	TADEUS	2017	2020	5,5	109	105

KR – Krajowy Rejestr Odmian

k – odmiana krótkosłoma

5 – 6 – zimotrwałość w skali 9°

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

a₁ – 78,9 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a₂ – 93,8 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

*- dla odmiany Belcanto wzorzec z lat 2019 - 2020 (a₁ – 76,1 dt/ha, a₂ – 92,3 dt/ha)

4. ŻYTO OZIME

Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym dobozem - 31 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z dobozem wojewódzkim - 17 odmian, na dwóch poziomach agrotechniki:

a1 – przeciętny, a2 – intensywny. W latach 2018 – 2020 wykonano łącznie 11 doświadczeń. W ostatnim roku na 17 badanych odmian - 3 to odmiany populacyjne, a pozostałe 14 mieszańcowe. W tabelach poniżej przedstawiono warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze.

Średni plon ziarna w 3-leciu, na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosił 80,8 dt/ha, a na poziomie intensywnym 91,4 dt/ha (przyrost plonu 10,6 dt/ha). Odmiany populacyjne plonowały wyraźnie słabiej od mieszańcowych. Najwyższe plony uzyskały KWS Vinetto, KWS Serafino, KWS Dolaro, SU Arvid, KWS Binntto oraz Piano. Plon ziarna wahał się od 67,4 dt/ha w Pągowie do 96,0 dt/ha w Głubczycach na przeciętnym i od 82,3 dt/ha w Pągowie do 103,0 dt/ha w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki.

W Głubczycach na poszerzonym doborze najwyżej plonowały SU Arvid, KWS Serafino, KWS Vinetto. KWS Dolaro, KWS Binntto oraz Piano i KWS Trebiano.

Odmiany cechowały się średnio niższym wzrostem, mniejszym wyleganiem i niższą mtz a wyższą zawartością białka na intensywnym poziomie agrotechniki. W większym nasileniu z chorób grzybowych wystąpiły rdza brunatna i septorioza liści. Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

DAŃKOWSKIE GRANAT, KWS DOLARO F1, KWS FLORANO F1, KWS SERAFINO F1, KWS VINETTO F1, PIANO F1, SU ARVID F1, SU PERFORMER F1 oraz KWS JETHRO F1 wstępnie.

Tab. 51. Żyto ozime. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głubczyce	Bąków	Łosiów	Pągów
Powiat		Głubczyce	Kluczbork	Brzeg	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	3	2	2
Klasa bonitacyjna gleby		II	IVb	II	IIIa
pH gleby w KCl		6,8	6,6	6,8	6,6
Przedplon		Burak cukrowy	Rzepak ozimy	Pszenica ozima	Rzepak ozimy
Data siewu (dzień, m-c, rok)		23.09	24.09	04.10	28.09
Obsada roślin (szt./m ²)		300			
Data zbioru (dzień, m-c, rok)		31.07	28.07	29.07	09.08
Nawożenie mineralne					
N na poziomie	a ₁ (kg/ha)	79	66	90	114
	a ₂ (kg/ha)	119	106	130	154
P ₂ O ₅ (kg/ha)		40	40	0	27
K ₂ O (kg/ha)		79	60	0	65
Nawożenie dolistne na poziomie a ₂ (kg,g,l/ha)		Basfoliar 6-12-6 – 5 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu – 1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Basfoliar 36 Extra – 5 + ADOB Zn – 0,5 ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Basfoliar 36 Extra – 5 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5	Plonvit – 2 + Nitromag – 4 + ADOB B – 0,15
Środki ochrony roślin					
Zaprawa nasienna (nazwa)		Kinto Duo 080 FS			
Herbicydy (l,g/ha)		Glean 75 WG – 4,5 + Arubis 50 SG – 6,25 + Adiunkt 500 SC – 0,05 + Bizon – 1 + Boxer 800 EC – 1,25	Bizon – 1	Maraton 375 SC – 4 + Atribut 70 SG – 60	Komplet 560 SC – 0,5 + Glean 75 WG – 5
Insektycydy (l,g/ha)		Insodex 480 EC – 0,2 Los Ovados 200 SE – 0,02 + Karate Zeon 050 SC – 0,02 Danadim 400 EC – 0,5 + Decis Mega 50 EW – 0,1	Inazuma 130 WG – 150 Karate Zeon 050 SC – 0,12	Delmetros 100 SC – 0,05 Decis Mega 50 EW – 0,15	Sparviero – 0,075 Inazuma 130 WG – 150
Tylko na poziomie a ₂					
Fungicydy jesienią (l/ha)		-			
Fungicydy – pierwszy zabieg (l/ha)		Duet Star 334 SE – 1 + Tilt Turbo 575 EC – 0,5	Optan 183 SE – 1,5		Capalo 337,5 SE – 1,5
Fungicydy - drugi zabieg (l/ha)		Adexar Plus – 0,8 + Tern 750 EC – 0,1	Osiris 65 EC – 2	Duet Star 334 SE – 1	-
Regulatory wzrostu – pierwszy zabieg (l,kg/ha)		CuadroNT50 EC – 0,3 + Stabilan 750 S – 0,8	Stabilan 750 SL – 0,8 + Moddus 250 EC – 0,2		Medax Max – 0,7
Regulatory wzrostu – drugi zabieg (l,kg/ha)		Medax Max – 0,3	Moddus 250 EC – 0,2		-
Regulatory wzrostu – trzeci zabieg (l/ha)		Medax Max – 0,15	Medax Max – 0,4		-

Tab. 52. Żyto ozime. Pochodzenie odmian

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Antonińskie	2013		PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Tulce
2	DańkowskieGranat	2015	2020	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
3	KWS Binnito	F ₁ 2016		DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
4	KWS Serafino	F ₁ 2017	2020	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
5	Tur	F ₁ 2013		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
6	SU Performer	F ₁ 2014	2016	DE	Saaten – Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
7	SU Promotor	F ₁ 2015		DE	Saaten – Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
8	KWS Dolaro	F ₁ 2016	2017	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
9	KWS Florano	F ₁ 2016	2019	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
10	SU Arvid	F ₁ 2016	2019	DE	Saaten – Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
11	KWS Vinetto	F ₁ 2017	2020	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
12	Reflektor	2018		DE	Saaten – Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
13	Piano	F ₁ 2018	2021	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
14	KWS Trebiano	F ₁ 2018		DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
15	KWS Berado	F ₁ 2019		DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
16	KWS Jethro	F ₁ 2019	2021 w	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
17	KWS Tayo	F ₁ 2019		DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice

*LOZ -Lista Odmian Zalecanych (odmiany Tur w latach 2015-2020, SU Promotor w latach 2019 – 2020 na LOZ) F₁ - odmiana mieszańcowa

Tab. 53. Żyto ozime. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głębocze		Bąków		Łosiów		Pągów	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂			a ₁	a ₂
1	Stan roślin przed zimą (skala 9 ^o)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Stan roślin po zimie (skala 9 ^o)	8,2	8,0	9,0	9,0	8,1	8,1	9,0	9,0
3	Rośliny martwe (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pleśń śniegowa (skala 9 ^o)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5	Termin kłoszenia (dzień, m-c)	02.05	04.05	08.05	08.05	04.05	04.05	08.05	08.05
6	Wysokość roślin (cm)	156	140	146	116	159	117	143	125
7	Wyleganie roślin w dojrzałości młecznej (skala 9 ^o)	8,1	8,9	9,0	9,0	8,2	9,0	7,1	9,0
8	Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 ^o)	7,5	7,7	9,0	9,0	2,4	5,5	4,0	5,0
9	Porażenie przez choroby (skala 9 ^o)								
	Mączniak prawdziwy	9,0	9,0	7,7	9,0	8,6	9,0	7,2	9,0
	Rdza brunatna	7,8	8,8	4,7	8,0	8,5	9,0	7,2	9,0
	Septorioza liści	8,2	9,0	6,7	7,8	8,5	9,0	7,5	9,0
10	Masa 1000 ziaren (g)	30,5	29,9	32,9	31,6	32,0	31,7	-	-
11	Zawartość białka (%)	9,5	9,9	9,6	9,3	8,7	9,8	13,7	13,8
12	Wilgotność ziarna podczas zbioru (%)	11,0	13,4	12,6	12,5	11,8	11,5	6,3	6,4
13	Plon ziarna (dt z ha)	102,7	115,8	82,4	99,5	86,9	102,0	48,4	59,8

Tab. 54. Żyto ozime. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020*	2019*	2018**	2019-2020	2018-2020	2020*	2019*	2018**	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	80,1	83,4	79,0	81,8	80,8	94,3	93,5	86,3	93,9	91,4
1	Antonińskie	77	79	81	78	79	77	80	88	79	82
2	Dańkowskie Granat	82	86	90	84	86	81	88	80	85	83
3	KWS Binnito	F ₁ 108	105	103	107	105	103	105	100	104	103
4	KWS Serafino	F ₁ 106	104	111	105	107	110	108	107	109	108
5	Tur	F ₁ 88	93	103	91	95	97	100	108	99	102
6	SU Performer	F ₁ 104	99	108	101	104	103	94	108	99	102
7	SU Promotor	F ₁ 95	98	107	96	100	99	96	102	97	99
8	KWS Dolaro	F ₁ 104	110	109	107	108	103	105	106	104	105
9	KWS Florano	F ₁ 104	104	101	104	103	101	106	102	104	103
10	SU Arvid	F ₁ 94	103	117	99	105	97	101	116	99	105
11	KWS Vinetto	F ₁ 111	116	107	113	111	107	108	103	108	106
12	Reflektor	81	85	-	83	-	83	87	-	85	-
13	Piano	F ₁ 120	112	-	116	-	116	114	-	115	-
14	KWS Trebiano	F ₁ 95	107	-	101	-	95	103	-	99	-
15	KWS Berado	F ₁ 109	-	-	-	-	107	-	-	-	-
16	KWS Jethro	F ₁ 109	-	-	-	-	110	-	-	-	-
17	KWS Tayo	F ₁ 110	-	-	-	-	110	-	-	-	-
	Liczba doświadczeń	4	4	3	8	11	4	4	3	8	11

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, a₁- przeciętny a₂- intensywny poziom agrotechniki, F₁ – odmiana mieszańcowa, *dane z czterech lokalizacji (Głębocze, Bąków, Pągów, Łosiów), **dane z trzech lokalizacji (Głębocze, Bąków, Łosiów)

Tab. 55. Żyto ozime. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana			Poziom a ₁								Poziom a ₂							
				Głubczyce		Bąków		Łosiów		Pagów		Głubczyce		Bąków		Łosiów		Pagów	
				2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2019-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2019-2020
	Wzorzec dt/ha			102,7	96,0	82,4	80,9	86,9	75,3	48,4	67,4	115,8	103,0	99,5	92,7	102,0	88,6	59,8	82,3
1	Antonińskie			77	77	73	77	85	82	73	80	81	86	78	83	83	79	64	76
2	Dańkowskie Granat	LOZ		86	87	82	88	79	81	82	85	84	80	81	87	88	83	72	83
3	KWS Binnito	F ₁		101	106	113	112	112	100	106	105	103	104	100	102	101	101	107	110
4	KWS Serafino	F ₁	LOZ	107	107	98	102	108	112	110	105	107	107	109	107	107	109	117	112
5	Tur	F ₁		92	97	97	97	84	91	81	88	92	101	106	104	92	99	99	101
6	SU Performer	F ₁	LOZ	104	103	100	99	101	104	109	107	95	102	98	99	108	105	112	98
7	SU Promotor	F ₁		102	100	103	101	101	102	74	93	100	101	106	100	99	100	90	91
8	KWS Dolaro	F ₁	LOZ	100	105	110	107	109	113	97	102	100	105	101	101	107	109	106	104
9	KWS Florano	F ₁	LOZ	102	105	100	99	101	102	111	107	103	102	96	102	100	103	106	57
10	SU Arvid	F ₁	LOZ	103	107	90	104	103	108	80	90	102	109	96	102	104	106	84	94
11	KWS Vinetto	F ₁	LOZ	108	108	109	112	107	112	117	116	105	103	106	109	108	104	110	59
12	Reflektor			84	-	84	-	80	-	78	82	87	-	85	-	87	-	74	82
13	Piano	F ₁	LOZ	105	-	113	-	104	-	169	140	111	-	110	-	102	-	141	133
14	KWS Trebiano	F ₁		103	-	98	-	101	-	78	92	101	-	104	-	101	-	74	88
15	KWS Berado	F ₁		109	-	119	-	107	-	99	-	107	-	113	-	98	-	110	-
16	KWS Jethro	F ₁	LOZ	107	-	109	-	115	-	107	-	113	-	107	-	108	-	113	-
17	KWS Tayo	F ₁		110	-	100	-	102	-	130	-	109	-	103	-	108	-	121	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki k – odmiana krótkosłoma

Tab. 56. Żyto ozime. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana			Poziom a ₁					Poziom a ₂				
				2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha				86,4	90,9	88,2	88,7	88,5	108,6	101,9	85,4	105,3	98,6
1	Antonińskie			82	74	85	78	80	86	88	96	87	90
2	Dańkowskie Granat		LOZ	92	91	91	91	91	90	85	78	87	84
3	KWS Binnito	F ₁		108	116	108	112	111	110	114	102	112	109
4	KWS Serafino	F ₁	LOZ	113	111	110	112	111	114	113	107	114	111
5	Dańkowskie Diament			82	94	92	88	89	87	90	91	89	89
6	Dańkowskie Amber			84	92	91	88	89	87	82	92	84	87
7	Horyzo			84	92	99	88	92	81	89	93	85	88
8	Dańkowskie Rubin			85	87	89	86	87	86	88	87	87	87
9	Tur	F ₁		98	100	105	99	101	98	107	111	103	105
10	KWS Bono	F ₁		108	111	109	110	109	101	107	110	104	106
11	SU Performer	F ₁	LOZ	111	108	104	109	108	101	108	109	105	106
12	Poznańskie			84	86	91	85	87	87	86	88	86	87
13	SU Nasri	F ₁		107	106	97	107	103	101	99	101	100	100
14	SU Promotor	F ₁		108	98	107	103	104	107	104	105	105	105
15	Dańkowskie Hadron			93	84	94	89	90	89	90	97	89	92
16	Dańkowskie Turkus			90	86	89	88	88	87	91	87	89	88
17	KWS Dolaro	F ₁	LOZ	107	118	105	112	110	107	111	111	109	110
18	KWS Florano	F ₁	LOZ	108	114	107	111	110	110	109	100	109	106
19	SU Arvid	F ₁	LOZ	110	111	115	111	112	108	108	125	108	114
20	Dańkowskie Skand			81	96	89	88	89	87	95	92	91	91
21	Inspector			90	92	96	91	93	93	88	98	91	93
22	KWS Vinetto	F ₁	LOZ	115	115	109	115	113	112	110	102	111	108
23	Piastowskie			82	86	98	84	89	87	86	101	86	91
24	Reflektor			89	86	-	88	-	92	94	-	93	-
25	Piano	F ₁	LOZ	112	118	-	115	-	118	116	-	117	-
26	KWS Trebiano	F ₁		110	111	-	111	-	108	105	-	107	-
27	KWS Berado	F ₁		116	-	-	-	-	115	-	-	-	-
28	KWS Jethro	F ₁	LOZ	113	-	-	-	-	120	-	-	-	-
29	KWS Tayo	F ₁		117	-	-	-	-	116	-	-	-	-
30	Helltop			108	-	-	-	-	106	-	-	-	-
31	Stannos			111	-	-	-	-	109	-	-	-	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki k – odmiana krótkosłoma

Tab. 57. Żyto ozime. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)				Zawartość białka (%)		
		2020		2018-2020		2020		2018-2020		2020*		2018-2020		2020		
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	
	Wzorzec	150	124	153	123	5,7	6,8	6,0	7,2	31,8	31,1	30,9	30,0	10,4	10,7	
1	Antonińskie	166	136	166	137	5,8	6,8	5,4	7,1	31,5	31,2	31,7	31,3	10,8	13,0	
2	Dańkowskie Granat	154	130	159	128	5,9	7,0	6,2	7,3	29,9	31,3	30,5	29,7	11,1	11,8	
3	KWS Binnitto	F ₁	143	123	143	121	5,9	6,8	5,9	7,3	32,1	31,7	31,4	30,6	9,7	10,4
4	KWS Serafino	F ₁	148	123	148	118	5,9	6,6	6,6	7,4	31,9	30,4	30,8	28,9	10,1	10,1
5	Tur	F ₁	154	124	156	120	5,8	6,8	6,1	7,4	30,0	30,3	29,8	30,0	10,7	10,3
6	SU Performer	F ₁	143	120	145	118	5,8	6,9	6,2	7,2	33,2	31,5	31,9	30,4	9,6	10,0
7	SU Promotor	F ₁	147	122	152	119	5,4	6,8	6,1	7,2	31,2	28,6	30,5	28,4	10,8	12,0
8	KWS Dolaro	F ₁	144	123	149	120	5,9	7,0	6,3	7,3	31,9	30,7	31,2	30,2	10,1	10,0
9	KWS Florano	F ₁	148	123	147	118	5,6	6,6	6,4	7,4	30,6	29,6	29,7	29,0	9,5	9,8
10	SU Arvid	F ₁	151	124	151	122	5,8	6,8	6,4	7,3	30,5	29,7	29,8	29,1	11,0	10,3
11	KWS Vinetto	F ₁	149	122	151	119	5,6	6,9	6,3	7,4	31,2	30,8	30,6	29,8	10,4	10,8
12	Reflektor		151	128	-	-	5,4	6,9	-	-	30,9	31,1	-	-	11,1	11,6
13	Piano	F ₁	148	120	-	-	5,6	6,9	-	-	33,4	31,9	-	-	10,1	11,2
14	KWS Trebiano	F ₁	151	116	-	-	6,0	6,8	-	-	32,1	32,4	-	-	10,7	10,5
15	KWS Berado	F ₁	149	124	-	-	5,9	6,8	-	-	33,0	31,4	-	-	9,9	9,4
16	KWS Jethro	F ₁	149	121	-	-	5,8	6,8	-	-	33,5	33,5	-	-	10,3	10,4
17	KWS Tayo	F ₁	149	122	-	-	5,9	6,6	-	-	33,8	32,4	-	-	10,3	10,0
Liczba doświadczeń		4	4	11	11	4	4	11	11	3	3	10	10	4	4	

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, F1-odmiana mieszańcowa, *- dane z trzech lokalizacji (Głubczyce, Bąków, Łosiów)

**Tab. 58. Żyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1.
Województwo opolskie. Rok zbioru 2020.**

Lp.	Odmiana	Mączniak właściwy				Rdza brunatna				Septorioza liści			
		G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P
	Wzorzec (skala 9°)	9,0	7,7	8,6	7,2	7,7	4,7	8,5	7,2	8,4	6,7	8,5	7,5
1	Antonińskie	9,0	7,0	8,5	8,0	9,0	3,5	8,0	8,0	8,0	5,5	8,5	8,0
2	Dańkowskie Granat	9,0	8,0	9,0	7,0	8,5	5,5	8,5	7,0	7,5	6,5	8,0	8,0
3	KWS Binntto F ₁	9,0	8,0	9,0	7,0	8,0	4,5	8,0	7,0	9,0	7,0	9,0	7,5
4	KWS Serafino F ₁	9,0	6,5	8,0	7,0	8,0	4,5	8,5	7,5	8,0	7,0	8,5	7,0
5	Tur F ₁	9,0	8,0	9,0	7,0	7,0	4,5	8,0	7,0	8,0	7,0	8,5	7,0
6	SU Performer F ₁	9,0	8,0	8,5	7,0	8,0	4,5	8,5	6,5	7,5	6,5	8,0	8,0
7	SU Promotor F ₁	9,0	8,0	8,5	7,0	7,0	4,5	8,5	6,5	8,0	6,5	8,5	7,5
8	KWS Dolaro F ₁	9,0	8,0	9,0	7,5	7,0	5,5	8,5	7,0	8,5	7,0	8,5	7,0
9	KWS Florano F ₁	9,0	6,5	9,0	7,0	7,0	3,5	8,5	7,5	9,0	7,0	8,5	7,0
10	SU Arvid F ₁	9,0	8,0	8,5	7,0	8,0	4,5	8,5	8,0	7,5	7,0	8,0	8,0
11	KWS Vinetto F ₁	9,0	8,0	8,5	7,0	7,0	4,0	9,0	7,0	9,0	6,0	8,5	8,0
12	Reflektor	9,0	7,0	9,0	7,0	7,0	5,5	8,5	6,0	8,5	7,5	8,0	8,0
13	Piano F ₁	9,0	8,0	8,5	8,0	7,5	4,5	8,5	7,0	8,0	6,0	8,5	7,5
14	KWS Trebiano F ₁	9,0	8,5	9,0	7,0	8,0	5,0	9,0	8,0	9,0	6,5	9,0	7,0
15	KWS Berado F ₁	9,0	7,5	8,0	7,0	8,0	4,5	8,5	8,0	9,0	7,5	9,0	7,0
16	KWS Jethro F ₁	9,0	8,0	8,5	7,0	7,5	6,0	8,5	7,0	9,0	7,0	8,5	7,0
17	KWS Tayo F ₁	9,0	8,0	8,5	8,0	8,5	5,5	8,5	7,0	9,0	6,5	9,0	8,0

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian F₁ – odmiana krótkosłoma

ŻYTO OZIME

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020	
				a ₁	a ₂
1	DAŃKOWSKIE GRANAT	2015	2020	86	83
2	KWS DOLARO F ₁	2016	2017	108	105
3	KWS FLORANO F ₁	2016	2019	103	103
4	KWS JETHRO F ₁	2019	2021 w	109**	110**
5	KWS SERAFINO F ₁	2017	2020	107	108
6	KWS VINETTO F ₁	2017	2020	111	106
7	PIANO F ₁	2018	2021	116*	115*
8	SU ARVID F ₁	2016	2019	105	105
9	SU PERFORMER F ₁	2014	2016	104	102

KR – Krajowy Rejestr Odmian

F₁ – odmiana mieszańcowa

w - odmiana zalecana wstępnie

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

a₁ – 80,8 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a₂ – 91,4 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

* - dla odmiany Piano wzorzec z lat 2019-2020 (a₁ – 81,8 dt/ha a₂ – 93,9 dt/ha)

** dla odmiany KWS Jethro wzorzec z 2020 roku (a₁ – 80,1 dt/ha, a₂ – 94,3 dt/ha)

5. PSZENICA JARA

Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doбором 23 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doбором wojewódzkim 20 odmian na dwóch poziomach agrotechniki: a1 – przeciętny, a2 – intensywny. W latach 2018-2020 wykonano łącznie 12 udanych doświadczeń w województwie opolskim.

W tabelach poniżej przedstawiono warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze.

Średnio w 3-leciu plon ziarna wynosił 52,1 dt/ha na przeciętnym i 57,5 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechniki. Przyrost plonu, z powodu suszy nie rekompensował kosztów poniesionych na intensyfikację. Plon ziarna wahał się od 47,8 dt/ha w Bąkowie do 63,1 dt/ha w Głubczycach na poziomie a1 i od 49,5 dt/ha w Bąkowie do 71,6 dt/ha w Głubczycach na poziomie a2.

Do wyżej plonujących odmian na przeciętnym poziomie agrotechniki należały Varius, Harenda, Frajda i MHR Jutrzenka, a na intensywnym MHR Jutrzenka, Frajda, Varius i Harenda. Na poszerzonym doborze w Głubczycach najwyżej plonowały odmiany MHR Jutrzenka, Mandaryna, Varius, Frajda i Harenda.

Badane odmiany cechowały się średnio dość znacznym obniżeniem wzrostu i zmniejszeniem wylegania roślin, natomiast nie różniły się mtz na poziomie intensywnym. Choroby grzybowe wystąpiły w nieznacznym nasileniu, w nieco większym septorioza liści, fuzarioza kłosów i brunatna plamistość liści. W ostatnim roku cechowały się bardzo niską gęstością ziarna a wysoką zawartością białka, ilością glutenu, wartością wskaźnika sedymentacji i liczbą opadania.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

FRAJDA, HARENDA, MHR JUTRZENKA, RUSAŁKA, TYBALT, VARIUS oraz AURA i WPB TROY wstępnie.

Tab. 59. Pszenica jara. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głubczyce	Bąków	Łosiów	Pągów
Powiat		Głubczyce	Kluczbork	Brzeg	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	2	2	3
Klasa bonitacyjna gleby		II	IVa	IIb	IVa
pH gleby w KCL		6,2	5,6	6,8	6,9
Przedplon		kukurydza	kukurydza	Burak cukrowy	Pszenica ozima
Data siewu (dzieńi, m-c)		19.03	26.03	20.03	02.04
Obsada roślin (szt./m²)		450			
Data zbioru (dzieńi, m-c)		17.08	11.08	11.08	12.08
Nawożenie mineralne					
N na poziomie	a ₁ (kg/ha)	84	108	130	68
	a ₂ (kg/ha)	124	148	170	108
P ₂ O ₅ (kg/ha)		74	40	-	74
K ₂ O (kg/ha)		93	60	-	64
Nawożenie dolistne na poziomie a ₂ (l,kg/ha)		ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 6-12-6 – 5 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5 ADOB Fe – 0,1	ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 36 Extra – 5 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5		ADOB Mg-10+ADOB Cu-1 + ADOB Mn- 3+Basfoliar36 Extra –5 ADOBMg-10+Basfoliar 36 Extra -5
Środki ochrony roślin					
Zaprawa nasienna (nazwa)		Kinto Duo 080 FS			
Herbicydy (l,g/ha)		Mustang Forte 195 SE – 0,8		Fundamentum 700 WG - 25	Granstar Ultra SX 50 SG – 48 +Trend 0,1%
Insektycydy (l,g/ha)		Los Ovados 200 SE – 0,1 + Sparviero – 0,075 Decis Mega 50 EW – 0,1 Proteus 110 OD – 0,5 Los Ovados 200 SE – 0,1	Fastac Active 050 ME – 0,2	Delux 050 CS – 0,1	Bi 58 Nowy 400 EC – 0,5
tylko na poziomie a ₂					
Fungicydy – pierwszy zabieg (l/ha)		Tern 750 EC – 0,15 + Capalo 337,5 SE – 1	Duet Star 334 SE - 1	Capalo 337,5 SE – 1,5	
Fungicydy – drugi zabieg (l/ha)		Adexar Plus – 1,25 + Osiris 65 EC – 0,75	Osiris 65 EC – 1,5		
Fungicydy – trzeci zabieg (l/ha)		Plexevo 60 EC - 0,4 + Bukat 500 SC – 0,3	-	-	-
Regulatory wzrostu (l/ha)		Medax Max – 0,15 + Moddus Flexi – 0,2 Medax Max – 0,4	Medax Max – 0,5	Moddus 250 SC – 0,2 + Stabilan 750 SL – 0,5	

Tab. 60. Pszenica jara. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Wartość technologiczna	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Anakonda	A	2020		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
2	Harenda	B	2014	2016	PL	Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.o. Kraków
3	Jarlanka	A	2017		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
4	Tybalt	A	2005	2007	NL	Irena Szyld, Kalisz
5	Goplana	A	2015		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
6	Nimfa	A	2016		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
7	Rusałka	A	2016	2018	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
8	Varius	A	2016	2019	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
9	Frajda	B	2017	2019	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
10	Fala	A	2018		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
11	MHR Jutrzenka	A	2018	2020	PL	Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.o. Kraków
12	Alibi	B	2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
13	Eskadra	A	2019		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
14	Gratka	A	2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
15	Merkawa	A	2019		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
16	Akcja	A	2020		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
17	Aura	A	2020	2021w	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
18	Fama	A	2020		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
19	SU Ahab	A	2020		DE	Strube Polska sp. z o.o., Wrocław
20	WPB Troy	A	2020	2021w	NL	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec

*LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiana Goplana w latach 2016-2020 na LOZ)

A – odmiana jakościowa

B – odmiana chlebową

Tab. 61. Pszenica jara. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha		Głębocze		Bąków		Łosiów		Pągów	
			a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
1	Termin kłoszenia	(dzień, m-c)	13.6	14.06	12.06	12.06	13.06	13.06	26.05	26.05
2	Termin dojrzałości woskowej	(dzień, m-c)	17.07	19.07	10.07	10.07	01.07	01.07	-	-
3	Wysokość roślin	(cm)	88	84	90	89	90	78	84	82
4	Wyleganie roślin w dojrzał. mlec.	(skala 9°)	7,3	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5	Wyleganie roślin przed zbiorem	(skala 9°)	6,6	8,1	8,4	8,4	9,0	9,0	7,8	9,0
6	Porażenie przez choroby:	(skala 9°)								
	Mączniak właściwy		8,2	9,0	8,8	9,0	9,0	9,0	7,8	9,0
	Rdza brunatna		9,0	9,0	8,8	9,0	9,0	9,0	7,2	9,0
	Septorioza liści		7,0	8,2	7,5	9,0	7,7	9,0	7,6	9,0
	Brunatna plamistość liści		8,0	9,0	7,8	9,0	7,6	9,0	7,6	9,0
	Septorioza plew		9,0	9,0	7,2	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0
	Fuzarioza kłosów		6,4	7,8	6,9	9,0	7,8	9,0	-	-
7	Masa 1000 ziaren	(g)	38,2	38,5	43,6	45,3	40,5	42,5	-	-
8	Gęstość ziarna w stanie zsypanym	(kg/hl)	67,4	67,7	72,2	72,6	70,3	70,7	69,4	69,1
9	Zawartość białka	(%)	14,9	14,9	18,1	19,3	13,6	14,1	14,5	15,0
10	Ilość glutenu	(%)	27,9	28,3	32,4	33,8	30,5	31,8	30,4	30,8
11	Wskaźnik sedymentacji	(ml)	54	55	46	46	46	48	40	42
12	Liczba opadania	(sek.)	320	285	403	393	358	352	403	413
13	Wilgotność ziarna podczas zbioru	(%)	12,4	12,7	12,4	12,8	8,3	8,9	12,6	12,6
14	Plon ziarna	(dt z ha)	55,6	69,2	48,7	53,1	51,0	55,8	41,3	50,9

Tab. 62. Pszenica jara. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	49,2	40,7	66,3	45,0	52,1	57,2	44,4	70,9	50,8	57,5
1	Anakonda	97	-	-	-	-	96	-	-	-	-
2	Harenda	113	109	99	111	107	111	101	100	106	104
3	Jarlanka	98	101	102	99	100	95	96	98	95	96
4	Tybalt	94	93	102	94	96	99	95	98	97	97
5	Goplana	91	112	97	102	100	89	103	102	96	98
6	Nimfa	89	97	97	93	94	94	95	102	95	97
7	Rusałka	91	102	101	97	98	91	113	99	102	101
8	Varius	119	104	108	111	110	115	101	103	108	106
9	Frajda	112	108	100	110	107	111	109	102	110	107
10	Fala	87	97	102	92	95	87	93	107	90	96
11	MHR Jutrzenka	110	100	101	105	104	110	110	103	110	108
12	Alibi	90	95	-	93	-	100	91	-	96	-
13	Eskadra	87	97	-	92	-	95	99	-	97	-
14	Gratka	84	99	-	91	-	86	101	-	94	-
15	Merkawa	108	99	-	104	-	105	102	-	103	-
16	Akcja	99	-	-	-	-	100	-	-	-	-
17	Aura	110	-	-	-	-	112	-	-	-	-
18	Fama	91	-	-	-	-	87	-	-	-	-
19	SU Ahab	109	-	-	-	-	105	-	-	-	-
20	WPB Troy	120	-	-	-	-	112	-	-	-	-
	Liczba doświadczeń	4	4	4	8	12	4	4	4	8	12

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki

Tab. 63. Pszenica jara. Plon ziarna w miejscowościach przy 14 % wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁								Poziom a ₂							
		Głubczyce		Bąków		Łosiów		Pągów		Głubczyce		Bąków		Łosiów		Pągów	
		2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	55,6	63,1	48,7	47,8	51,0	47,9	41,3	48,4	69,2	71,6	53,1	49,5	55,8	52,4	50,9	56,5
1	Anakonda	100	-	96	-	98	-	96	-	94	-	100	-	100	-	92	-
2	Harenda	123	110	103	103	107	100	120	114	106	102	101	102	105	99	131	112
3	Jarlanka	101	101	97	103	95	99	97	98	94	98	94	97	100	97	90	93
4	Tybalt	82	95	107	94	100	105	89	90	96	100	99	91	98	96	102	98
5	Goplana	95	101	90	99	102	105	79	97	86	95	93	97	99	105	79	96
6	Nimfa	70	87	86	95	89	94	112	104	91	96	94	96	90	95	101	101
7	Rusałka	106	102	41	79	105	104	112	108	112	108	48	91	106	98	97	107
8	Varius	120	109	116	113	110	107	129	113	114	106	110	100	109	110	126	107
9	Frajda	115	106	105	109	94	99	133	112	111	107	98	109	97	100	136	115
10	Fala	76	92	91	101	102	97	79	91	80	91	91	94	101	106	78	91
11	MHR Jutrzenka	131	112	105	97	106	102	100	103	116	109	109	111	105	102	111	111
12	Alibi	80	-	124	-	86	-	72	-	99	-	118	-	91	-	94	-
13	Eskadra	68	-	98	-	102	-	81	-	90	-	107	-	103	-	79	-
14	Gratka	81	-	89	-	93	-	72	-	91	-	91	-	94	-	70	-
15	Merkawa	110	-	109	-	88	-	125	-	108	-	108	-	87	-	116	-
16	Akcja	108	-	96	-	100	-	91	-	96	-	100	-	102	-	100	-
17	Aura	102	-	127	-	101	-	109	-	109	-	115	-	106	-	119	-
18	Fama	99	-	96	-	92	-	78	-	89	-	94	-	86	-	77	-
19	SU Ahab	109	-	110	-	108	-	109	-	105	-	114	-	107	-	95	-
20	WPB Troy	125	-	115	-	122	-	119	-	112	-	114	-	116	-	107	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki

Tab. 64. Pszenica jara. Głębczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiany	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha		56,9	50,9	83,3	53,9	63,7	69,8	54,4	90,9	62,1	71,7
1	Anakonda	98	-	-	-	-	93	-	-	-	-
2	Harenda	120	106	100	113	109	105	103	98	104	102
3	Jarlanka	99	100	101	100	100	93	100	101	96	98
4	Tybalt	80	102	100	91	94	95	103	102	99	100
5	Mandaryna	124	105	102	115	110	113	98	98	106	103
6	Goplana	93	108	99	100	100	85	98	101	92	95
7	Nimfa	68	91	100	80	86	90	97	100	94	96
8	Rusalka	104	95	102	99	100	111	109	103	110	108
9	Varius	118	103	102	110	108	113	104	99	108	105
10	WPB Skye	102	105	102	104	103	96	98	103	97	99
11	Frajda	112	99	103	106	105	110	105	105	108	107
12	Atrakcja	119	94	102	107	105	108	91	98	99	99
13	Fala	74	100	98	87	91	79	93	101	86	91
14	MHR Jutrzenka	128	100	105	114	111	115	103	108	109	109
15	Alibi	78	96	-	87	-	98	96	-	97	-
16	Eskadra	66	97	-	82	-	90	108	-	99	-
17	Gratka	80	107	-	93	-	90	102	-	96	-
18	Merkawa	107	99	-	103	-	108	101	-	104	-
19	Akcja	106	-	-	-	-	96	-	-	-	-
20	Aura	100	-	-	-	-	108	-	-	-	-
21	Fama	96	-	-	-	-	89	-	-	-	-
22	SU Ahab	107	-	-	-	-	104	-	-	-	-
23	WPB Troy	122	-	-	-	-	111	-	-	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian, LOZ –Lista Odmian Zalecanych, a₁ – przeciętny, a₂ – intensywny poziom agrotechniki

Tab. 65. Pszenica jara. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020.

Lp	Odmiana	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)			
		2020		2018 - 2020		2020		2018 - 2020		2020*		2018 - 2020	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
	Wzorzec	88	83	88	78	7,9	8,6	7,5	8,2	40,8	42,1	37,2	37,3
1	Anakonda	86	82	-	-	7,6	8,4	-	-	42,4	43,2	-	-
2	Harenda	89	82	87	76	8,9	8,9	8,3	8,8	39,0	37,2	37,1	34,8
3	Jarlanka	86	80	87	77	8,0	8,3	7,3	7,9	41,7	43,1	38,1	38,8
4	Tybalt	86	83	86	78	7,6	8,6	7,1	8,0	41,6	42,7	37,4	37,9
5	Goplana	91	86	91	82	7,1	8,3	7,0	8,0	40,9	44,1	37,7	38,1
6	Nimfa	85	82	87	77	7,0	8,9	6,9	8,1	40,0	42,8	37,9	38,4
7	Rusałka	88	80	88	78	8,1	8,9	7,6	8,4	40,2	40,1	37,3	36,9
8	Varius	88	81	87	76	8,5	9,0	8,0	8,8	37,9	39,2	35,4	35,4
9	Frajda	92	89	91	82	8,1	8,6	7,7	8,2	39,9	39,8	35,7	35,6
10	Fala	88	82	86	77	7,4	8,4	7,0	7,9	41,1	44,1	38,4	39,3
11	MHR Jutrzenka	91	84	88	77	8,9	8,8	8,1	8,5	38,9	40,3	37,6	38,2
12	Alibi	94	90	-	-	7,5	8,5	-	-	44,1	46,1	-	-
13	Eskadra	85	83	-	-	7,1	8,5	-	-	38,9	42,0	-	-
14	Gratka	84	83	-	-	7,3	8,8	-	-	41,4	43,7	-	-
15	Merkawa	88	82	-	-	8,5	8,9	-	-	41,3	38,6	-	-
16	Akcja	88	84	-	-	8,3	8,8	-	-	41,3	42,4	-	-
17	Aura	91	85	-	-	8,1	8,4	-	-	42,7	44,7	-	-
18	Fama	85	80	-	-	7,9	8,6	-	-	39,6	44,1	-	-
19	SU Ahab	86	82	-	-	8,3	8,8	-	-	41,6	43,6	-	-
20	WPB Troy	89	83	-	-	8,6	8,8	-	-	40,9	40,2	-	-
Liczba doświadczeń		4		12		4		12		3		11	

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian * - dane z trzech lokalizacji (Głębczyce, Bąków, Łosiów)

Tab. 66. Pszenica jara. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Mączniak właściwy				Rdza brunatna				Septorioza liści				Brunatna plamistość liści				Septorioza plew				Fuzarioza kłosów			
		G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P	G	B	Ł	P
	Wzorzec (skala 9°)	8,2	8,8	9,0	7,8	9,0	8,8	9,0	7,2	7,0	7,5	7,7	7,6	8,0	7,8	7,6	7,6	9,0	7,2	8,0	9,0	6,4	6,9	7,8	9,0
1	Anakonda	8,5	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	6,5	6,0	8,0	8,0	8,0	7,5	8,0	8,0	9,0	7,5	8,0	9,0	6,5	8,0	8,0	9,0
2	Harenda	8,5	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	7,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,5	8,0	8,0	9,0	7,0	8,0	9,0	7,0	7,5	7,5	9,0
3	Jarlanka	8,5	9,0	9,0	8,0	9,0	8,0	9,0	7,0	6,5	7,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,5	7,0	9,0	6,5	8,0	9,0	6,5	7,5	8,0	9,0
4	Tybalt	8,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0	7,5	7,5	8,0	9,0	6,0	8,0	9,0	6,0	7,5	7,5	9,0
5	Goplana	9,0	8,5	9,0	7,0	9,0	8,5	9,0	7,0	7,0	6,5	8,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,0	9,0	7,5	8,0	9,0	6,5	8,0	7,5	9,0
6	Nimfa	8,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,5	7,0	7,5	7,5	8,0	8,0	7,0	7,5	8,0	9,0	7,5	8,0	9,0	5,5	6,0	8,0	9,0
7	Rusałka	6,5	7,5	9,0	8,0	9,0	8,0	9,0	7,0	6,5	8,5	7,5	7,5	8,0	8,0	7,0	8,0	9,0	7,0	8,0	9,0	7,0	7,5	8,0	9,0
8	Varius	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	6,0	7,5	8,0	8,0	7,0	7,0	8,0	9,0	8,5	8,0	9,0	6,5	7,0	8,0	9,0
9	Frajda	8,5	9,0	9,0	8,0	9,0	7,5	9,0	7,5	7,0	6,5	7,5	8,0	9,0	8,0	7,0	8,0	9,0	8,0	8,0	9,0	6,5	6,0	8,0	9,0
10	Fala	9,0	9,0	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0	7,0	6,5	8,5	7,5	7,0	8,0	7,5	7,0	9,0	6,5	8,0	9,0	6,0	8,5	7,5	9,0	9,0
11	MHR Jutrzenka	8,0	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	9,0	7,5	8,0	8,5	8,0	7,0	8,0	7,0	7,5	8,0	9,0	6,0	8,0	9,0	6,5	6,5	8,0	9,0
12	Alibi	7,0	8,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	7,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	7,5	7,0	9,0	8,0	8,0	9,0	6,5	7,5	8,0	9,0
13	Eskadra	6,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	6,5	8,0	7,0	7,0	8,0	9,0	8,0	7,5	9,0	7,0	8,0	9,0	6,0	6,5	7,5	9,0
14	Gratka	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	6,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,5	9,0	6,5	8,0	9,0	6,5	7,0	8,0	9,0
15	Merkawa	8,0	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	9,0	8,0	6,5	7,5	7,5	8,0	7,0	9,0	7,0	7,5	9,0	7,0	8,0	9,0	7,0	6,0	8,0	9,0
16	Akcja	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	8,5	9,0	7,0	7,5	6,5	7,5	8,0	8,0	6,5	7,5	8,0	9,0	7,5	8,0	9,0	6,0	6,0	7,5	9,0
17	Aura	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	8,5	9,0	7,5	7,5	8,5	7,5	8,0	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	7,5	8,0	9,0	6,5	6,5	7,5	9,0
18	Fama	8,0	8,5	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0	7,0	6,5	6,5	8,0	7,5	8,0	8,0	7,5	7,5	9,0	7,5	8,0	9,0	6,0	7,0	7,5	9,0
19	SU Ahab	7,5	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0	8,0	7,5	7,0	9,0	7,0	8,0	9,0	6,5	5,5	8,0	9,0
20	WPB Troy	8,0	8,5	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	6,5	8,5	7,5	7,0	7,0	8,5	8,0	7,5	9,0	8,0	8,0	9,0	6,0	5,0	7,5	9,0

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian G – Głubczyce, B – Bąków, Ł – Łosiów, P – Pagów

Tab. 67. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych na przeciętnym poziomie agrotechniki – a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020.

Lp	Odmiana	Wartość technologiczna	Gęstość ziarna w stanie zsypanym kg/hl					Zawartość białka (% sm)					Ilość glutenu (%)					Wskaźnik sedimentacji (ml)					Liczba opadania (sek.)				
			G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr
	Wzorzec		67,4	72,2	70,3	69,4	69,9	14,9	18,1	13,6	14,5	15,3	27,9	32,4	30,5	30,4	30,3	54	46	46	40	47	320	403	358	403	371
1	Anakonda	A	66,2	70,3	69,3	68,0	68,4	15,2	20,2	13,9	14,9	16,0	28,6	32,9	31,4	29,6	30,6	44	50	40	41	44	395	438	287	425	386
2	Harenda	B	69,2	73,3	71,1	71,2	71,2	14,0	16,1	13,4	13,9	14,4	25,3	30,6	30,8	27,4	28,5	64	59	53	53	57	286	361	316	411	344
3	Jarlanka	A	-	70,8	69,4	67,2	69,1	14,5	13,1	13,3	14,9	13,9	28,3	33,1	29,6	31,0	30,5	55	49	43	44	48	327	391	392	444	389
4	Tybalt	A	71,3	70,7	70,3	68,5	70,2	13,4	17,1	14,0	13,9	14,6	25,5	34,6	30,9	30,4	30,4	52	43	50	35	45	309	432	346	412	375
5	Goplana	A	65,2	72,9	70,6	69,1	69,4	14,5	17,5	13,8	14,4	15,0	27,7	30,8	29,5	30,9	29,7	46	41	43	34	41	334	400	368	448	388
6	Nimfa	A	-	71,8	71,4	67,9	70,3	16,6	18,7	13,5	15,3	16,0	29,5	32,8	31,4	31,9	31,4	55	54	55	39	51	328	390	331	381	358
7	Rusałka	A	68,8	72,0	70,4	71,9	70,7	15,0	19,3	14,2	15,0	15,9	28,0	38,0	31,3	33,2	32,6	64	66	50	40	55	389	358	381	388	379
8	Varius	A	66,7	73,3	69,8	69,1	69,7	14,6	18,4	13,6	14,7	15,3	27,5	31,8	29,8	33,7	30,7	58	57	46	49	53	127	385	362	419	323
9	Frajda	B	69,5	74,1	70,2	72,0	71,4	14,7	17,9	13,5	15,1	15,3	29,7	32,2	31,6	33,3	31,7	51	29	38	32	38	322	333	407	379	360
10	Fala	A	63,5	71,4	71,0	68,2	68,5	16,5	17,8	14,0	14,8	15,8	29,9	33,6	29,8	32,0	31,3	58	52	50	34	49	281	432	442	417	393
11	MHR Jutrzenka	A	68,1	72,3	70,1	69,8	70,0	13,6	16,1	13,6	13,3	14,1	24,8	32,2	29,5	27,7	28,6	44	34	40	28	37	424	388	414	372	400
12	Alibi	B	64,6	73,1	70,4	69,2	69,3	14,9	15,8	14,1	13,8	14,6	27,0	28,7	29,8	28,5	28,5	34	30	40	31	34	322	329	311	311	318
13	Eskadra	A	-	71,7	69,7	68,8	70,0	15,7	20,5	13,9	14,2	16,1	29,8	31,9	28,6	31,6	30,5	61	54	42	35	48	267	495	327	417	377
14	Gratka	A	62,8	70,9	69,8	68,4	67,9	15,0	20,0	13,2	15,0	15,8	28,5	33,9	31,1	31,3	31,2	59	47	42	36	46	390	393	356	439	395
15	Merkawa	A	-	67,3	70,4	64,4	67,3	14,2	18,9	13,2	13,9	15,0	27,4	30,0	30,5	26,3	28,6	57	39	48	40	46	229	310	325	372	287
16	Akcja	A	66,6	72,0	69,9	70,6	69,7	15,6	19,4	14,2	14,9	16,0	27,9	33,2	30,3	30,7	30,5	64	46	46	43	50	385	431	368	427	403
17	Aura	A	67,1	73,8	69,4	71,8	70,5	14,9	17,4	13,0	13,7	14,8	27,3	28,5	30,9	29,9	29,2	46	47	47	34	44	317	435	347	382	370
18	Fama	A	66,8	71,2	70,4	66,5	68,7	15,5	19,6	13,5	15,7	16,1	29,7	33,4	31,7	29,6	31,1	56	32	53	49	48	391	447	418	401	414
19	SU Ahab	A	71,0	74,9	70,5	72,9	72,3	14,8	20,5	13,6	15,1	16,0	30,5	36,0	32,3	29,8	32,2	64	54	51	56	56	298	471	385	431	396
20	WPB Troy	A	71,9	77,9	72,3	73,0	73,7	14,0	18,5	13,3	14,1	15,0	25,9	30,3	29,2	29,8	28,8	52	41	50	37	45	269	432	358	376	359

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian A – odmiana jakościowa B – odmiana chlebowa G – Głubczyce, B – Bąków, Ł – Łosiów, P – Pagów

Tab. 68. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Wartość technologiczna	Gęstość ziarna w stanie zsypanym kg/hl					Zawartość białka (% sm)					Ilość glutenu (%)					Wskaźnik sedimentacji (ml)					Liczba opadania (sek.)				
			G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr	G	B	Ł	P	Śr
	Wzorzec		67,7	72,6	70,7	69,1	70,1	28,3	33,8	31,8	30,8	31,2	28,3	33,8	31,8	30,8	31,2	55	46	48	42	48	285	393	352	413	361
1	Anakonda	A	66,4	70,8	69,1	68,4	68,6	29,0	33,5	31,3	30,1	31,0	29,0	33,5	31,3	30,1	31,0	54	53	55	41	51	298	423	409	405	384
2	Harenda	B	67,8	73,5	73,0	-	71,4	26,7	31,8	31,9	27,4	29,5	26,7	31,8	31,9	27,4	29,5	64	58	47	49	55	275	375	339	372	340
3	Jarlanka	A	65,7	71,3	70,0	-	69,0	29,2	33,4	31,8	31,9	31,6	29,2	33,4	31,8	31,9	31,6	59	56	44	45	51	405	362	335	424	382
4	Tybalť	A	63,6	72,9	70,9	67,9	68,8	29,3	36,6	33,0	33,1	33,0	29,3	36,6	33,0	33,1	33,0	60	47	57	41	51	252	459	408	411	383
5	Goplana	A	67,5	73,3	70,4	69,1	70,0	28,9	32,2	32,5	32,9	31,6	28,9	32,2	32,5	32,9	31,6	44	41	42	37	41	324	463	370	398	389
6	Nimfa	A	65,4	71,0	70,3	67,8	68,6	30,0	35,2	32,5	33,2	32,7	30,0	35,2	32,5	33,2	32,7	58	49	54	50	53	316	378	338	419	363
7	Rusalka	A	69,6	71,3	70,4	70,7	70,5	29,7	41,9	33,2	35,4	35,1	29,7	41,9	33,2	35,4	35,1	62	68	47	48	56	149	380	311	353	298
8	Varius	A	68,4	72,0	69,1	68,3	69,4	28,6	32,4	31,6	34,6	31,8	28,6	32,4	31,6	34,6	31,8	58	48	53	45	51	317	366	351	415	362
9	Frajda	B	71,0	74,5	72,4	69,7	71,9	29,1	38,3	32,4	31,6	32,9	29,1	38,3	32,4	31,6	32,9	46	31	42	32	38	164	318	331	424	309
10	Fala	A	66,1	72,0	70,8	67,3	69,0	27,4	36,4	30,7	29,9	31,1	27,4	36,4	30,7	29,9	31,1	54	49	46	43	48	197	453	378	442	368
11	MHR Jutrzenka	A	70,2	72,4	71,0	70,0	70,9	27,2	31,4	33,3	27,2	29,8	27,2	31,4	33,3	27,2	29,8	45	34	43	30	38	335	411	393	449	397
12	Alibi	B	69,1	72,6	70,9	68,3	70,2	26,0	29,9	30,6	28,3	28,7	26,0	29,9	30,6	28,3	28,7	46	32	46	32	39	230	302	356	392	320
13	Eskadra	A	67,7	72,5	70,5	67,9	69,6	28,9	32,6	31,0	30,9	30,9	28,9	32,6	31,0	30,9	30,9	59	45	44	36	46	335	386	363	456	385
14	Gratka	A	64,4	71,5	70,1	65,1	67,7	29,2	34,8	29,5	31,5	31,3	29,2	34,8	29,5	31,5	31,3	54	48	50	53	51	375	417	329	452	393
15	Merkawa	A	65,7	68,6	69,9	64,8	67,2	26,5	30,1	31,3	26,8	28,7	26,5	30,1	31,3	26,8	28,7	58	41	45	46	48	193	388	360	400	335
16	Akcja	A	68,0	72,6	71,0	69,7	70,3	28,3	33,8	32,9	30,2	31,3	28,3	33,8	32,9	30,2	31,3	61	46	51	44	51	332	382	369	420	376
17	Aura	A	70,4	74,8	70,9	71,2	71,8	26,3	30,5	29,8	30,6	29,3	26,3	30,5	29,8	30,6	29,3	40	32	43	33	37	284	354	289	376	326
18	Fama	A	67,1	71,7	70,8	70,1	69,9	28,3	35,9	31,8	29,8	31,5	28,3	35,9	31,8	29,8	31,5	60	51	57	46	54	304	419	358	458	385
19	SU Ahab	A	70,9	75,8	71,9	74,8	73,3	30,6	36,4	31,8	32	32,7	30,6	36,4	31,8	32	32,7	66	57	46	55	56	352	447	341	441	395
20	WPB Troy	A	70,9	77,1	72,3	73,1	73,3	26,2	28,7	32,5	29,2	29,2	26,2	28,7	32,5	29,2	29,2	53	40	51	39	46	271	377	318	359	333

PSZENICA JARA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020	
					a ₁	a ₂
1	AURA	2020	2021 w	A	110*	112*
2	FRAJDA	2017	2019	B	107	107
3	HARENDA	2014	2016	B	107	104
4	MHR JUTRZENKA	2018	2020	A	104	108
5	RUSAŁKA	2016	2018	A	98	101
6	TYBALT	2005	2007	A	96	97
7	VARIUS	2016	2019	A	110	106
8	WPB TROY	2020	2021 w	A	120*	112*

KR – Krajowy Rejestr Odmian

A – odmiana jakościowa

B – odmiana chlebowa

w – odmiana zalecana wstępnie

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

a₁ – 52,1 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a₂ – 57,5 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

*- dla odmiany Aura, WPB Troy wzorzec z 2020 roku (a₁ – 49,2dt/ha, a₂ – 57,2dt/ha)



6. JĘCZMIEN JARY

Doświadczenia z jęczmieniem jarym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doбором 37 odmian oraz w Bąkowie i Pągowie z doбором wojewódzkim 26 odmian na dwóch poziomach agrotechniki: a1 – poziom przeciętny, a2 – poziom intensywny. W latach 2018-2020 wykonano łącznie 9 udanych doświadczeń w województwie opolskim.

W tabelach poniżej przedstawiono warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze.

Średni plon ziarna w 3-leciu, na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosił 58,8 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany Farmer, Bente, Rezus, KWS Vermont i Etoile. Na poziomie intensywnym przyrost plonu wyniósł 6,7 dt/ha, a do czołowych odmian należały Rezus, Bente, KWS Vermont i KWS Fantex. Plon ziarna w 3-leciu wahał się od 50,5 dt/ha w Bąkowie do 69,5 dt/ha w Głubczycach na przeciętnym i od 56,5 dt/ha w Bąkowie do 74,2 dt/ha w Głubczycach na intensywnym poziomie agrotechniki. W Głubczycach, na poszerzonym doborze najwyżej plonowały odmiany KWS Vermont, Rezus, browarna RGT Planet, Bente, Farmer, Pilote i KWS Fantex.

Odmiany cechowały się średnio niższym wzrostem i nieco mniejszą podatnością na wyleganie oraz wyższą mtz i zawartością białka w ziarnie na intensywnym poziomie agrotechniki. Z chorób grzybowych w nieco większym nasileniu wystąpiła rdza karłowa i plamistość siatkowa.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

BENTE, ETOILE, FARMER, KWS VERMONT, RADEK, REZUS, RGT PLANET br, i ADWOKAT wstępnie.

Tab. 69. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głubczyce	Bąków	Pągów
Powiat		Głubczyce	Kluczbork	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	2	3
Klasa bonitacyjna gleby		II	IV a	IV a
pH gleby w KCl		6,2	5,6	6,9
Przedplon		Kukurydza na ziarno	Kukurydza na ziarno	Pszenica ozima
Data siewu	(dzień, m-c, rok)	17.03	26.03	02.04
Obsada roślin		300	300	350
Data zbioru		14.08	08.08	12.08
Nawożenie mineralne				
N na poziomie	a ₁	(kg/ha)	84	88
	a ₂	(kg/ha)	124	108
P ₂ O ₅		(kg/ha)	74	40
K ₂ O		(kg/ha)	93	60
Nawożenie dolistne na poziomie a ₂		(kg/l/ha)	ADOB Mn – 1,5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 6-12-6 – 5 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5 ADOB Fe – 0,1	ADOB Mn – 3 + ADOB Cu – 1 + ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 36 E – 5 + MgSO ₄ – 5 MgSO ₄ – 5
Środki ochrony roślin				
Zaprawa nasienna		(nazwa)	Kinto Duo 080 FS	
Herbicydy		(l/g/ha)	Mustang Forte 195 SE – 0,8	Granstar Ultra SX 50 SG – 48 + Trend 0,1%
Insektycydy		(l/ha)	Los Ovados 200 SE - 0,1 + Sparviero - 0,075 Proteus 110 OD - 0,5 Los Ovados 200 SE - 0,2	Fastac Active 050 ME - 0,2 Bi 58 Nowy – 0,5
tylko na poziomie a ₂				
Fungicydy		(l/ha)	Tern 750 EC – 0,15 + Capalo 337,5 SE – 1 Adexar Plus – 1,25 + Osiris 65 EC – 0,75 Plexeo 60 EC – 0,4 + Bukat 500 SC – 0,3	Duet Star 334 SE – 1 Osiris 65 EC – 2 Capalo 337,5 SE – 2
Regulatory wzrostu		(l/ha)	Medax Max – 0,15 + Moddus Flexi – 0,2 Medax Max – 0,4	Medax Max - 0,5 Moddus 250 EC – 0,2 + Stabilan 750 SL – 0,5

Tab. 70. Jęczmień jary. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Syntetyczny wskaźnik wartości browarnej	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Avatar	pastewny	2019		PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Tulce
2	RGT Planet	7,8	2016	2020	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice
3	Runner	pastewny	2018		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
4	Rubaszek	pastewny	2014		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
5	Radek	pastewny	2015	2019	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
6	KWS Vermont	pastewny	2016	2018	DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
7	Bente	pastewny	2017	2020	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
8	Etoile	pastewny	2018	2020	DE	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
9	Farmer	pastewny	2018	2020	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
10	Ismena	pastewny	2018		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
11	MHR Fajter	pastewny	2018		PL	Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. Kraków
12	Pilote	pastewny	2018		CH	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
13	Rezus	pastewny	2018	2021	PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
14	Brandon	pastewny	2019		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
15	Forman	pastewny	2019		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
16	KWS Fantex	pastewny	2019		DE	KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice
17	Mecenas	pastewny	2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
18	MHR Filar	pastewny	2019		PL	Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. Kraków
19	MHR Krajan	pastewny	2019		PL	Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. Kraków
20	Raptus	pastewny	2019		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
21	Adwokat	pastewny	2020	2021 w	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
22	Brigitta	pastewny	2020		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
23	Feedway	pastewny	2020		DK	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
24	Flair	pastewny	2020		DK	SCANDAGRA Polska sp. z o.o. Żółędowo
25	Jovita	pastewny	2020		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
26	Pasjonat	pastewny	2020		PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Tulce

* LOZ – Lista Odmian Zalecanych, (odmiana Rubaszek – w latach 2017-2020 na LOZ),

Tab. 71. Jęczmień jary. Zbiórce wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha		Głębocze		Bąków		Pągów	
			a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
1	Termin kłoszenia	(dzień, m-c)	05.06	08.06	07.06	07.06	22.05	22.05
2	Termin dojrzałości woskowej	(dzień, m-c)	01.07	04.07	02.07	02.07	-	-
3	Wysokość roślin	(cm)	88	84	93	92	-	-
4	Wyleganie roślin w dojrzałości mleczej	(skala 9°)	2,2	1,8	-	-	-	-
5	Wyleganie roślin przed zbiorem	(skala 9°)	1	1	-	-	5,5	6,9
6	Porażenie przez choroby	(skala 9°)						
	Mączniak właściwy		9,0	9,0	8,4	9,0	7,2	9,0
	Rdza karłowa		7,7	9,0	7,3	9,0	7,6	9,0
	Plamistość siatkowa		7,6	9,0	9,0	9,0	7,4	9,0
	Rynchosporioza		8,4	9,0	9,0	9,0	8,4	9,0
7	Masa 1000 ziaren	(g)	30,2	31,4	35,0	37,9	-	-
8	Zawartość białka	(%)	17,2	17,3	22,3	22,3	15,6	16,5
9	Wilgotność ziarna podczas zbioru	(%)	10,8	11,2	11,8	12,1	8,5	8,4
10	Plon ziarna	(dt z ha)	50,6	55,3	26,1	36,9	38,7	47,9

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian a₁ – przeciętny, a₂ – intensywny poziom agrotechniki

Tab. 72. Jęczmień jary. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	38,5	62,6	75,4	50,6	58,8	46,7	66,0	83,9	56,4	65,5
1	Avatar	103	110	-	107	-	97	111	-	104	-
2	RGT Planet	LOZ	103	102	107	103	100	106	100	103	102
3	Runner		95	109	96	102	94	104	100	99	99
4	Rubaszek		86	98	102	92	91	92	100	91	94
5	Radek	LOZ	101	104	105	102	103	96	98	99	98
6	KWS Vermont	LOZ	107	108	102	107	106	113	105	103	109
7	Bente	LOZ	105	114	103	110	107	101	112	110	107
8	Etoile	LOZ	99	110	105	105	105	97	108	104	103
9	Farmer	LOZ	118	107	100	113	108	105	111	97	108
10	Ismena		100	99	102	99	100	98	97	98	97
11	MHR Fajter		90	108	94	99	97	78	101	96	89
12	Pilote		103	104	105	104	104	96	105	101	100
13	Rezus	LOZ	116	100	105	108	107	120	106	102	113
14	Brandon		97	103	-	100	-	104	97	-	100
15	Forman		104	101	-	102	-	101	97	-	99
16	KWS Fantex		104	103	-	103	-	104	108	-	106
17	Mecenas		93	102	-	98	-	99	104	-	102
18	MHR Filar		95	94	-	95	-	111	93	-	102
19	MHR Krajan		100	90	-	95	-	101	91	-	96
20	Raptus		87	95	-	91	-	92	103	-	97
21	Adwokat	LOZw	122	-	-	-	-	121	-	-	-
22	Brigitta		81	-	-	-	-	92	-	-	-
23	Feedway		92	-	-	-	-	91	-	-	-
24	Flair		96	-	-	-	-	102	-	-	-
25	Jovita		92	-	-	-	-	95	-	-	-
26	Pasjonat		108	-	-	-	-	99	-	-	-
	Liczba doświadczeń	3	3	3	6	9	3	3	3	6	9

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ –Lista Odmian Zalecanych, w – odmiana zalecana wstępnie, a₁- przeciętny, a₂- intensywny poziom agrotechniki

Tab. 73. Jęczmień jary. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Poziom a ₁						Poziom a ₂					
			Głębocze		Bąków		Pągów		Głębocze		Bąków		Pągów	
			2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha			50,6	69,5	26,1	50,5	38,7	56,5	55,3	74,2	36,9	56,5	47,9	65,9
1	Avatar		87	-	102	-	120	-	92	-	94	-	105	-
2	RGT Planet	LOZ	99	105	97	97	113	109	101	104	97	97	103	105
3	Runner		102	101	85	98	99	103	101	102	91	96	90	100
4	Rubaszek		96	95	76	96	86	96	91	93	86	92	95	99
5	Radek	LOZ	95	101	118	111	90	97	103	100	98	98	88	95
6	KWS Vermont	LOZ	114	105	91	101	115	112	113	106	122	109	105	106
7	Bente	LOZ	109	105	128	120	80	100	87	104	120	113	97	107
8	Etoile	LOZ	81	99	112	108	104	106	95	105	96	99	101	105
9	Farmer	LOZ	110	105	107	107	138	113	95	102	103	106	116	105
10	Ismena		109	103	98	102	92	96	111	102	95	97	87	94
11	MHR Fajter		100	102	95	97	75	93	83	95	79	91	72	88
12	Pilote		111	106	90	100	108	105	106	101	87	101	95	100
13	Rezus	LOZ	109	106	106	98	134	117	122	111	123	109	113	107
14	Brandon		98	-	103	-	90	-	89	-	112	-	110	-
15	Forman		99	-	99	-	113	-	99	-	104	-	101	-
16	KWS Fantex		112	-	104	-	95	-	105	-	107	-	101	-
17	Mecenas		96	-	91	-	92	-	99	-	98	-	101	-
18	MHR Filar		101	-	100	-	84	-	105	-	101	-	128	-
19	MHR Krajana		84	-	123	-	95	-	101	-	120	-	84	-
20	Raptus		93	-	83	-	85	-	98	-	100	-	77	-
21	Adwokat	LOZw	111	-	123	-	133	-	117	-	119	-	128	-
22	Brigitta		81	-	79	-	83	-	82	-	88	-	107	-
23	Feedway		106	-	83	-	87	-	98	-	66	-	109	-
24	Flair		96	-	91	-	100	-	111	-	94	-	102	-
25	Jovita		100	-	91	-	87	-	99	-	109	-	78	-
26	Pasionat		102	-	119	-	103	-	97	-	95	-	106	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ –Lista Odmian Zalecanych, w – odmiana zalecana wstępnie, a₁ - przeciętny, a₂ - intensywny poziom agrotechniki

Tab. 74. Jęczmień jary. Głębocze - poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiany	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
		50,2	73,0	83,7	61,6	69,0	55,1	74,1	92,7	64,6	74,0
1	Avatar	87	107	-	97	-	93	107	-	100	-
2	RGT Planet	100	104	114	102	106	101	111	101	106	104
3	Runner	103	112	89	108	101	101	108	99	105	103
4	KWS Olof	94	97	97	95	96	90	94	102	92	95
5	Rubaszek	97	94	97	95	96	91	92	95	92	93
6	Radek	96	106	103	101	102	103	99	99	101	100
7	KWS Vermont	115	103	98	109	105	114	101	104	107	106
8	Paustian	112	87	108	100	102	114	93	104	104	104
9	Airway	91	101	95	96	96	106	97	99	101	101
10	Bente	110	109	98	109	106	87	115	110	101	104
11	Eldorado	93	90	99	92	94	96	95	99	95	97
12	Etoile	81	114	104	98	100	95	114	105	104	105
13	Farmer	111	108	99	109	106	96	110	102	103	103
14	Ismena	110	96	105	103	104	111	94	102	103	102
15	MHR Fajter	101	111	98	106	103	84	106	97	95	96
16	Pilote	112	101	108	107	107	106	98	101	102	102
17	Rezus	110	106	104	108	107	123	106	105	114	111
18	Brandon	98	96	-	97	-	90	95	-	92	-
19	Fandaga	80	95	-	88	-	89	95	-	92	-
20	Forman	100	101	-	101	-	99	100	-	100	-
21	KWS Fantex	113	102	-	108	-	105	103	-	104	-
22	Lupus	96	88	-	92	-	98	83	-	90	-
23	Mecenas	97	103	-	100	-	100	109	-	104	-
24	MHR Filar	102	102	-	102	-	105	101	-	103	-
25	MHR Krajana	84	93	-	89	-	101	96	-	98	-
26	Raptus	94	97	-	95	-	98	100	-	99	-
27	Adwokat	112	-	-	-	-	117	-	-	-	-
28	Amidala	107	-	-	-	-	80	-	-	-	-
29	Brigitta	81	-	-	-	-	82	-	-	-	-
30	Feedway	107	-	-	-	-	98	-	-	-	-
31	Flair	96	-	-	-	-	111	-	-	-	-
32	Jovita	100	-	-	-	-	99	-	-	-	-
33	Mariola	109	-	-	-	-	107	-	-	-	-
34	Pasjonat	102	-	-	-	-	97	-	-	-	-
35	RGT Ylesia	112	-	-	-	-	112	-	-	-	-
36	Regency	70	-	-	-	-	91	-	-	-	-
37	Escalena	117	-	-	-	-	107	-	-	-	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian w – odmiana zalecana wstępnie, a₁ - przeciętny, a₂ - intensywny poziom agrotechniki LOZ –Lista Odmian Zalecanych,

Tab. 75. Jęczmień jary. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020.

Lp.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)				Wyleganie (skala 9°)				Masa 1000 ziaren (g)				Zawartość białka (%)	
		2020 *		2018-2020		2020 **		2018-2020		2020 *		2018-2020		2020	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
	Wzorzec	78	75	77	73	3,3	3,9	3,0	4,0	31,4	33,5	37,3	38,6	18,3	18,7
1	Avatar	100	92	-	-	3,0	4,0	-	-	33,3	33,0	-	-	17,4	19,1
2	RGT Planet	89	90	79	77	3,3	3,8	4,3	4,4	28,8	33,2	35,8	38,3	17,5	17,8
3	Runner	85	86	76	73	3,0	3,8	4,6	4,7	32,5	34,3	38,5	40,1	20,2	18,9
4	Rubaszek	87	86	76	73	3,3	4,0	4,8	5,0	29,0	30,0	35,5	35,7	18,8	19,2
5	Radek	100	93	86	80	3,0	4,0	4,7	5,1	33,6	34,2	37,8	38,6	18,6	20,1
6	KWS Vermont	87	88	79	75	3,3	3,8	4,8	5,0	30,9	35,5	37,2	39,0	18,4	18,7
7	Bente	93	90	82	78	3,0	4,0	4,6	5,7	33,9	32,5	39,7	39,8	18,2	18,5
8	Etoile	91	89	79	76	3,3	3,8	4,5	4,5	29,3	30,9	36,0	37,7	19,5	18,8
9	Farmer	95	95	82	80	3,3	3,8	5,3	6,1	32,0	35,5	38,8	41,0	17,8	18,6
10	Ismena	96	90	81	76	3,5	3,8	4,4	4,5	28,7	32,4	35,6	37,2	20,0	17,8
11	MHR Fajter	89	94	78	76	3,3	4,0	4,6	4,5	32,0	34,0	38,2	39,4	18,7	19,9
12	Pilote	89	84	79	74	3,3	4,0	4,7	4,8	32,1	32,1	37,8	38,7	17,8	18,4
13	Rezus	85	83	78	73	3,0	4,0	4,7	5,6	33,9	37,3	38,5	39,8	18,5	18,0
14	Brandon	96	91	-	-	4,8	4,5	-	-	29,0	32,7	-	-	19,4	18,1
15	Forman	87	88	-	-	3,3	4,0	-	-	31,0	33,8	-	-	17,9	18,9
16	KWS Fantex	87	84	-	-	4,3	4,8	-	-	32,1	33,4	-	-	17,2	17,3
17	Mecenas	91	98	-	-	3,8	4,5	-	-	32,0	35,7	-	-	19,4	20,2
18	MHR Filar	83	86	-	-	5,3	5,0	-	-	33,7	35,5	-	-	17,9	18,0
19	MHR Krajan	94	89	-	-	4,5	4,3	-	-	29,2	34,2	-	-	19,1	18,4
20	Raptus	90	89	-	-	4,0	3,8	-	-	30,6	32,1	-	-	17,3	18,4
21	Adwokat	86	82	-	-	3,5	4,3	-	-	33,1	37,3	-	-	17,1	18,4
22	Brigitta	86	83	-	-	3,8	4,0	-	-	29,0	30,9	-	-	18,3	19,6
23	Feedway	86	89	-	-	3,8	4,8	-	-	30,0	29,9	-	-	18,6	19,7
24	Flair	83	81	-	-	4,3	4,5	-	-	29,4	31,8	-	-	18,2	17,5
25	Jovita	90	85	-	-	3,5	4,0	-	-	31,0	33,7	-	-	17,8	19,7
26	Pasjonat	105	91	-	-	4,3	4,8	-	-	35,8	35,2	-	-	17,7	18,6
Liczba doświadczeń		2		8		2		8		2		8		3	

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

* Dane dla Głubczyc i Bąkowa

** Dane dla Głubczyc i Pągowa

Tab. 76. Jęczmień jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Mączniak właściwy			Rdza karłowa			Plamistość siatkowa			Rynchosporioza		
		Głubczyce	Bąków	Pągów	Głubczyce	Bąków	Pągów	Głubczyce	Bąków	Pągów	Głubczyce	Bąków	Pągów
	Wzorzec (skala 9°)	9,0	8,4	7,2	7,7	7,3	7,6	7,6	9,0	7,4	8,4	9,0	8,4
1	Avatar	9,0	7,5	8,0	9,0	6,5	8,0	9,0	9,0	8,0	8,5	9,0	8,0
2	RGT Planet	9,0	9,0	8,0	6,5	8,0	8,0	8,0	9,0	8,0	8,5	9,0	9,0
3	Runner	9,0	8,5	7,0	7,5	7,5	8,0	6,0	9,0	7,0	9,0	9,0	8,5
4	Rubaszek	9,0	9,0	7,0	9,0	7,0	7,0	9,0	9,0	7,0	6,5	9,0	9,0
5	Radek	9,0	9,0	7,0	9,0	7,5	7,0	8,5	9,0	6,5	8,0	9,0	8,5
6	KWS Vermont	9,0	9,0	8,0	4,0	8,0	8,0	7,0	9,0	8,0	9,0	9,0	8,5
7	Bente	9,0	8,5	7,0	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0	7,0	7,5	9,0	8,5
8	Etoile	9,0	9,0	7,0	8,5	7,5	8,0	7,5	9,0	7,0	9,0	8,5	9,0
9	Farmer	9,0	9,0	7,0	8,5	7,5	8,0	7,0	9,0	8,0	8,0	9,0	8,5
10	Ismena	9,0	8,5	7,0	9,0	6,0	8,0	5,5	9,0	6,0	9,0	9,0	8,5
11	MHR Fajter	9,0	9,0	7,0	8,0	7,5	7,0	8,5	9,0	6,5	8,0	9,0	8,0
12	Pilote	9,0	8,5	7,0	8,5	8,0	8,0	7,0	8,5	7,0	9,0	9,0	8,0
13	Rezus	9,0	5,0	8,0	9,0	7,5	8,0	6,5	9,0	8,0	8,5	9,0	8,5
14	Brandon	9,0	9,0	7,0	8,5	7,5	7,0	8,0	9,0	7,5	8,0	9,0	8,5
15	Forman	9,0	9,0	8,0	7,5	7,0	8,0	9,0	9,0	7,5	8,0	8,5	8,0
16	KWS Fantex	9,0	8,0	7,0	7,5	7,5	8,0	8,0	9,0	7,0	9,0	9,0	8,5
17	Mecenas	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,5	9,0	7,0	8,0	9,0	8,5
18	MHR Filar	9,0	6,0	7,0	9,0	7,0	7,0	8,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0
19	MHR Krajan	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	6,5	9,0	7,0	9,0	9,0	8,5
20	Raptus	9,0	9,0	7,0	6,0	7,0	7,0	8,0	9,0	7,0	9,0	9,0	8,0
21	Adwokat	9,0	8,5	8,0	7,0	7,5	8,0	6,5	9,0	8,5	9,0	9,0	8,0
22	Brigitta	9,0	9,0	7,0	9,0	8,0	7,5	8,5	8,5	8,0	8,0	9,0	8,5
23	Feedway	9,0	9,0	7,0	5,5	8,0	7,5	8,0	9,0	8,0	9,0	9,0	8,0
24	Flair	9,0	9,0	7,0	8,5	8,0	7,5	7,0	9,0	7,0	8,5	9,0	8,5
25	Jovita	9,0	9,0	7,0	5,0	7,5	7,5	6,5	9,0	7,0	9,0	9,0	8,5
26	Pasjonat	9,0	8,5	7,0	9,0	6,5	7,0	8,0	9,0	8,0	7,0	9,0	8,0

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

JĘCZMIEN JARY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

LP.	ODMIANA	GRUPA WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA ŁOŻ	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020	
					a ₁	a ₂
1	ADWOKAT	pastewny	2020	2021 w	122*	121*
2	BENTE	pastewny	2017	2020	107	108
3	ETOILE	pastewny	2018	2020	105	103
4	FARMER	pastewny	2018	2020	108	104
5	KWS VERMONT	pastewny	2016	2018	106	107
6	RADEK	pastewny	2015	2019	103	98
7	REZUS	pastewny	2018	2021	107	109
8	RGT PLANET	browarny	2016	2020	104	102

KR – Krajowy Rejestr Odmian

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

w – odmiana zalecana wstępnie

a₁ – 58,8 dt/ha – przeciętny poziom agrotechniki

a₂ – 65,5 dt/ha – intensywny poziom agrotechniki

*- dla odmiany Adwokat wzorzec z 2020 r. (a₁ – 38,5, a₂ – 46,7 dt/ha)



7. OWIES

Doświadczenia z owsem prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doбором 24 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doбором wojewódzkim 14 odmian na jednym, przeciętnym poziomie agrotechniki. W latach 2018 - 2020 wykonano łącznie 9 udanych doświadczeń w województwie opolskim. W tabelach poniżej przedstawiono warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze.

Średni plon ziarna w 3-leciu wyniósł 65,0 dt/ha. Wyżej plonowały odmiany Agent, Kozak, Bingo, Lion oraz Perun. Plon ziarna wahał się od 59,6 dt/ha w Łosiowie do 71,3 dt/ha w Głubczycach. W Głubczycach, na poszerzonym doborze najwyższe plonowały odmiany Komfort, Harnaś, Agent, Monsun, Bingo, Elegant i Lion a najniższe odmiany nagie.

Odmiany owsa cechowały się dość dużym wyleganiem, niską mtz i wyższą zawartością łuski. Zawartością białka wyróżniały się Panteon, Rambo i Perun, a tłuszczu Refleks i Agent. Z chorób grzybowych w większym nasileniu wystąpiły mączniak właściwy, helmintosporioza i fuzarioza wiech. Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się: AGENT, BINGO, HARNASZ, KOZAK i MONSUN (wszystkie żółtoziarniste).

Tab. 77. Owies. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość	Głubczyce	Bąków	Łosiów
Powiat	Głubczyce	Kluczbork	Brzeg
Kompleks rolniczej przydatności gleby	1	2	2
Klasa bonitacyjna gleby	II	IVa	IVa
pH gleby w KCl	6,2	5,6	6,6
Przedplon	Kukurydza na ziarno	Kukurydza na ziarno	Pszenvica ozima
Data siewu (dzień, m-c)	19.03	26.03	18.03
Obsada roślin (szt./m²)	450		
Data zbioru (dzień, m-c)	17.08	11.08	11.08
N (kg/ha)	84	68	80
P₂O₅ (kg/ha)	74	40	0
K₂O (kg/ha)	93	60	0
Nawożenie dolistne (l,kg/ha)	MgSO₄ – 5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Mn – 3+ ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 12-4-6+S – 5	MgSO₄ – 5 + ADOB Cu – 1 + ADOB Mn – 3+ ADOB Zn – 0,5 + Basfoliar 36 Extra – 5 MgSO₄ – 5	
Zaprawa nasienna (nazwa)	Kinto Duo 080 FS		
Herbicydy (g, l/ha)	Mustang Forte 195 SE – 0,8		Fundamentum 700 WG – 25
Insektycydy (kg,l/ha)	Los Ovados 200 SE – 0,1 + Sparviero – 0,075 Decis Mega 50 EW – 0,1 Proteus 110 OD – 0,5 Los Ovados 200 SE – 0.1	Fastac Active 050 ME – 0,2	Delux 050 CS – 0,1

Tab. 78. Owies. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Agent	2018	2021	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
2	Kozak	2017	2018	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
3	Rambo	2020		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
4	Bingo	2009	2011	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
5	Harnaś	2014	2016	PL	Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. Kraków
6	Monsun	2017	2018	DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
7	Lion	2018		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
8	Figaro	2019		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
9	Pablo	2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
10	Perun	2019		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
11	Refleks	2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
12	Huzar	2020		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
13	Panteon	2020		DE	Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
14	Poker	2020		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń

*Lista Odmian Zalecanych

Tab. 79. Owies. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głębocze	Bąków	Łosiów
1	Termin wiechowania (dzień, m-c)	11.06	10.06	29.05
2	Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c)	15.07	13.07	26.06
3	Wysokość roślin (cm)	108	114	115
4	Wyleganie roślin w dojrzałości mlecznej (skala 9°)	4,0	9,0	9,0
5	Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9°)	1,0	5,9	3,3
6	Porażenie przez choroby (skala 9°)			
	Mączniak właściwy	6,9	5,8	-
	Rdza wieńcowa	9,0	9,0	9,0
	Helminthosporioza	7,9	6,9	7,8
	Fuzarioza kłosów	6,5	-	8,5
7	Masa 1000 ziaren (g)	31,0	36,7	38,0
8	Udział łuski (%)	21,2	22,0	-
9	Zawartość białka (% s.m)	15,4	20,3	10,0
10	Zawartość tłuszczu (% s.m)	3,9	4,3	4,7
11	Wilgotność ziarna podczas zbioru (%)	13,7	10,7	10,7
12	Plon ziarna (dt z ha)	62,4	59,8	62,6

Tab. 80. Owies. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	61,6	59,0	74,4	60,3	65,0
1	Agent LOZ	106	100	101	103	102
2	Kozak LOZ	96	103	103	99	101
3	Rambo	101	-	-	-	-
4	Bingo LOZ	104	97	103	100	101
5	Harnaś LOZ	101	94	102	97	99
6	Monsun LOZ	102	98	100	100	100
7	Lion	100	103	100	101	101
8	Figaro	99	104	-	102	-
9	Pablo	97	105	-	101	-
10	Perun	101	104	-	103	-
11	Refleks	105	98	-	102	-
12	Huzar	91	-	-	-	-
13	Panteon	94	-	-	-	-
14	Poker	105	-	-	-	-
	Liczba doświadczeń	3	3	3	6	9

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ –Lista Odmian Zalecanych,

Tab. 81. Owies. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Głubczyce		Bąków		Łosiów	
			2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha			62,4	71,3	59,8	64,1	62,6	59,6
1	Agent	LOZ	99	100	115	103	103	103
2	Kozak	LOZ	90	97	103	107	94	97
3	Rambo		100	-	103	-	101	-
4	Bingo	LOZ	97	100	116	106	99	98
5	Harnaś	LOZ	101	101	99	94	102	102
6	Monsun	LOZ	97	100	98	99	112	102
7	Lion		98	99	96	103	105	101
8	Figaro		94	-	113	-	89	-
9	Pablo		105	-	94	-	92	-
10	Perun		100	-	98	-	105	-
11	Refleks		116	-	92	-	107	-
12	Huzar		85	-	82	-	104	-
13	Panteon		100	-	87	-	95	-
14	Poker		119	-	105	-	91	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ –Lista Odmian Zalecanych,

Tab. 82. Owies . Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha		60,0	57,8	86,4	58,9	68,1
1	Agent	LOZ	103	106	106	104	105
2	Kozak	LOZ	94	105	107	99	102
3	Rambo		104	-	-	-	-
4	Bingo	LOZ	101	105	107	103	104
5	Siwek	n	88	76	82	82	82
6	Komfort		114	106	111	110	110
7	Amant	n	75	78	71	76	75
8	Harnaś	LOZ	105	98	114	101	106
9	Nawigator		97	106	98	101	100
10	Paskal		113	-	-	-	-
11	Elegant		98	105	108	102	104
12	Romulus		91	100	99	95	97
13	Armani		94	101	109	98	101
14	Monsun	LOZ	101	105	109	103	105
15	Lion		102	106	102	104	103
16	Arkan		90	107	-	99	-
17	Figaro		98	110	-	104	-
18	Pablo		109	105	-	107	-
19	Perun		104	106	-	105	-
20	Refleks		121	104	-	112	-
21	Huzar		89	-	-	-	-
22	MHR Harem		83	-	-	-	-
23	Panteon		104	-	-	-	-
24	Poker		123	-	-	-	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, n – odmiana naga, LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 83. Owies. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020.

Lp.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)		Masa 1000 ziaren (g)		Udział łuski (%)		Zawartość białka (% s.m.)	Zawartość tłuszczu (% s.m.)
		2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020*	2018-2020*		
Wzorzec		112	109	3,4	5,9	35,2	35,3	21,5	26,7	15,2	4,3
1	Agent	113	109	3,9	6,2	37,8	37,2	12,3	21,6	14,2	4,9
2	Kozak	115	112	3,4	6,0	33,8	33,7	22,8	26,1	12,2	4,4
3	Rambo	114	-	2,8	-	34,5	-	20,6	-	16,6	4,7
4	Bingo	113	110	3,8	6,0	37,9	37,8	20,8	24,6	15,1	4,8
5	Harnaś	109	105	3,9	6,2	34,8	34,7	27,3	32,9	15,9	4,0
6	Monsun	113	109	3,3	5,9	35,6	35,4	21,4	26,5	15,2	4,2
7	Lion	112	107	3,8	5,9	35,2	34,1	21,9	25,1	15,6	4,1
8	Figaro	117	-	4,1	-	33,7	-	26,5	-	14,6	3,4
9	Pablo	110	-	3,0	-	37,0	-	21,1	-	14,5	4,7
10	Perun	107	-	3,6	-	33,8	-	22,0	-	16,6	3,8
11	Refleks	112	-	2,9	-	35,4	-	19,9	-	15,6	5,0
12	Huzar	116	-	3,3	-	33,6	-	21,6	-	15,3	3,6
13	Panteon	108	-	2,9	-	35,4	-	22,5	-	17,0	4,1
14	Poker	111	-	3,2	-	34,3	-	20,8	-	14,8	4,1
Liczba doświadczeń		3	9	3	9	3	9	2	6	3	3

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, *- dane z dwóch lokalizacji (Głubczyce, Bąków)

Tab. 84. Owies. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Mączniak właściwy			Rdza wieńcowa			Helmintosporioza			Fuzarioza kłosów		
		Głębzczyk	Bąków	Łosiów	Głębzczyk	Bąków	Łosiów	Głębzczyk	Bąków	Łosiów	Głębzczyk	Bąków	Łosiów
	Wzorzec skala 9°	6,9	5,8	-	9,0	9,0	9,0	7,9	6,9	7,8	6,5	-	8,5
1	Agent	7,0	7,3	-	9,0	9,0	9,0	8,7	6,3	8,0	6,0	-	8,3
2	Kozak	7,0	6,0	-	9,0	9,0	9,0	8,3	6,7	7,0	6,3	-	8,7
3	Rambo	7,7	7,0	-	9,0	9,0	9,0	8,7	7,3	8,0	6,7	-	8,7
4	Bingo	8,0	7,3	-	9,0	9,0	9,0	8,3	6,3	7,7	6,0	-	8,7
5	Harnaś	6,7	5,7	-	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	7,7	6,3	-	8,0
6	Monsun	6,3	5,3	-	9,0	9,0	9,0	7,0	6,3	7,7	6,3	-	9,0
7	Lion	6,3	4,7	-	9,0	9,0	9,0	8,0	7,3	8,0	6,7	-	8,3
8	Figaro	6,0	6,0	-	9,0	9,0	9,0	8,7	7,7	8,0	6,7	-	8,7
9	Pablo	7,7	7,0	-	9,0	9,0	9,0	8,0	7,3	8,0	7,0	-	8,7
10	Perun	7,0	5,3	-	9,0	9,0	9,0	7,7	8,0	8,0	6,3	-	8,7
11	Refleks	6,7	5,7	-	9,0	9,0	9,0	7,0	6,3	7,7	6,3	-	8,7
12	Huzar	6,3	4,0	-	9,0	9,0	9,0	6,3	7,3	8,0	6,7	-	8,7
13	Panteon	7,3	4,7	-	9,0	9,0	9,0	8,3	6,7	8,0	6,3	-	8,3
14	Poker	6,3	4,7	-	9,0	9,0	9,0	8,0	6,3	7,7	7,0	-	8,3

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

JĘCZMIEN JARY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp.	ODMIANA		ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020
1	AGENT	ż	2018	2021	102
2	BINGO	ż	2009	2011	101
3	HARNAŚ	ż	2014	2016	99
4	KOZAK	ż	2017	2018	101
5	MONSUN	ż	2017	2018	100

KR – Krajowy Rejestr Odmian

ż – odmiana żółtoziarnista

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian – 65,0 dt/ha

8. RZEPAK OZIMY

Doświadczenia z rzepakiem ozimym prowadzono w Głubczycach, Bąkowie i Pągowie z pełnym doбором 57 odmian oraz w Łosiowie z doбором 37 odmian na jednym, intensywnym poziomie agrotechniki. Zastosowano nawozy dolistne, herbicydy i insektycydy.

W Głubczycach i Łosiowie wyniki doświadczeń dotyczą wszystkich lat, w Bąkowie lat 2019-2020, a w Pągowie 2020 roku.

Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze przedstawiono w poniższych tabelach.

W 3-leciu średni plon nasion rzepaku ozimego wynosił 42,0 dt/ha przy doborze 57 odmian oraz 39,4 dt/ha przy doborze 37 odmian.

Do najwyższej plonujących odmian należały Anniston, DK Expansion, DK Extract, Architect, DK Expiro i Stefano KWS. Ogólnie odmiana półkarłowa Thure i odmiany cechujące się odpornością na kiłę kapusty Augusta i Alasco plonowały słabiej.

Średnio w 3-leciu najwyższą odmianą była Architect, a najniższą półkarłowa Thure. Do bardziej odpornych na wyleganie należały SY Ilona, Anniston, Trezzor, Alasco, Kicker i Popular. W dojrzałości technicznej nie było istotnych różnic. Przy dużym, (średnio 27%) porażeniu roślin przez choroby łodyg do bardziej odpornych należała odmiana KWS Stefano, a bardziej podatnymi były Architect, Birdy i Alasco.

Tab. 85. Rzepak ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość	Głubczyce	Bąków	Pągów	Łosiów
Powiat	Głubczyce	Kluczbork	Namysłów	Brzeg
Kompleks rolniczej przydatności gleby	1	4	2	2
Klasa bonitacyjna gleby	II	IV a	III a	III b
pH gleby w KCl	6,6	6,2	6,7	6,5
Przedplon	Pszennica ozima	Pszennica ozima	Pszennica ozima	Pszennica ozima
Data siewu (dzień, m-c)	27.08	23.08	05.09	27.08
Obsada roślin (szt./m ²)	50/60	50/60	50/60	50/60
Data zbioru(dzień, m-c)	22.07	23.07	01.08	22.07
Nawożenie mineralne				
N (kg/ha)	18+97+55	18+78+83	8+16+26+46+52+54	100+80
P ₂ O ₅ (kg/ha)	45	75	28	15
K ₂ O (kg/ha)	89	75	42	32+40
SO ₄ (kg/ha)	126	15+39	-	50+13
MgO (kg/ha)	30	-	-	25+6
Nawożenie dolistne (kg, l/ha)	Basfoliar 12-4-6+S – 5 + MgSO ₄ – 5 + ADOB Siarka – 2+ ADOB Bor – 1,5 + ADOB Mn – 1,5 Basfoliar 6-12-6 – 5+ MgSO ₄ – 5 + ADOB Mo – 0,2 + ADOB Siarka – 2+ ADOB Mn – 1+ ADOB Bor – 1 ADOB Bor – 1 Basfoliar 12-4-6+S – 5+ MgSO ₄ – 5+ ADOB Siarka – 2+ ADOB Bor – 1	Basfoliar 6-12-6 – 5 Basfoliar Extra – 5	ADOB Bor – 2 + Basfoliar 12-4-6+S – 5 + MgSO ₄ – 10 ADOB Bor – 1 + Basfoliar 12-4-6+S – 2,5 + MgSO ₄ – 5	Basfoliar 12-4-6 – 5+ ADOB Bor – 1,5 + ADOB Mn – 1 + ADOB Mo – 0,1 Basfoliar 12-4-6 – 5+ ADOB Bor – 2 + ADOB 2.0 Mn – 1,5 + ADOB Mo – 0,2+ ADOB Cu – 1,5 Basfoliar 12-4-6 – 5+ ADOB Bor – 1,5 + ADOB Mn – 1 + ADOB Mo – 0,1 Basfoliar 36 Extra – 5 + ADOB Bor – 1 + ADOB Zn – 0,5+ ADOB Siarka – 2
Środki ochrony roślin				
Herbicydy (l/ha)	Metax 500 SC -1+ Baristo 500 SC – 1,15+ Efektor 360 CS – 0,15 Jenot 100 EC – 0,2 Navigator 360 SL – 0,2	Butisan Star 416 SC – 2,5 Labrador Extra 50EC – 1	Butisan Star Max – 2 Agil 100 EC – 0,5	Butisan Avant – 2,5 Select Super 120 EC – 0,8
Insektycydy (kg, l/ha)	Delmetros 100 SC – 0,05+ Los Ovados 200 SE – 0,05 Insodex 480 EC – 0,15 Mospilan 20 SP – 70 Insodex 480 EC – 0,15+ Delmetros 100 SC – 0,15 Los Ovados 200 SE – 0,25+ Sparviero – 0,075 Sparviero – 0,075 Proteus 110 OD – 0,3+ Karate Zeon 050 CS – 0,15 Proteus 110 OD – 0,5	Decis Mega 50EW – 0,15 Inazuma 130WG – 0,3 Inazuma 130WG – 0,3 Dursban 480 EC – 0,6 + Alfastop 100EC – 0,1 Proteus 110 OD – 0,6 Proteus 110 OD – 0,6	Delmetros 100 SC – 0,05 Inazuma 130 WG – 0,3 Insodex 480 EC – 0,6 Proteus 110 OD – 0,6 Proteus 110 OD – 0,6	Delmetros 100 SC – 0,05 Delmetros 100 SC – 0,05 Insodex 480 EC – 0,6+ Cyperkill Max 500 EC – 0,05 Proteus 110 OD – 0,6 Los Ovados 200 SE – 0,15
Fungicydy i regulatory wzrostu (kg, l/ha)	Mepik 300 SL – 0,7 Mepik 300 SL – 0,8 Pictor 400 SC – 0,5	Toprex 375 EC – 0,5	Mepik 300 SL – 0,8	-

Tab. 86. Rzepak ozimy. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana		Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	ES Valegro		2014		FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. - Poznań
2	SY Ilona		2016		DE	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
3	ES Fuego		2019		FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. - Poznań
4	Gemini		2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
5	Architect	F ₁	2017	2020	DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
6	Duke	F ₁	2019		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
7	Absolut	F ₁	2018		FR	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
8	Advocat	F ₁	2018		DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
9	Ambassador	F ₁	2019		DE/FR	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
10	Anniston	F ₁	2017	2020	FR/DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
11	Arkansas	F ₁	2018		FR	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
12	Artemis	F ₁	2019	2021 w	DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
13	Astana	F ₁	2018		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
14	Atora	F ₁	2015		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
15	Augusta kk	F ₁	2018		DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
16	Aurelia	F ₁	2019		DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
17	Bonanza	F ₁	2012	2016	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
18	Chopin	F ₁	2018	2021	DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
19	DK Expansion	F ₁	2017	2020	FR	Monsanto Polska sp. z o.o. - Warszawa
20	DK Expiro	F ₁	2016		FR	Monsanto Polska sp. z o.o. - Warszawa
21	DK Exporter	F ₁	2019		FR	Monsanto Polska sp. z o.o. - Warszawa
22	DK Extract	F ₁	2016	2017	FR	Monsanto Polska sp. z o.o. - Warszawa
23	Dominator	F ₁	2019	2021 w	DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
24	Dynamic	F ₁	2019		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
25	ES Imperio	F ₁	2016	2019	FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. - Poznań
26	INV1165	F ₁	2017		BE	BASF Polska Spółka z o.o. – Warszawa
27	INV1188	F ₁	2019		BE	BASF Polska Spółka z o.o. – Warszawa
28	Luciano KWS	F ₁	2019		DE	KWS Polska sp. z o.o. - Poznań
29	Prince	F ₁	2018	2021	DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
30	Riccardo KWS	F ₁	2019		DE	KWS Polska sp. z o.o. - Poznań
31	Stefano KWS	F ₁	2017	2019	DE	KWS Polska sp. z o.o. - Poznań
32	SY Florian	F ₁	2019		DE	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
33	SY Florida	F ₁	2015		DE	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
34	SY Iowa	F ₁	2018		DE	Syngenta Polska sp. z o.o. - Warszawa
35	Tatiana	F ₁	2018		FR	Monsanto Polska sp. z o.o. - Warszawa
36	Tigris	F ₁	2016	2019	FR	Monsanto Polska sp. z o.o. - Warszawa
37	Trezzor	F ₁	CCA	2021	CCA	RAGT Semences Polska sp. z o.o. - Łysomice
38	Bazalt		2016		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR- Kobylin
39	Birdy		2016		FR	KWS Polska sp. z o.o. - Poznań
40	Derrick		2018	2021	FR	KWS Polska sp. z o.o. - Poznań
41	Galileus		2018		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
42	Hevelius		2018	2020	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
43	Alasco kk	F ₁	2017		DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
44	Angelico	F ₁	2018		FR/DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
45	Aspect	F ₁	2018		DE	Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce - Komorniki
46	Copernicus	F ₁	2017		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR - Strzelce
47	Einstein	F ₁	2017		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
48	ES Cesario	F ₁	2016		FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. - Poznań
49	Hamilton	F ₁	2016		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
50	Inspiration	F ₁	2011		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
51	Kicker	F ₁	2017		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
52	Kuga	F ₁	2015		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
53	Popular	F ₁	2014		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
54	Ragnar	F ₁	2018		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
55	Taifun	F ₁	2016		DE	DSV Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
56	Thure p	F ₁	2015		DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o. - Wągrowiec
57	Marc KWS	F ₁	CCA		CCA	KWS Polska sp. z o.o. - Poznań

* LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiany Atora w latach 2016-2020; Kuga 2016-2019 na LOZ), w – odmiana zalecana wstępnie

F₁ – odmiana mieszańcowa;

CCA – odmiana z Katalogu UE;

p – odmiana półkardowa;

kk – odmiana o dużej odporności na cięć kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce;

w – odmiana zalecana wstępnie.

Tab. 87. Rzepak ozimy. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głębzcze	Bąków	Pągów	Łosiów
1	Obsada roślin w pąkowaniu (szt./m ²)	42	-	-	42
2	Stan roślin po zimie (skala 9 ⁰)	9,0	8,0	9,0	8,8
3	Dojrzałość techniczna (dni)	184	-	-	187
4	Wysokość roślin (cm)	130	133	144	126
5	Wyleganie (%)	7	7	19	23
6	Choroby łodyg (%)	11	13	32	16
7	Wilgotność nasion podczas zbioru (%)	9,1	8,7	5,3	9,3
8	Plon nasion (dt/ha)	49,3	42,4	39,5	41,5



Tab. 88. Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca) . Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana			2020						2020		2019		2018		2019-2020		2018-2020		
				Głubczyce		Bąków		Pągów		Łosiów		A	B	A	B	A	B	A	B	A
Wzorzec dt/ha				49,3 *	50,4 **	42,4 *	42,3 **	39,5 *	41,4 **	41,5 **	43,7	43,9	33,4	35,9	48,8	38,4	38,6	39,9	42,0	39,4
1	ES Valegro			81	79	96	97	95	91	88	91	89	86	85	105	96	89	87	94	90
2	SY Ilona			93	91	90	90	117	112	79	100	93	94	93	110	97	97	93	101	94
3	ES Fuego			101	99	97	97	86	82	103	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gemini			87	85	97	97	98	94	85	94	90	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Architect	F ₁	LOZ	111	108	87	87	121	115	102	106	103	99	98	129	109	103	101	111	103
6	Duke	F ₁		111	109	96	96	114	108	101	107	104	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Absolut	F ₁		117	114	104	105	89	85	96	103	100	117	111	-	-	110	106	-	-
8	Advocat	F ₁		102	100	106	107	107	102	89	105	99	107	105	-	-	106	102	-	-
9	Ambassador	F ₁		107	105	100	100	117	112	110	108	107	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Anniston	F ₁	LOZ	106	104	108	108	125	119	91	113	105	109	107	120	110	111	106	114	107
11	Arkansas	F ₁		108	106	105	105	94	90	107	102	102	107	107	-	-	105	105	-	-
12	Artemis	F ₁	LOZ w	108	106	102	103	113	108	114	108	108	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Astana	F ₁		97	95	107	107	104	99	98	103	100	106	102	-	-	105	101	-	-
14	Atora	F ₁		96	94	114	114	95	91	105	102	101	94	94	98	93	98	98	98	96
15	Augusta	kk	F ₁	95	93	81	81	87	83	97	88	89	93	98	-	-	91	94	-	-
16	Aurelia	F ₁		110	108	110	111	97	92	103	106	103	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bonanza	F ₁	LOZ	104	102	104	104	103	98	95	104	100	110	107	99	103	107	104	104	103
18	Chopin	F ₁	LOZ	103	100	124	124	93	88	106	106	105	123	117	-	-	115	111	-	-
19	DK Expansion	F ₁	LOZ	103	101	91	92	121	115	107	105	104	101	105	132	109	103	105	113	106
20	DK Expiro	F ₁		106	103	93	93	96	91	113	98	100	107	105	128	106	103	103	111	104
21	DK Exporter	F ₁		108	106	90	90	113	108	105	104	103	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DK Extract	F ₁	LOZ	100	98	96	96	111	106	92	102	98	108	107	126	114	105	103	112	106
23	Dominator	F ₁	LOZ w	113	110	120	120	129	123	109	120	115	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dynamic	F ₁		113	110	99	99	120	114	106	110	107	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ES Imperio	F ₁	LOZ	102	100	99	99	107	102	100	103	100	112	-	112	-	108	-	109	-
26	INV1165	F ₁		98	96	83	83	102	97	104	94	95	88	92	123	106	91	94	102	98
27	INV1188	F ₁		99	97	95	95	103	98	92	99	95	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Luciano KWS	F ₁		103	100	91	91	102	97	100	99	97	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Prince	F ₁	LOZ	100	98	118	118	114	108	107	111	108	108	103	-	-	110	106	73	-
30	Riccardo KWS	F ₁		99	97	96	96	107	102	89	101	96	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Stefano KWS	F ₁	LOZ	110	108	106	106	105	100	100	107	103	102	102	125	109	105	103	111	105
32	SY Florian	F ₁		94	92	96	96	92	87	99	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SY Florida	F ₁		97	95	99	99	100	95	105	98	99	102	100	115	102	100	100	105	100
34	SY Iowa	F ₁		100	98	91	91	112	107	102	101	100	104	104	-	-	103	102	-	-
35	Tatiana	F ₁		92	90	92	92	90	86	103	91	93	104	101	-	-	98	97	-	-
36	Tigris	F ₁	LOZ	103	101	103	103	93	89	94	100	97	106	-	122	106	103	-	109	-
37	Trezzor	F ₁	LOZ	105	103	107	107	109	104	104	107	104	117	-	103	-	112	-	109	-
38	Bazalt			83	-	100	-	70	-	-	84	-	87	-	80	86	86	-	84	-
39	Birdy			102	-	119	-	96	-	-	106	-	103	-	93	93	105	-	101	-
40	Derrick		LOZ	105	-	110	-	86	-	-	100	-	108	102	-	-	104	-	-	-
41	Galileus			89	-	109	-	70	-	-	89	-	104	96	-	-	97	-	-	-
42	Hevelius		LOZ	89	-	92	-	66	-	-	82	-	102	95	-	-	92	-	-	-
43	Alasco	kk	F ₁	91	-	68	-	87	-	-	82	-	89	-	118	106	86	-	96	-
44	Angelico	F ₁		111	-	89	-	108	-	-	103	-	122	112	-	-	113	-	-	-
45	Aspect	F ₁		104	-	78	-	110	-	-	97	-	89	90	-	-	93	-	-	-
46	Copernicus	F ₁		92	-	94	-	73	-	-	86	-	100	-	118	111	93	-	101	-
47	Einstein	F ₁		96	-	92	-	97	-	-	95	-	96	-	83	87	96	-	91	-
48	ES Cesario	F ₁		104	-	98	-	104	-	-	102	-	111	-	112	-	107	-	108	-
49	Hamilton	F ₁		100	-	120	-	93	-	-	104	-	110	-	104	-	107	-	106	-
50	Inspiration	F ₁		100	-	98	-	100	-	-	100	-	95	-	106	-	98	-	100	-
51	Kicker	F ₁		94	-	102	-	100	-	-	99	-	107	-	93	92	103	-	100	-
52	Kuga	F ₁		95	-	104	-	90	-	-	96	-	100	96	79	83	98	-	92	-
53	Popular	F ₁		90	-	102	-	95	-	-	96	-	95	-	75	-	96	-	89	-
54	Ragnar	F ₁		91	-	112	-	99	-	-	101	-	89	90	-	-	95	-	-	-
55	Taifun	F ₁		93	-	103	-	84	-	-	93	-	100	-	71	87	97	-	88	-
56	Thure p	F ₁		91	-	106	-	94	-	-	97	-	104	94	97	-	101	-	99	-
57	Marc KWS	F ₁		100	-	109	-	96	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń				1	1	1	1	1	1	1	3	4	2	3	1	2	5	7	6	9

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian, LOZ – Lista Odmian Zalecanych

F₁ - odmiana mieszańcowa;

*- średnia dla 57 odmian – 42,0 dt/ha

** - średnia dla 37 odmian – 39,4 dt/ha

A – Głubczyce, Bąków, Pągów,

B – Głubczyce, Bąków, Pągów, Łosiów,

p – odmiana półkarłowa

kk – odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce

Tab. 89. Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności w miejscowościach (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana			Głubczyce			Bąków		Pągów	Łosiów		
				2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2020	2020	2019-2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha				49,3	42,6	44,6	42,4	36,7	39,5	41,5	40,6	35,4
1	ES Valegro			81	82	90	96	93	95	88	88	89
2	SY Ilona			93	94	99	90	92	117	79	87	88
3	ES Fuego			101	-	-	97	-	86	103	-	-
4	Gemini			87	-	-	97	-	98	85	-	-
5	Architect	F ₁	LOZ	111	109	115	87	89	121	102	101	100
6	Duke	F ₁		111	-	-	96	-	114	101	-	-
7	Absolut	F ₁		117	122	-	104	106	89	96	100	-
8	Advocat	F ₁		102	108	-	106	103	107	89	97	-
9	Ambassador	F ₁		107	-	-	100	-	117	110	-	-
10	Anniston	F ₁	LOZ	106	106	111	108	110	125	91	99	102
11	Arkansas	F ₁		108	110	-	105	104	94	107	108	-
12	Artemis	F ₁	LOZ w	108	-	-	102	-	113	114	-	-
13	Astana	F ₁		97	104	-	107	103	104	98	98	-
14	Atora	F ₁		96	93	94	114	106	95	105	101	99
15	Augusta kk	F ₁		95	95	-	81	86	87	97	105	-
16	Aurelia	F ₁		110	-	-	110	-	97	103	-	-
17	Bonanza	F ₁	LOZ	104	110	106	104	105	103	95	99	104
18	Chopin	F ₁	LOZ	103	113	-	124	124	93	106	108	-
19	DK Expansion	F ₁	LOZ	103	108	116	91	92	121	107	103	100
20	DK Expiro	F ₁		106	109	116	93	97	96	113	110	104
21	DK Exporter	F ₁		108	-	-	90	-	113	105	-	-
22	DK Extract	F ₁	LOZ	100	106	113	96	99	111	92	100	104
23	Dominator	F ₁	LOZ w	113	-	-	120	-	129	109	-	-
24	Dynamic	F ₁		113	-	-	99	-	120	106	-	-
25	ES Imperio	F ₁	LOZ	102	109	110	99	103	107	100	-	-
26	INV1165	F ₁		98	98	106	83	80	102	104	104	102
27	INV1188	F ₁		99	-	-	95	-	103	92	-	-
28	Luciano KWS	F ₁		103	-	-	91	-	102	100	-	-
29	Prince	F ₁	LOZ	100	102	-	118	115	114	107	102	-
30	Riccardo KWS	F ₁		99	-	-	96	-	107	89	-	-
31	Stefano KWS	F ₁	LOZ	110	106	112	106	105	105	100	103	102
32	SY Florian	F ₁		94	-	-	96	-	92	99	-	-
33	SY Florida	F ₁		97	101	105	99	99	100	105	103	101
34	SY Iowa	F ₁		100	105	-	91	95	112	102	105	-
35	Tatiana	F ₁		92	100	-	92	95	90	103	101	-
36	Tigris	F ₁	LOZ	103	106	111	103	103	93	94	-	-
37	Trezzor	F ₁	LOZ	105	112	109	107	110	109	104	-	-
38	Bazalt			83	80	80	100	98	70	-	-	-
39	Birdy			102	99	97	119	114	96	-	-	-
40	Derrick		LOZ	105	106	-	110	109	86	-	-	-
41	Galileus			89	92	-	109	111	70	-	-	-
42	Hevelius		LOZ	89	99	-	92	93	66	-	-	-
43	Alasco kk	F ₁		91	93	101	68	75	87	-	-	-
44	Angelico	F ₁		111	120	-	89	102	108	-	-	-
45	Aspect	F ₁		104	102	-	78	78	110	-	-	-
46	Copernicus	F ₁		92	91	100	94	102	73	-	-	-
47	Einstein	F ₁		96	98	93	92	93	97	-	-	-
48	ES Cesario	F ₁		104	103	106	98	109	104	-	-	-
49	Hamilton	F ₁		100	103	103	120	117	93	-	-	-
50	Inspiration	F ₁		100	92	97	98	103	100	-	-	-
51	Kicker	F ₁		94	98	97	102	107	100	-	-	-
52	Kuga	F ₁		95	92	88	104	107	90	-	-	-
53	Popular	F ₁		90	90	85	102	101	95	-	-	-
54	Ragnar	F ₁		91	86	-	112	104	99	-	-	-
55	Taifun	F ₁		93	101	91	103	97	84	-	-	-
56	Thure p	F ₁		91	94	95	106	108	94	-	-	-
57	Marc KWS	F ₁		100	-	-	109	-	96	-	-	-
Liczba doświadczeń				1	2	3	1	2	1	1	2	3

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian,

LOZ – Lista Odmian Zalecanych, w – odmiana zalecana wstępnie

F₁ – odmiana mieszańcowa,

p – odmiana półkarłowa

kk- odmiana o dużej odporności na kilę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce

Tab. 90. Rzepak ozimy. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Bąków, Pągów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)			Wyleganie (%)			Dojrzałość techniczna (liczba dni od pocz. roku)			Choroby łodyg (%)		
		2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec	136	140	141	11	9	9	184	179	181	19	25	27
1	ES Valegro	130	134	135	12	8	9	185	181	182	15	21	24
2	SY Ilona	130	136	137	11	7	7	185	181	182	16	22	24
3	ES Fuego	135	-	-	9	-	-	185	-	-	21	-	-
4	Gemini	137	-	-	10	-	-	183	-	-	18	-	-
5	Architect F ₁	144	148	149	9	6	11	183	178	180	21	29	33
6	Duke F ₁	135	-	-	12	-	-	183	-	-	20	-	-
7	Absolut F ₁	139	147	-	10	11	-	185	180	-	18	21	-
8	Advocat F ₁	141	147	-	9	6	-	185	180	-	14	22	-
9	Ambassador F ₁	137	-	-	9	-	-	183	-	-	22	-	-
10	Anniston F ₁	141	144	144	11	8	7	183	179	180	19	23	25
11	Arkansas F ₁	138	145	-	14	11	-	187	181	-	17	23	-
12	Artemis F ₁	142	-	-	8	-	-	185	-	-	24	-	-
13	Astana F ₁	127	135	-	12	7	-	183	179	-	14	25	-
14	Atora F ₁	140	145	146	12	8	9	185	180	181	18	26	27
15	Augusta kk F ₁	133	139	-	12	8	-	183	179	-	29	33	-
16	Aurelia F ₁	134	-	-	12	-	-	185	-	-	19	-	-
17	Bonanza F ₁	145	149	146	10	8	9	187	181	182	22	23	25
18	Chopin F ₁	139	142	-	11	7	-	183	179	-	20	24	-
19	DK Expansion F ₁	140	147	146	10	9	8	187	181	182	19	25	26
20	DK Expiro F ₁	139	142	142	14	12	9	187	181	182	21	26	29
21	DK Exporter F ₁	137	-	-	14	-	-	187	-	-	18	-	-
22	DK Extract F ₁	137	142	141	9	8	10	183	179	181	16	25	28
23	Dominator F ₁	139	-	-	10	-	-	183	-	-	15	-	-
24	Dynamic F ₁	138	-	-	11	-	-	183	-	-	14	-	-
25	ES Imperio F ₁	133	138	139	14	10	10	183	179	181	22	26	29
26	INV1165 F ₁	137	140	141	15	11	12	187	181	182	17	26	26
27	INV1188 F ₁	136	-	-	10	-	-	183	-	-	21	-	-
28	Luciano KWS F ₁	137	-	-	7	-	-	184	-	-	18	-	-
29	Prince F ₁	128	133	-	12	10	-	183	179	-	14	20	-
30	Riccardo KWS F ₁	137	-	-	8	-	-	184	-	-	16	-	-
31	Stefano KWS F ₁	143	148	147	10	7	8	183	179	181	16	20	21
32	SY Florian F ₁	131	-	-	12	-	-	185	-	-	16	-	-
33	SY Florida F ₁	132	141	141	15	9	10	184	179	181	21	25	25
34	SY Iowa F ₁	139	144	-	13	11	-	183	179	-	17	22	-
35	Tatiana F ₁	134	139	-	13	9	-	183	179	-	21	28	-
36	Tigris F ₁	138	144	143	18	13	12	187	181	182	19	26	28
37	Trezzor F ₁	134	140	140	7	6	7	183	179	180	18	22	25
38	Bazalt	134	141	141	11	9	10	187	182	182	18	23	27
39	Birdy	138	138	138	9	6	10	187	182	183	17	24	32
40	Derrick	132	136	-	11	8	-	184	180	-	14	24	-
41	Galileus	122	133	-	8	8	-	183	179	-	21	30	-
42	Hevelius	131	137	-	11	10	-	184	179	-	18	22	-
43	Alasco kk F ₁	138	141	140	11	7	7	185	180	181	24	27	31
44	Angelico F ₁	138	145	-	9	7	-	185	180	-	19	28	-
45	Aspect F ₁	140	143	-	9	6	-	184	180	-	27	30	-
46	Copernicus F ₁	136	142	142	15	15	12	183	178	181	23	27	28
47	Einstein F ₁	130	135	136	14	8	9	185	179	181	17	24	26
48	ES Cesario F ₁	129	134	137	12	8	10	183	178	180	25	26	29
49	Hamilton F ₁	134	140	142	11	10	10	183	179	180	19	25	26
50	Inspiration F ₁	143	144	145	12	9	9	183	179	181	19	22	26
51	Kicker F ₁	142	144	143	9	8	7	184	179	180	14	22	25
52	Kuga F ₁	135	138	140	12	8	9	183	179	181	19	27	27
53	Popular F ₁	128	134	136	10	7	7	184	180	181	13	20	23
54	Ragnar F ₁	135	140	-	10	9	-	184	180	-	18	24	-
55	Taifun F ₁	127	135	135	16	12	11	183	179	181	21	24	27
56	Thure p F ₁	123	131	130	13	10	9	187	182	183	14	22	24
57	Marc KWS F ₁	142	-	-	8	-	-	185	-	-	16	-	-
	Liczba doświadczeń	3	6	8	3	6	8	1	2	3	3	6	8

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian,

F₁ – odmiana mieszańcowa,

p – odmiana półkarłowa

kk- odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce

Tab. 91. Rzepak ozimy. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Bąków, Pagów, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)			Wyleganie (%)			Dojrzalność techniczna (liczba dni od pocz. roku)				Choroby łodyg (%)			
		2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020	2018-2020	2020	2019-2020
	Wzorzec	134	145	150	14	18	21	186	182	182	18	22	182	18	23
1	ES Valegro	129	140	146	14	18	21	186	182	183	15	19	183	15	22
2	SY Ilona	127	139	146	14	18	20	186	182	183	16	20	183	16	22
3	ES Fuego	132	-	-	13	-	-	186	-	-	20	-	-	20	-
4	Gemini	135	-	-	13	-	-	185	-	-	17	-	-	17	-
5	Architect	142	152	157	12	16	21	185	181	182	19	25	182	19	28
6	Duke	131	-	-	15	-	-	185	-	-	19	-	-	19	-
7	Absolut	137	149	-	14	20	-	186	182	-	18	20	-	18	-
8	Advocat	139	150	-	12	16	-	186	182	-	15	20	-	15	-
9	Ambassador	134	-	-	13	-	-	185	-	-	21	-	-	21	-
10	Anniston	139	148	154	14	18	20	185	181	182	18	21	182	18	23
11	Arkansas	135	148	-	16	21	-	187	182	-	17	21	-	17	-
12	Artemis	140	-	-	12	-	-	186	-	-	22	-	-	22	-
13	Astana	123	138	-	14	17	-	185	181	-	15	22	-	15	-
14	Atora	137	147	154	15	18	21	186	182	182	18	23	182	18	24
15	Augusta kk	131	143	-	14	18	-	185	181	-	25	28	-	25	-
16	Aurelia	132	-	-	15	-	-	186	-	-	18	-	-	18	-
17	Bonanza	143	152	156	13	18	21	187	183	183	20	21	183	20	22
18	Chopin	136	145	-	13	17	-	185	181	-	19	22	-	19	-
19	DK Expansion	138	150	154	14	18	20	182	182	183	18	23	182	18	23
20	DK Expiro	136	145	151	16	21	20	187	182	183	20	23	182	20	26
21	DK Exporter	134	-	-	17	-	-	187	-	-	17	-	-	17	-
22	DK Extract	134	145	150	13	18	21	185	181	182	17	22	182	17	25
23	Dominator	135	-	-	13	-	-	185	-	-	15	-	-	15	-
24	Dynamic	134	-	-	14	-	-	185	-	-	15	-	-	15	-
25	ES Imperio	131	-	-	17	-	-	185	-	-	21	-	-	21	-
26	INV1165	134	144	150	17	20	23	187	182	183	17	23	182	17	23
27	INV1188	133	-	-	13	-	-	185	-	-	20	-	-	20	-
28	Luciano KWS	136	-	-	11	-	-	186	-	-	18	-	-	18	-
29	Prince	124	138	-	14	19	-	185	181	-	14	19	-	14	-
30	Riccardo KWS	136	-	-	12	-	-	186	-	-	17	-	-	17	-
31	Stefano KWS	140	151	155	13	17	20	185	182	182	16	19	182	16	20
32	SY Florian	132	-	-	17	-	-	186	-	-	16	-	-	16	-
33	SY Florida	129	144	150	17	19	21	186	181	182	20	23	181	20	23
34	SY Iowa	136	147	-	16	20	-	185	181	-	17	20	-	17	-
35	Tatiana	131	143	-	16	19	-	185	181	-	20	25	-	20	-
36	Tigris	134	-	-	18	-	-	187	-	-	18	-	-	18	-
37	Trezzor	132	-	-	11	-	-	185	-	-	18	-	-	18	-
	Liczba doświadczeń	4	8	12	4	8	12	2	4	6	4	8	6	4	12

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian, F₁ – odmiana mieszańcowa, p – odmiana półkarłowa, kk- odmiana o dużej odporności na kłę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce

RZEPAK OZIMY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp.	ODMIANA		ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020
1	ANNISTON	F ₁	2017	2020	108
2	ARCHITECT	F ₁	2017	2020	104
3	ARTEMIS	F ₁	2019	2021 w	108**
4	BONANZA	F ₁	2012	2016	104
5	CHOPIN	F ₁	2018	2021	110*
6	DERRICK		2018	2021	104*
7	DOMINATOR	F ₁	2019	2021 w	115**
8	DK EXPANSION	F ₁	2017	2020	105
9	DK EXTRACT	F ₁	2016	2017	107
10	ES IMPERIO	F ₁	2016	2019	109
11	HEVELIUS		2018	2020	92*
12	PRINCE	F ₁	2018	2021	105*
13	STEFANO KWS	F ₁	2017	2019	106
14	TIGRIS	F ₁	2016	2019	109
15	TREZZOR	F ₁	CCA	2021	109

KR – Krajowy Rejestr Odmian

CCA – Wspólnotowy Katalog Odmian

F₁ – odmiana mieszańcowa

w – odmiana zalecana wstępnie

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian – 39,4 dt/ha

* - dla odmian Chopin, Derrick, Hevelius, Prince wzorzec z lat 2019-2020 (39,9 dt/ha)

** - dla odmiany Artemis, Dominator wzorzec z 2020 roku (43,9 dt/ha)

*** dla odmiany ES Imperio, Hevelius, Prince, Tigris, Trezzor – dane z trzech lokalizacji (Głubczyce, Bąków, Pągów)

9. RZEPAK JARY

Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2020 roku badano 18 odmian (9 populacyjnych i 9 mieszańcowych).

W latach 2017-2019 doświadczenia były prawidłowe, a w 2020 roku zostało zdyskwalifikowane statystycznie. Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczenia w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze przedstawiono w tabelach poniżej.

W latach 2017-2019 w Głubczycach najwyższy średni plon nasion 29,6 dt/ha uzyskano w 2019 roku. Do wyżej plonujących odmian należały odmiany Lumen, Karo i Ara oraz Lancia. W Polsce, w latach 2018-2020 wyróżniały się odmiany mieszańcowe Lumen, Lavina, Lakritz i Brander.

Przy średniej wysokości roślin 139 cm niższą była Lagonda, a bardziej odpornymi na wyleganie Turner i Lagonda. Dojrzałość techniczna odmian była zbliżona, a obsada roślin wahała się od 63 szt/m² (Bruno) do 75 szt/m² (Lancia). Obsada roślin była wyraźnie najwyższa w ostatnim roku. Masa tysiąca nasion wahała się od 3,9 g (Lumen) do 4,6 g (Lancia). Przy średnim porażeniu roślin przez choroby łodygowe 43% do bardziej odpornych należały Lexus i Lancia. Do odporniejszych na czerń krzyżowych należały odmiany Lexus i Lumen a na mączniaka właściwego Lancia, Lagonda i Lexus.

Tab. 92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość	Głubczyce
Powiat	Głubczyce
Kompleks rolniczej przydatności gleby	1
Klasa bonitacyjna gleby	II
pH gleby w KCl	6,2
Przedplon	Kukurydza na ziarno
Data siewu (dzień, m-c, rok)	26.03
Obsada roślin (szt./m ²)	100
Data zbioru (dzień, m-c, rok)	14.08
Nawożenie mineralne	
N (kg/ha)	126
P ₂ O ₅ (kg/ha)	74
K ₂ O (kg/ha)	93
Nawożenie dolistne (l/kg/ha)	MgSO ₄ – 5 + ADOB B – 1,5 + ADOB Mo – 0,1 + ADOB Mn – 1,5 + ADOB S – 1 + Basfoliar 12-4-6+S – 5 MgSO ₄ – 5 + ADOB B – 2,5 + Basfoliar 12-4-6+S – 6
Środki ochrony roślin	
Herbicydy (l/ha)	Butisan Avant – 2 + Efektor 360 CS – 0,08 Iguana – 0,3
Insektycydy (l/kg/ha)	Los Ovados 200 SE – 0,1 + Sparviero – 0,075 Proteus 110 OD – 0,4 + Karate Zeon 050 CS – 0,12 Los Ovados 200 SE – 0,25 + Decis Mega 50 EW – 0,1 Proteus 110 OD – 0,5 Danadim 400 EC – 0,5 + Los Ovados 200 SE – 0,125

Tab. 93. Rzepak jary. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana		Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Goliat		2017	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR Strzelce
2	Gustaw		2020	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR Strzelce
3	Agra		2015	SE	Lantmännen SW Seed SIA Jelgawa
4	Bruno		2018	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR Strzelce
5	Karo		2016	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR Strzelce
6	Lennon		2013	SE	Lantmännen SW Seed SIA Jelgawa
7	Libero		2017	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR Strzelce
8	Markus		2010	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR Strzelce
9	Turner		2017	SE	Lantmännen SW Seed SIA Jelgawa
10	Lavina	F ₁	2020	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
11	Lumen	F ₁	2016	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
12	Lagonda	F ₁	2018	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
13	Laktriz	F ₁	2020	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
14	Lancia	F ₁	2018	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
15	Legolas	F ₁	2014	SE	Lantmännen SW Seed SIA Jelgawa
16	Lexus	F ₁	2017	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
17	Menthal	F ₁	2015	DE	Saaten - Union Polska sp. z o. o. Wągrowiec
18	Brander	F ₁	CCA		

F₁ – odmiana mieszańcowa

Tab. 94. Rzepak jary. Zbiórce wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głębzyce
1	Termin kwitnienia (dzień, m-c)	04.06
2	Termin dojrzałości technicznej (dzień, m-c)	26.07
3	Wysokość roślin (cm)	145
4	Wylęganie (%)	45
5	Porażenie przez choroby	
	Mączniak właściwy (skala 9 ^o)	7,5
	Choroby podstawy łodyg (%)	82
	Czerń krzyżowych (skala 9 ^o)	5,4
6	Obsada roślin (szt/m ²)	82
7	Masa 1000 nasion (g)	4,0
8	Wilgotność nasion podczas zbioru (%)	9,2
9	Plon nasion (dt/ha)	5,6

Tab. 95. Rzepak jary. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca). Głębzyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Głębzyce					Polska	
			2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha			5,6	29,6	21,4	17,6	18,9	21,1	22,0
1	Goliat		98	102	95	100	98	103	102
2	Gustaw		57	-	-	-	-	102	103
3	Agra		96	100	100	98	99	98	96
4	Bruno		66	105	103	85	91	104	104
5	Karo		61	104	106	82	90	101	101
6	Lennon		63	96	111	79	90	106	103
7	Libero		49	99	79	74	76	93	98
8	Markus		55	85	95	70	78	97	102
9	Turner		92	88	89	90	90	96	98
10	Lavina	F ₁	103	-	-	-	-	115	119
11	Lumen	F ₁	163	111	137	137	137	123	120
12	Lagonda	F ₁	138	106	109	122	118	117	115
13	Lakritz	F ₁	181	-	-	-	-	119	119
14	Lancia	F ₁	148	112	122	130	127	116	112
15	Legolas	F ₁	81	93	83	87	86	107	105
16	Lexus	F ₁	133	108	73	121	105	118	113
17	Menthal	F ₁	117	102	-	109	-	109	-
18	Brander	F ₁	101	-	-	-	-	118	118
Liczba doświadczeń			1	1	1	2	3	10	9

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian F₁ - odmiana mieszańcowa

Tab. 96. Rzepak jary. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (%)		Dojrzałość techniczna (liczba dni od początku roku)		Obsada roślin szt/m²		Mtn (g)		
		2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	
	Wzorzec	145	139	45	17	208	206	82	67	4,0	4,2	
1	Goliat	156	146	59	22	209	206	90	72	3,3	4,0	
2	Gustaw	151	-	72	-	210	-	83	-	3,7	-	
3	Agra	142	137	46	15	208	205	80	68	4,0	4,3	
4	Bruno	139	142	69	28	210	207	85	63	3,9	4,2	
5	Karo	154	144	75	26	208	206	89	73	4,0	4,3	
6	Lennon	147	142	49	17	210	207	81	69	3,8	4,2	
7	Libero	150	143	79	27	210	207	88	72	3,7	4,3	
8	Markus	153	141	71	25	208	206	79	73	3,9	4,0	
9	Turner	143	137	16	6	210	207	81	66	3,7	4,1	
10	Lavina	F ₁	135	-	14	-	208	-	85	-	4,3	-
11	Lumen	F ₁	143	137	46	16	206	204	85	67	4,0	3,9
12	Lagonda	F ₁	136	132	12	6	207	205	83	66	4,3	4,2
13	Lakritz	F ₁	141	-	31	-	207	-	85	-	4,2	-
14	Lancia	F ₁	141	135	25	10	206	204	87	75	4,9	4,6
15	Legolas	F ₁	142	135	25	11	210	207	77	65	3,9	4,5
16	Lexus	F ₁	142	135	28	11	208	206	83	67	4,5	4,4
17	Menthal	F ₁	153	-	34	-	210	-	63	-	4,4	-
18	Brander	F ₁	147	-	66	-	206	-	84	-	4,3	
Liczba doświadczeń		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian F₁ - odmiana mieszańcowa

Tab. 97. Rzepak jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Choroby podstawy łądowy %		Czerń krzyżowych (skala 9 ⁰)		Mączniak właściwy (skala 9 ⁰)	
			2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec			82	43	5,4	7,2	7,5	7,4
1	Goliat		88	41	4,5	6,7	8,7	7,3
2	Gustaw		92	-	5,0	-	8,3	-
3	Agra		99	48	5,0	6,9	7,7	7,2
4	Bruno		98	49	4,5	6,7	6,0	6,3
5	Karo		86	45	4,5	6,8	7,3	6,9
6	Lennon		90	47	5,0	7,0	7,3	7,2
7	Libero		99	51	4,5	6,8	7,3	7,1
8	Markus		96	53	6,0	7,1	6,0	6,7
9	Turner		64	44	6,0	7,3	7,3	7,2
10	Lavina	F ₁	78	-	6,0	-	7,3	-
11	Lumen	F ₁	56	37	6,0	7,6	7,0	7,3
12	Lagonda	F ₁	76	41	6,0	7,4	7,7	7,6
13	Lakritz	F ₁	84	-	6,0	-	8,3	-
14	Lancia	F ₁	44	29	6,0	7,3	8,0	7,7
15	Legolas	F ₁	84	37	6,0	7,2	7,0	6,9
16	Lexus	F ₁	56	27	6,0	7,7	7,7	7,6
17	Menthal	F ₁	82	-	5,5	-	8,7	-
18	Brander	F ₁	95	-	5,0	-	7,7	
Liczba doświadczeń			1	3	1	3	1	3

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian F₁ - odmiana mieszańcowa

10. KUKURYDZA

Doświadczenia z kukurydzą na ziarno prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki, w 3 grupach wczesności odmian (wczesne, średniowczesne i średniopóźne). W latach 2018-2020 wszystkie doświadczenia były wykonane prawidłowo. We wszystkich grupach badano odmiany z Krajowego Rejestru Odmian i z Katalogu UE. Dominowały mieszańce dwuliniowe. FAO dla odmian wczesnych wynosiło 200-230, średniowczesnych 230-250, średniopóźnych 260-330.

W tabelach poniżej przedstawiono warunki agrotechniczne doświadczenia, pochodzenie i typ odmian oraz zbiorcze wyniki plonowania i ważniejszych właściwości rolniczych.

Plon odmian wczesnych w 3-leciu wynosił średnio 127,5 dt/ha, a wilgotność ziarna w czasie zbioru 28,7%. Najwyżej plonowały odmiany KWS Salamandra i RGT Chromixx oraz SY Calo, RGT Bernaxx i Anovi CS. Najniższą wilgotnością ziarna cechowały się odmiany ES Yakari, MAS 15 P, MAS 11 K oraz Selista i Anovi CS. W Polsce w ostatnim roku najwyżej plonującymi były odmiany KWS Salamandra, RGT Bernaxx i Amaroc, a najniższą wilgotność ziarna miały Anovi CS, MAS 15 P i Selista.

Plon odmian średniowczesnych w latach 2018-2020 wynosił średnio 135,4 dt/ha, a wilgotność ziarna w czasie zbioru 26,8%. Najwyżej plonowały Kidemos, Plantus oraz LG 31272. Niższą wilgotnością ziarna odznaczały się odmiany ES Perspective i Kidemos oraz Kwarrado.

W Polsce w 2020 roku wyżej plonowały Plantus, Grigri CS, ES Inventive i ESZ 5304, a niższą od średniej wilgotność miało 11 odmian.

Plon odmian średniopóźnych w 3-leciu wynosił średnio 133,1 dt/ha, a wilgotność ziarna w czasie zbioru 27,9%. Wyróżniały się odmiany ES Faraday i Hardware oraz ES Hattrick i Glumanda, która też miała najniższą wilgotność ziarna w ostatnim roku. W Polsce wyżej plonowały odmiany ES Hattrick i Farmurphy.

Przy średniej wysokości roślin odmian wczesnych w 3-leciu 259 cm niższą była KWS Salamandra, przy średnim wyleganiu korzeniowym 4,7% wyraźnie bardziej podatną była MAS 15 P. Fuzarioza łodyg w większym nasileniu w ostatnim roku wystąpiła na odmianach Ligato, Amaroc, Anovi CS i KWS Salamandra, a fuzarioza kolb na Anovi CS, Farmplus i RGT Multiplexx.

Porażenie roślin przez omacnicę prosowiankę było znaczne, zwłaszcza w ostatnim roku. Stwierdzono dość duże zróżnicowanie w porażeniu odmian. Do bardziej odpornych należały KWS Salamandra i RGT Bernaxx, a do bardziej podatnych Pumori i Anovi CS.

Przy średniej wysokości roślin odmian średniowczesnych 275 cm niższą była Plantus, a przy średnim wyleganiu korzeniowym 6,0% bardziej podatną była ES Inventive. Fuzarioza łodyg silniej porażała odmiany Plantus, Casandro i Farnezzo, a fuzarioza kolb Plantus, ES Joker i Farmagic. Porażenie roślin przez omacnicę prosowiankę było większe w ostatnim roku, z dość dużym zróżnicowaniem odmian. Do bardziej odpornych należały Grigri CS, RGT Maxxatac, ES Inventive, Farnezzo, P8329 i SY Marimba, a do bardziej podatnych KWS Iconico, Brigado, Henley, Kidemos i LG 31272.

Średnia wysokość roślin w grupie odmian średniopóźnych wynosiła 276 cm. Bardziej podatną na wyleganie korzeniowe była ES Faraday, a u odmian ES Hattrick i Glumanda go nie notowano. Fuzarioza łodyg w większym nasileniu wystąpiła u odmian ES Faraday, Hardware, Sibelio i Karpatis, a fuzarioza kolb u ES Brigday i Farmurphy. Przy średnim porażeniu roślin w ostatnim roku 9,1% przez omacnicę prosowiankę bardziej odpornymi były KWS Smaragd i ES Faraday, a do bardziej podatnych należały Hardware, Farmurphy i Glumanda.

Tab. 98. Kukurydza pastewna na ziarno. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głębczyce
Powiat		Głębczyce
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1
Klasa bonitacyjna gleby		II
pH gleby w KCl		6,5
Przedplon		Rzepak ozimy
Data siewu	(dzień,m-c)	21.04
Data zbioru	(dzień, m-c)	wczesne – 21.10
		średniowczesne – 22.10
		średniopóźne – 28.10
Nawożenie mineralne		
N	(kg/ha)	147
P ₂ O ₅	(kg/ha)	69
K ₂ O	(kg/ha)	117
Nawożenie dolistne	(kg,l/ha)	MgSO ₄ - 5 +ADOB Zn – 2 + Basfoliar 6-12-6 – 5 +ADOB Br – 1 MgSO ₄ - 5 +ADOB Zn – 1 + Basfoliar 6-12-6 – 5
Środki ochrony roślin		
Zaprawa nasienna	(nazwa)	Nasiona zaprawiane przez hodowle
Herbicydy	(l,g/ha)	Wing P 462,5 EC – 2 + Lumax 537,5 SE – 2 Ikanos 040 OD – 1
Insektycydy	(l,g/ha)	Proteus 110 OD – 0,5 Los Ovados 200 SE – 0,25 + Ostrinia Stop – 0,083



Tab. 99. Kukurydza pastewna na ziarno. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian	Typ	Wczesność FAO	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce
Odmiany wczesne					
1	Amavit	2019	SC	230	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
2	ES Yakari	2019	SC	220	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
3	Florino	2020	TC	230	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
4	KWS Salamandra	2018	SC	230	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
5	Ligato	2018	SC	230	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
6	MAS 11K	2018	SC	210	Maisadour Polska sp. z o.o. Poznań
7	MAS 15P	2012	SC	200-210	Maisadour Polska sp. z o.o. Poznań
8	Pumori	2020	SC	220	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
9	RGT Alyxx	2020	SC	230	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
10	RGT Bernaxx	2020	SC	230	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
11	RGT Chromixx	2017	SC	230	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
12	RGT Halifaxx	2020	SC	230	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
13	RGT Irenoxx	2019	SC	230	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
14	Selista	2020	SC	210	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
15	SM Polonia	2020	TC	200	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
16	SM Vistula	2020	TC	210	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
17	Amaroc	CCA	TC	230	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
18	Anovi CS	CCA	SC	230	Caussade Nasiona Polska sp. z o.o. Strzelin
19	Farmplus	CCA	SC	220	FarmSaat AG, Nowy Kawęczyn
20	RGT Multiplexx	CCA	SC	230	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
21	SY Calo	CCA	SC	220-230	Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa
Odmiany średniowczesne					
1	Brigado	2018	SC	250	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
2	Casandro	2017	TC	240-250	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
3	Grigri CS	2020	SC	250	Caussade Nasiona Polska sp. z o.o. Strzelin
4	ES Inventive	2018	SC	240	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
5	ES Joker	2019	SC	240	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
6	ES Perspective	2018	SC	240	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
7	ES Runway	2020	SC	240	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
8	Farmezzo	2016	SC	250	Tomasz Krakowiak, Nowy Kawęczyn
9	Henley	2019	SC	240	Limagrain Central Europe Societe, Poznań
10	Kidemos	2018	SC	250	Limagrain Central Europe Societe, Poznań
11	Kwarrado	2020	SC	240	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
12	KWS Iconico	2020	SC	240	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
13	LG31272	2020	SC	240	Limagrain Central Europe Societe, Poznań
14	Magento	2020	SC	240	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
15	P8329	2017	SC	250	Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Poznań
16	Plantus	2018	SC	250	Tomasz Krakowiak, Nowy Kawęczyn
17	SY Glorius	2019	SC	240	Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa
18	ESZ5304	CCA	SC	250	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
19	Farmagic	CCA	SC	240	FarmSaat AG, Nowy Kawęczyn
20	Farmfire	CCA	SC	230	FarmSaat AG, Nowy Kawęczyn
21	RGT Maxxatac	CCA	SC	250	RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice
22	SY Marimba	CCA	SC	250	Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa
Odmiany średniopóźne					
1	ES Bigday	2020	SC	260	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
2	ES Faraday	2018	SC	260	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
3	ES Hattrick	2020	SC	260	Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań
4	Farmurphy	2020	SC	260	FarmSaat AG, Nowy Kawęczyn
5	Hardware	2019	SC	260	IGP Polska sp. z o.o., Poznań
6	Sibelio	2020	SC	260	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
7	Glumanda	CCA	SC	310	Monsanto polska sp. z o.o. Warszawa
8	Karpatis	CCA	SC	330	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
9	KWS Smaragd	CCA	SC	290	KWS Polska sp. z o.o. Poznań

CCA- odmiany z katalogu UE SC-odmiana mieszańcowa dwuliniowa, TC- odmian mieszańcowa trójliniowa

Tab. 100. Kukurydza pastewna na ziarno. Zbiornicze wyniki doświadczenia. Głubczyce. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głubczyce		
		Wczesne	Średniowczesne	Średniopóźne i późne
1	Data pojawienia się znamion (data)	26.07	27.07	29.07
2	Dojrzałość pełna (data)	06.10	10.10	24.10
3	Wysokość roślin (cm)	299	312	308
4	Wyleganie łodygowe (%)	3,2	3,1	2,3
	Wyleganie korzeniowe (%)	1,5	1,8	0,9
5	Krzewienie (liczba łodyg na roślinie)	1,5	1,5	1,0
6	Zawartość sm w ziarnie (%)	65,4	64,8	61,0
7	Udział ziarna w kolbach (%)	77,7	77,1	82,8
8	Utrzymanie zieleni (stay green)			
	przed zbiorem (skala 9°)	1,3	1,5	3,1
9	Porażenie przez choroby			
	Głownia kolb (%)	0,1	0,0	0,0
	Fuzarioza łodyg (%)	7,5	5,1	6,1
	Fuzarioza kolb (%)	4,8	3,2	2,7
10	Omacnica proso-wianka (%)	15,0	12,0	14,1
11	Wilgotność ziarna przy zbiorze (%)	34,6	35,2	39,0
12	Plon ziarna (dt/ha)	132,9	140,9	129,9

Tab. 101. Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności, wilgotność w czasie zbioru (% wzorca). Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. Odmiany wczesne.

Lp.	Odmiana	Głubczyce										Polska	
		2020		2019		2018		2019-2020		2018-2020		2020	
		Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność
	Wzorzec dt/ha, %	132,9	34,6	121,6	29,8	128,1	21,6	127,3	32,2	127,5	28,7	115,6	29,7
1	Amavit	103	99	114	100	-	-	109	100	-	-	103	98
2	ES Yakari	102	86	107	91	-	-	105	89	-	-	103	95
3	Florino	101	109	-	-	-	-	-	-	-	-	102	105
4	KWS Salamandra	108	98	112	103	110	104	110	101	110	102	109	102
5	Ligato	90	109	106	104	-	-	98	107	-	-	91	104
6	MAS 11K	94	102	104	104	97	92	99	103	98	99	102	99
7	MAS 15P	86	87	92	92	91	94	89	90	90	91	89	93
8	Pumori	103	98	-	-	-	-	-	-	-	-	103	98
9	RGT Alyxx	99	112	-	-	-	-	-	-	-	-	100	106
10	RGT Bernaxx	107	102	-	-	-	-	-	-	-	-	106	104
11	RGT Chromixx	104	104	101	101	106	96	103	103	104	100	100	103
12	RGT Halifaxx	97	105	-	-	-	-	-	-	-	-	100	101
13	RGT Irenoxx	97	105	106	100	-	-	102	103	-	-	100	106
14	Selista	98	90	-	-	-	-	-	-	-	-	101	93
15	SM Polonia	101	100	-	-	-	-	-	-	-	-	97	100
16	SM Vistula	95	97	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99
17	Amaroc CCA	101	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	102
18	Anovi CS CCA	107	90	-	-	-	-	-	-	-	-	96	92
19	Farmplus CCA	100	101	93	102	99	101	97	102	97	101	97	98
20	RGT Multiplexx CCA	97	108	102	102	-	-	100	105	-	-	-	-
21	SY Calo CCA	111	94	-	-	-	-	-	-	-	-	100	98
Liczba doświadczeń		1		1		1		2		3		21	

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiana z katalogu UE

**Tab. 102. Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności, wilgotność w czasie zbioru (% wzorca).
Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. Odmiany średniowczesne.**

Lp.	Odmiana	Głubczyce										Polska	
		2020		2019		2018		2019-2020		2018-2020		2020	
		Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność
	Wzorzec dt/ha, %	139,6	35,2	138,6	23,7	128,1	21,6	139,1	29,5	135,4	26,8	121,4	30,0
1	Brigado	103	95	97	103	-	-	100	99	-	-	94	102
2	Casandro	95	100	106	94	111	101	101	97	104	98	97	99
3	Grigri CS	105	98	-	-	-	-	-	-	-	-	103	102
4	ES Inventive	98	98	107	87	104	98	103	93	103	94	103	99
5	ES Joker	103	95	-	-	-	-	-	-	-	-	97	96
6	ES	103	91	101	86	103	89	102	89	102	89	101	95
7	ES Runway	90	101	-	-	-	-	-	-	-	-	101	97
8	Farmezzo	100	97	100	108	100	108	100	103	100	104	97	98
9	Henley	99	95	98	107	-	-	99	101	99	101	98	97
10	Kidemos	105	98	108	86	-	-	107	92	107	92	99	104
11	Kwarrado	105	93	-	-	-	-	-	-	-	-	99	103
12	KWS Iconico	93	106	-	-	-	-	-	-	-	-	100	98
13	LG31272	111	98	-	-	-	-	-	-	-	-	101	102
14	Magento	98	102	-	-	-	-	-	-	-	-	101	102
15	P8329	96	103	108	91	105	89	102	97	103	94	101	99
16	Plantus	104	106	108	110	105	112	106	108	106	109	104	101
17	SY Glorius	95	110	100	113	-	-	98	112	-	-	99	99
18	ESZ5304	CCA	99	105	-	-	-	-	-	-	-	103	105
19	Farmagic	CCA	102	104	-	-	97	102	-	-	-	99	98
20	Farmfire	CCA	102	105	-	-	105	113	-	-	-	102	101
21	RGT	CCA	93	102	-	-	-	-	-	-	-	99	103
22	SY Marimba	CCA	98	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń		1		1		1		2		3		19	

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiana z katalogu UE

**Tab. 103. Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności, wilgotność w czasie zbioru (% wzorca).
Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. Odmiany średniopóźne.**

Lp.	Odmiana	Głubczyce										Polska	
		2020		2019		2018		2019-2020		2018-2020		2020	
		Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność	Plon ziarna	Wilgotność
	Wzorzec dt/ha, %	129,3	39,7	138,3	25,4	131,6	18,5	133,8	32,6	133,1	27,9	127,8	32,1
1	ES Bigday	94	102	-	-	-	-	-	-	-	-	97	99
2	ES Faraday	103	102	101	100	110	96	102	101	105	99	102	101
3	ES Hatrick	115	96	-	-	-	-	-	-	-	-	106	98
4	Farmurphy	100	106	-	-	-	-	-	-	-	-	104	100
5	Hardware	105	106	103	101	-	-	104	104	-	-	100	98
6	Sibelio	82	96	-	-	-	-	-	-	-	-	93	96
7	Glumanda	CCA	106	89	-	-	-	-	-	-	-	99	97
8	Karpatis	CCA	94	105	-	-	-	-	-	-	-	98	106
9	KWS Smaragd	CCA	101	98	-	-	-	-	-	-	-	101	106
Liczba doświadczeń		1		1		1		2		3		17	

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiana z katalogu UE

Tab. 104. Kukurydza pastewna na ziarno. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru: 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiany	Wysokość roślin (cm)		Wyleganie korzeniowe (%)		Fuzarioza łodyg (%)		Fuzarioza kolb (%)		Omacnica prosowianka (%)		
		2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	
Odmiany wczesne												
	Wzorzec	299	259	1,5	4,7	7,5	3,9	4,8	1,3	10,0	5,3	
1	Amavit	295	-	2,0	-	7,9	-	5,5	-	6,7	-	
2	ES Yakari	300	-	2,0	-	5,1	-	4,8	-	15,0	-	
3	Florino	303	-	1,5	-	8,8	-	5,2	-	8,4	-	
4	KWS Salamandra	264	247	1,7	1,5	10,1	4,3	5,7	2,0	3,4	1,1	
5	Ligato	307	-	1,5	-	16,1	-	4,8	-	6,7	-	
6	MAS 11K	301	266	2,7	4,1	7,5	5,2	4,5	1,8	8,4	7,8	
7	MAS 15P	297	261	1,5	10,1	4,2	3,4	1,5	0,9	13,4	7,8	
8	Pumori	297	-	1,2	-	3,8	-	5,3	-	23,4	-	
9	RGT Alyxx	298	-	0,0	-	3,8	-	4,6	-	8,4	-	
10	RGT Bernaxx	313	-	0,2	-	4,4	-	3,4	-	5,0	-	
11	RGT Chromixx	311	261	1,5	3,1	7,2	2,6	1,4	0,5	8,4	4,5	
12	RGT Halifaxx	295	-	0,7	-	7,8	-	2,8	-	13,4	-	
13	RGT Irenoxx	292	-	0,7	-	6,9	-	5,3	-	8,4	-	
14	Selista	315	-	2,5	-	5,5	-	0,8	-	11,7	-	
15	SM Polonia	303	-	1,7	-	6,1	-	5,1	-	6,7	-	
16	SM Vistula	295	-	1,0	-	8,3	-	5,0	-	15,0	-	
17	Amaroc	CCA	321	-	1,0	-	14,7	-	1,9	-	11,7	-
18	Anovi CS	CCA	277	-	3,2	-	13,4	-	10,1	-	18,4	-
19	Farmplus	CCA	293	-	1,5	-	5,1	-	8,2	-	6,7	-
20	RGT Multiplexx	CCA	315	-	0,5	-	5,6	-	8,0	-	6,7	-
21	SY Calo	CCA	291	-	2,0	-	6,0	-	6,7	-	5	-
Liczba doświadczeń		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Odmiany średnio wczesne												
	Wzorzec	312	275	3,7	6,0	5,2	9,4	2,7	1,3	7,6	2,1	
1	Brigado	325	-	4,9	-	4,7	-	2,6	-	11,7	-	
2	Casandro	309	277	3,4	5,4	6,0	14,7	4,3	1,5	6,7	2,2	
3	Grigri CS	302	-	3,2	-	7,2	-	3,3	-	0,0	-	
4	ES Inventive	310	283	4,9	8,6	1,5	5,2	3,5	1,4	3,4	1,1	
5	ES Joker	327	-	3,2	-	2,3	-	5,9	-	8,4	-	
6	ES Perspective	318	291	4,4	4,3	4,3	4,4	2,1	0,7	8,4	2,8	
7	ES Runway	306	-	4,9	-	4,6	-	1,8	-	10,0	-	
8	Farmezzo	315	272	3,9	7,1	8,1	14,3	2,5	0,8	3,4	2,0	
9	Henley	310	-	3,7	-	7,4	-	3,3	-	11,7	-	
10	Kidemos	316	-	3,2	-	5,8	-	2,1	-	11,7	-	
11	Kwarrado	307	-	3,2	-	4,4	-	0,5	-	6,7	-	
12	KWS Iconico	313	-	2,9	-	1,5	-	1,6	-	15,0	-	
13	LG31272	318	-	3,2	-	5,7	-	1,5	-	11,7	-	
14	Magento	310	-	3,7	-	7,7	-	1,4	-	6,7	-	
15	P8329	306	267	5,6	4,2	3,8	2,6	3,5	1,3	3,4	1,1	
16	Plantus	307	260	2,7	6,5	3,8	15,5	4,9	1,8	10,0	3,3	
17	SY Glorius	319	-	1,0	-	5,0	-	3,8	-	10,0	-	
18	ESZ5304	CCA	312	-	3,7	-	4,4	-	1,0	-	10,0	-
19	Farmagic	CCA	310	-	6,6	-	4,8	-	4,8	-	10,0	-
20	Farmfire	CCA	312	-	3,4	-	2,2	-	0,5	-	5,0	-
21	RGT Maxxatac	CCA	305	-	2,5	-	5,8	-	3,7	-	0,0	-
22	SY Marimba	CCA	307	-	3,9	-	12,4	-	1,3	-	3,4	-
Liczba doświadczeń		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Odmiany średniopóźne												
	Wzorzec	311	276	1,1	5,7	3,9	5,0	2,8	1,3	9,1	1,1	
1	ES Bigday	314	-	2,0	-	2,9	-	4,3	-	5,0	-	
2	ES Faraday	316	276	2,2	5,7	2,1	5,0	3,8	1,3	3,3	1,1	
3	ES Hattrick	307	-	0,0	-	2,3	-	2,9	-	6,7	-	
4	Farmurphy	303	-	1,7	-	4,0	-	4,3	-	15,0	-	
5	Hardware	311	-	1,5	-	6,2	-	2,5	-	16,7	-	
6	Sibelio	317	-	1,0	-	5,3	-	1,5	-	10,0	-	
7	Glumanda	CCA	296	-	0,0	-	4,8	-	1,4	-	13,3	-
8	Karpatis	CCA	316	-	0,7	-	5,2	-	2,3	-	10,0	-
9	KWS Smaragd	CCA	318	-	1,0	-	2,1	-	2,6	-	1,7	-
Liczba doświadczeń		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	

Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian w grupach wczesności CCA- odmiany z katalogu UE

11. BURAK CUKROWY

Doświadczenia z burakiem cukrowym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2020 roku badano 18 odmian. Dla wszystkich odmian hodowcy zadeklarowali odporność na rizomanię (Rh), a dla odmian Everest, BTS 1125 N, Wojownik, FD Junon, Eliska KWS, BTS 2205 N, Fronta, Hubertus i Traper również na nicienie (N).

Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczenia w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania i ważniejsze właściwości rolnicze przedstawiono w tabelach poniżej.

Średni plon korzeni w latach 2019-2020 w Głubczycach był wysoki i wynosił 1066 dt/ha. Do wyróżniających się odmian należały Klara, FD Raid i Traper. Wyższą zawartością cukru cechowały się Eliska KWS, Jagienka i Hubertus a wyższym plonem technologicznym cukru FD Raid, Eliska KWS, Traper i Klara. Polową energią wschodów wyróżniały się FD Raid, Hubertus i Wojownik. Polowa zdolność wschodów wynosiła średnio 76,7%. Wyższą odznaczały się odmiany FD Raid i Traper. PEW i PZW w ostatnim roku były wyraźnie wyższe niż w poprzednim. Porażenie roślin chwościkiem buraka było dość duże. Bardziej podatnymi były odmiany Everest i BTS 2205 N a bardziej odpornymi Wojownik i FD Mycone.

W Polsce w 2020 roku średni plon korzeni wyniósł 909 dt/ha, od 859 dt/ha (Mazovia) do 948 dt/ha (Eliska KWS). Przy średniej zawartości cukru w korzeniach 16,0% wyższą odznaczały się Rosselina KWS, Mazovia, Eliska KWS, FD Junon i Traper. Przy średnim plonie technologicznym cukru 129,4 dt/ha wyróżniały się odmiany Eliska KWS, BTS 1125 N i FD Junon. Do bardziej podatnych na chwościka burakowego należały BTS 2205 N, Jagienka i Hubertus. Przez mączniaka właściwego odmiany były porażone w podobnym stopniu.

Tab. 105. Burak cukrowy. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głubczyce
Powiat		Głubczyce
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1
Klasa bonitacyjna gleby		II
pH gleby w KCl		6,8
Przedplon		Pszenica ozima
Data siewu	(dzień, m-c)	04.04
Data zbioru	(dzień, m-c)	24.10
Nawożenie mineralne		
N	(kg/ha)	90
P ₂ O ₅	(kg/ha)	46
K ₂ O	(kg/ha)	126
MgSO ₄ – 5 + ADOB Mo – 0,05 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Na – 1,5 + ADOB Mn – 1 + ADOB Cu – 1 + ADOB B – 2,5 + Basfoliar 12-4-6+S – 5		
Nawożenie dolistne	(l,kg/ha)	MgSO ₄ – 5 + ADOB Zn – 0,3 + ADOB Mn – 1 + ADOB Cu – 0,5 + Basfoliar 12-4-6+S – 5 ADOB Cu – 1 ADOB Cu – 1
Środki ochrony roślin		
Zaprawa nasienna	(nazwa)	Nasiona zaprawiane przez hodowców
Herbicydy	(g,l/ha)	Goltix 700 SC – 1,7 + Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 0,5 + Kemiron Koncentrat 500 SC – 0,2
		Goltix 700 SC – 1,2 + Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 0,7 + Kemiron Koncentrat 500 SC – 0,2
		Venzar 80 WP – 125 + Tanaris – 0,3
		Jupiter 700 SC – 1,2 + Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 0,8 + Kemiron Koncentrat 500 SC – 0,2 + Venzar 50 WP – 125 + Tanaris – 0,15
Insektycydy	(l,g/ha)	Jupiter 700 SC – 1,2 + Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 0,5 + Kemiron Koncentrat 500 SC – 0,3 + Safari 50 WG – 10
		Sparviero – 0,075
		Karate Zeon 050 CS – 0,15
		Karate Zeon 050 CS – 0,15
Fungicydy	(l/ha)	Insodex 480 EC – 0,29 + Decis Mega 50 EW – 0,1
		Decis Mega 50 EW – 0,1 + Proteus 110 OD – 0,4
		Proteus 110 OD – 0,4
		Los Ovados 200 SE – 0,2
Fungicydy	(l/ha)	Optan 183 SE – 1
		Duett Star 334 SE – 1 + Dafne 250 ED – 0,5
		Duett Star 334 SE – 0,5 + Amistar Gold – 1

Tab. 106. Burak cukrowy. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Tolerancja na patogeny	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Everest	Rh, N	2019	DK	MariboHillesløg ApS,
2	FD Raid	Rh	2019	FR	SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
3	BTS 1125 N	Rh, N	2019	DE	Betaseed GmbH, Frankfurt am Main
4	Klara	Rh	2019	PL	WHBC sp. z o.o. Poznań
5	Wojownik	Rh, N	2019	BE	SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o. Poznań
6	Rosselina KWS	Rh	2020	DE	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
7	FD Junon	Rh, N	2020	FR	SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
8	Mezovia	Rh	2020	PL	KHBC sp. z o.o., Straszów
9	Winetou	Rh	2020	BE	SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o. Poznań
10	Eliska KWS	Rh, N	2018	DE	KWS Polska sp. z o.o. Poznań
11	BTS 2205 N	Rh, N	2020	DE	Betaseed GmbH, Frankfurt am Main
12	FD Mycone	Rh	2020	FR	SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
13	Golf	Rh	2020	BE	SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o. Poznań
14	Mariza	Rh	2020	DK	MariboHillesløg ApS,
15	Fronta	Rh, N	2019	DK	DLF Seeds sp. z o.o., Ława
16	Jagienka	Rh	2018	PL	KHBC sp. s o.o. Straszów
17	Hubertus	Rh, N	2019	DE	Strube Polska sp. z o.o. Wrocław
18	Traper	Rh, N	2018	BE	SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o. Poznań

Rh, N – deklarowana przez hodowcę odporność lub tolerancja na rizomanię i nicienie.

Tab. 107. Burak cukrowy. Zbiórce wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głęboczyce
1	Polowa energia wschodów (PEW) (%)	60,6
2	Polowa zdolność wschodów (PZW) (%)	80,9
3	Ocena ulistnienia (skala 9 ⁰)	9,0
4	Ocena stanu przed zbiorem (skala 9 ⁰)	7,0
5	Udział korzeni drobnych (%)	0,9
6	Plon technologiczny cukru dt/ha	156,8
7	Zawartość cukru (%)	16,1
8	Plon korzeni (dt/ha)	1104

Tab. 108. Burak cukrowy - Głubczyce. Plon korzeni (dt/ha, %wzorca), zawartość cukru (%), plon technologiczny cukru (dt/ha).
Lata zbioru 2020, 2019-2020.

Lp.	Odmiana	Plon korzeni (dt/ha)			% wzorca			Zawartość cukru (%)			Plon technologiczny cukru (dt/ha)		
		2020	2019	2019-2020	2020	2019	2019-2020	2020	2019	2019-2020	2020	2019	2019-2020
	Wzorzec	1104	1028	1066	1104	1028	1066	16,1	14,4	15,3	156,8	122,5	139,7
1	Everest	1164	-	-	105	-	-	15,9	-	-	160,7	-	-
2	FD Raid	1090	1106	1098	99	108	104	16,4	14,4	15,4	161,3	132,6	147,0
3	BTS 1125 N	1168	991	1080	106	96	101	16,3	14,2	15,3	165,9	115,6	140,8
4	Klara	1146	1102	1124	104	107	106	16,1	13,8	15,0	162,1	122,1	142,1
5	Wojownik	1114	970	1042	101	94	98	15,3	14,6	15,0	150,4	117,6	134,0
6	Rosselina KWS	1089	-	-	99	-	-	16,7	-	-	162,1	-	-
7	FD Junon	1090	-	-	99	-	-	16,3	-	-	157,5	-	-
8	Mazovia	1079	-	-	98	-	-	15,7	-	-	148,6	-	-
9	Winetou	1075	-	-	97	-	-	16,0	-	-	153,3	-	-
10	Eliska KWS	1122	1039	1081	102	101	102	16,7	14,8	15,8	166	130	148,0
11	BTS 2205 N	1129	-	-	102	-	-	15,8	-	-	160,7	-	-
12	FD Mycone	1043	-	-	94	-	-	15,7	-	-	144,7	-	-
13	Golf	1086	-	-	98	-	-	16,2	-	-	155,7	-	-
14	Mariza	1102	-	-	100	-	-	16,2	-	-	157,3	-	-
15	Fronta	1007	977	992	91	95	93	15,7	14,4	15,1	136,5	116,4	126,5
16	Jagienka	1076	978	1027	98	95	97	16,3	14,7	15,5	153,7	121,4	137,6
17	Hubertus	1196	891	1044	108	87	98	16,4	14,5	15,5	173,4	106,8	140,1
18	Traper	1087	1106	1097	98	108	103	16,0	14,5	15,3	153,2	132,5	142,9
	Liczba doświadczeń	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 109. Burak cukrowy. Głubczyce. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian, porażenie przez choroby.
Lata zbioru 2020, 2019-2020.

Lp.	Odmiana	Połowa Energia Wschodów (%) *			Połowa Zdolność Wschodów (%) **			Choroby 2020		
		2020	2019	2019-2020	2020	2019	2019-2020	Chwóścik buraka skala 9 ^o	Żółtaczka wirusowa %	Brunatna plamistość liści skala 9 ^o
	Wzorzec	60,6	45,9	53,3	80,9	72,4	76,7	6,5	0,1	8,8
1	Everest	51,7	-	-	77,4	-	-	5,3	0,0	8,3
2	FD Raid	80,0	52,0	66,0	84,7	76,9	80,8	6,5	0,0	8,8
3	BTS 1125 N	65,0	39,8	52,4	77,0	60,3	68,7	6,5	0,0	8,8
4	Klara	57,0	46,2	51,6	77,7	69,9	73,8	6,3	0,0	9,0
5	Wojownik	70,3	50,6	60,5	81,7	77,6	79,7	8,0	0,0	8,8
6	Rosselina KWS	48,7	-	-	70,7	-	-	6,5	0,0	9,0
7	FD Junon	69,4	-	-	83,3	-	-	6,8	0,0	9,0
8	Mazovia	32,0	-	-	82,0	-	-	5,8	1,3	8,8
9	Winetou	76,7	-	-	82,0	-	-	7,0	1,3	8,8
10	Eliska KWS	66,3	48,1	57,2	78,3	71,8	75,1	6,8	0,0	8,5
11	BTS 2205 N	42,0	-	-	76,0	-	-	5,3	0,0	8,5
12	FD Mycone	66,0	-	-	80,7	-	-	8,0	0,0	8,8
13	Golf	72,3	-	-	82,0	-	-	6,5	0,0	8,8
14	Mariza	70,7	-	-	86,0	-	-	6,8	0,0	9,0
15	Fronta	43,7	41,1	42,4	86,7	68,0	77,4	6,8	0,0	8,8
16	Jagienka	40,3	29,5	34,9	81,7	69,3	75,5	6,0	0,0	8,5
17	Hubertus	77,0	46,8	61,9	85,3	71,8	78,6	6,0	0,0	8,8
18	Traper	62,0	30,1	46,1	84,0	76,3	80,2	6,8	0,0	9,0
	Liczba doświadczeń	1	1	2	1	1	2	1	1	1

*- po 4 dniach od wschodów **- po 18 dniach od wschodów

Tab. 110. Burak cukrowy. Polska. Plon korzeni (dt/ha), zawartość cukru(%), plon technologiczny cukru (dt/ha), porażenie przez choroby. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Plon korzeni		Zawartość cukru %	Plon technologiczny cukru		Chwościk buraka skala 9 ⁰	Mączniak właściwy skala 9 ⁰
		dt/ha	% wzorca		dt/ha	% worca		
	Wzorzec	909		16,0	129,4		6,0	7,3
1	Everest	933	103	15,4	126,3	98	6,0	7,2
2	FD Raid	888	98	15,8	126,2	98	6,0	7,2
3	BTS 1125 N	943	104	16,2	136,2	105	5,7	7,2
4	Klara	911	100	15,9	128,5	99	5,7	7,0
5	Wojownik	938	103	15,8	131,5	102	6,7	7,5
6	Rosselina KWS	885	97	16,4	132,5	102	5,7	7,2
7	FD Junon	931	102	16,3	134,1	104	6,0	7,5
8	Mazovia	859	94	16,4	125,6	97	6,4	7,2
9	Winetou	903	99	15,6	125,4	97	6,6	7,5
10	Eliska KWS	948	104	16,4	139,2	108	5,8	7,2
11	BTS 2205 N	919	101	15,6	128,8	100	5,3	7,5
12	FD Mycone	872	96	15,9	124,5	96	6,5	7,5
13	Golf	926	102	15,9	130,9	101	5,9	7,5
14	Mariza	901	99	16,1	129,0	100	5,7	7,5
15	Fronta	904	99	15,7	124,2	96	6,5	7,5
16	Jagienka	885	97	16,0	127,1	98	5,4	7,2
17	Hubertus	909	100	16,0	129,5	100	5,5	7,2
18	Traper	901	99	16,3	130,1	101	5,8	7,5

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian



12. ZIEMNIAK

Doświadczenia z ziemniakiem bardzo wczesnym, wczesnym, średniowczesnym i średniopóźnym w ramach makroregionu południowo – zachodniego, obejmującego województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie i łódzkie prowadzono w Łuźmierzu, Masłowicach i Sulejowie (woj. łódzkie), Tarnowie, Zybiszowie (woj. dolnośląskie), Pawłowicach (woj. śląskie) oraz Starym Oleśnie (woj. opolskie) na jednym poziomie agrotechniki.

Warunki agrotechniczne i meteorologiczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian oraz wyniki plonowania przedstawiono w tabelach poniżej.

Średnia temperatura w okresie wegetacji w makroregionie wynosiła 15,1°C (od 12,9o w Tarnowie do 17,3°C w Starym Oleśnie), a suma opadów 462 mm (od 321 mm w Masłowicach do 519 mm w Łuźmierzu).

W grupie odmian bardzo wczesnych średnio w 3-leciu plon ogólny wczesny wynosił 278,2 dt/ha, a handlowy 258,2 dt/ha. Wyróżniały się odmiany Impala i Riviera. Plon ogólny po zakończeniu wegetacji wynosił 471,8 dt/ha, a handlowy 432,1 dt/ha. W tym terminie zbioru najwyżej plonowały Impresja i Denar. Najwyższy plon ogólny i handlowy, w 2020 roku przy wczesnym terminie zbioru notowano w Zybiszowie i Sulejowie, a po zakończeniu wegetacji w Tarnowie i Zybiszowie.

W grupie odmian wczesnych średni plon ogólny wynosił 485,1 dt/ha, a handlowy 451,7 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany Michalina, Ignacy i Bohun. Najwyższy plon ogólny i handlowy w 2020 roku notowano w Tarnowie i Sulejowie.

W grupie odmian średniowczesnych i średniopóźnych średni plon ogólny wynosił 469,9 dt/ha, a handlowy 427,6 dt/ha. Wyróżniającymi się odmianami były średniowczesne Jurek i Tajfun oraz średniopóźna Jelly. Najwyższy plon ogólny i handlowy w 2020 roku uzyskano w Tarnowie i Sulejowie.

Przy średniej zawartości skrobi w 3-leciu dla ziemniaka bardzo wczesnego 11,8% wyższą wyróżniała się Tacja, dla ziemniaka wczesnego 13,3% największą cechowała się Magnolia i dla ziemniaka średniowczesnego 14,1% najwyższą odznaczały się odmiany Tajfun i Laskara.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

w grupie bardzo wczesnych – DENAR, IMPALA, IMPRESJA i RIVIERA, w grupie wczesnych – BELLAROSA, BOHUN, GWIAZDA, IGNACY, MICHALINA i VINETA, w grupie średniowczesnych i średniopóźnych – JUREK, TAJFUN i JELLY.



Tab. 111. Ziemiaki. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość	Lućmierz	Mastowice	Pawłowice	Stare Olesno	Sulejów	Tarnów	Zybiszów
Powiat	zgierski	wieluński	gliwicki	oleski	piotrkowski	ząbkowski	wrocławski
Kompleks rolniczej przydatności gleby	żytni dobry	żytni bardzo dobry	pszenny dobry	pszenny dobry	pszenny dobry	pszenny bardzo dobry	pszenny dobry
Klasa bonitacyjna gleby	IV b	III b	III b	III b	III b	III a	III a
pH gleby w KCL	6,2	6,2	6,4	6,0	6,3	6,0	7,0
Przedplon	Pszennyżyto ozime	soja	pszenica jara	pszenica ozima	pszenżyto ozime	pszenica ozima	soja
Data sadzenia (dzień, m-c)							
- bardzo wczesne	-	9.04	7.04	16.04	15.04	9.04	8.04
- wczesne	-	9.04	7.04	16.04	15.04	9.04	8.04
- średniowczesne	21.04	9.04	8.04	16.04	15.04	9.04	17.04
Data zbioru (dzień, m-c)							
- bardzo wczesne	-	24.08	8.09	17.08	26.08	18.08	9.09
- wczesne	-	24.08	9.09	27.08	17.09	8.09	11.09
- średniowczesne	30.09	22.09	21.09	4.09	18.09	22.09	23.09
Nawożenie organiczne							
Rodzaj nawozu (dt/ha)	-	-	-	-	nawóz zielony – 80	-	-
Nawożenie mineralne							
N (kg/ha)	89	110	112	112	120	110	87
P ₂ O ₅ (kg/ha)	26	50	60	92	105	50	60
K ₂ O (kg/ha)	100	80	150	140	171	75	90
Nawożenie dolistne (l/kg/ha)	Agroleaf Crop Potatoes – 5 Florovit – 1 Agroleaf Power High P-5	Basfoliar36Extra – 5 Basfoliar36Extra – 2	Basfoliar36Extra – 5 ADOB Mn – 2 Basfoliar36Extra – 5	-	ADOB B – 3 + Aminoprim – 1,5	Plonvit Ziemiaki – 1 Plonvit Ziemiaki – 1	-
Środki ochrony roślin							
Herbicydy (l, g/kg/ha)	Sencor Liquid 600 SC – 1	Plateen 41,5 WG – 2	Cabrio Duo112EC-2,5	Stallion 363 CS – 3 + Vernal 250 EC – 1 Fusilade Forte – 1,5	Sencor Liquid 600 SC – 1 Rimel 25 SG – 60	Racer 250 EC – 3	Plateen 41,5 WG – 2 Titus 25 WG – 60

Bardzo wczesne							
Fungicydy (l,g,kg/ha)	-	Ridomil Gold Pepite 67,8 WG – 2,5	Acrobat MZ 69 WG – 2	Mancolaxyl – 2,5	Infinito 687,5 SC – 1,6	Dithane Neotec75WG– 2	Zignal 500 SC – 0,4
		Pyton Consento 450 SC– 2	Cabrio Duo 112 EC – 2,5	Proxanil – 2,5	Ridomil GOLD MZ Pepite 67,8 WG – 2	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – 2,5	Curzate Top 72,5 WG – 2
		Galben 73 WP – 2	Polyram 70 WG – 1,6	Presidium – 1	Galben M73WP – 2	Carbio Duo 112 EC – 2,5	Dithane Neotec 75WG– 2
		Polyram 73 WP – 1,8		Fluazinova – 0,4	Leimay 200SC – 0,5	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – 2,5	Revus 250 SC – 0,6
							Curzate Top 72,5WG -2,3
Insektycydy (l,g,kg/ha)	-	Mospilan 20SP – 0,08	Karate Zeon 050 CS – 0,12	Calypso – 0,1	Fury 100 EW – 0,125	Proteus 110 OD – 0,4	Sparviero – 0,075
			Decis Mega – 0,12	Coragen 200SC – 0,06	Bulldock 025 EC – 0,3	Bulldock 025 EC – 0,3	Coragen 200 SC – 62,5
			Los Ovados – 0,1	Cyberkill Max – 0,06	Fury 100 EW – 0,125	Proteus 110 OD – 0,4	Decis Mega 50 EW – 0,15
			Calypso – 0,1	Calypso – 0,1	Karate Zeon 050CS – 0,16	Proteus 110 OD – 0,75	
			Delmetros 100 EC – 0,05		Mospilan 20SP – 80		
Wczesne							
Fungicydy (l,g,kg/ha)	-	Ridomil Gold Pepite 67,8 WG – 2,5	Acrobat MZ 69 WG – 2	Mancolaxyl – 2,5	Infinito 687,5 SC – 1,6	Dithane Neotec75WG– 2	Zignal 500 SC – 0,4
		Pyton Consento 450 SC-2	Cabrio Duo 112 EC – 2,5	Proxanil – 2,5	Ridomil GOLD MZ Pepite 67,8 WG – 2	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – 2,5	Curzate Top 72,5 WG – 2
		Galben 73 WP – 2	Calypso – 0,1	Presidium – 1	Galben M73WP – 2	Carbio Duo 112 EC - 2,5	Dithane Neotec 75 WG -2
		Polyram 73 WP – 1,8	Polyram 70 WG – 1,6	Fluazinova – 0,4	Leimay 200SC – 0,5	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – 2,5	Revus 250 SC – 0,6
			Acrobat MZ 69 WG – 2				Curzate Top 72,5WG– 2,3
Insektycydy (l,g,kg/ha)	-	Mospilan 20SP – 0,08	Karate Zeon 050 CS – 0,12	Calypso – 0,1	Fury 100 EW – 0,125	Proteus 110 OD – 0,4	Sparviero – 0,075
			Decis Mega – 0,12	Coragen 200SC – 0,06	Fury 100 EW – 0,125	Bulldock 025 EC – 0,3	Coragen 200 SC – 62,5
			Delmetros 100 EC – 0,05	Cyberkill Max – 0,06	Karate Zeon 050CS – 0,16	Proteus 110 OD – 0,4	Decis Mega 50 EW – 0,15
				Calypso – 0,1	Mospilan 20SP – 80		Proteus 110 OD – 0,75
					Mospilan 20SP – 80		
Średniowczesne, średniopóźne i późne							
Fungicydy (l,g,kg/ha)	Zignal 500 SC – 0,4	Pyton Consento 450 SC– 2	Acrobat MZ 69 WG – 2	Mancolaxyl – 2,5	Infinito 687,5 SC – 1,6	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – 2,5	Zignal 500 SC – 0,4
	Infinito 687,5 SC – 1,6	Galben 73 WP – 2	Polyram 70 WG – 1,6	Proxanil – 2,5	Ridomil GOLD MZ Pepite 67,8 WG – 2	Carbio Duo 112 EC – 2,5	Curzate Top 72,5 WG – 2
	Nando 500 SC – 0,4	Polyram 73 WP – 1,8	Acrobat MZ 69 WG – 2	Presidium – 1	Galben M73WP – 2	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – 2,5	Dithane Neotec 75WG– 2
		Ridomil Gold Pepite 67,8 WG – 2,5		Fluazinova – 0,4	Leimay 200SC – 0,5		Revus 250 SC – 0,6
							Curzate Top 72,5WG -2,3
Insektycydy (l,g,kg/ha)	CyberkillMax500 SC-0,06	Mospilan 20 SP – 0,08	Decis Mega 50 EW – 0,12	Calypso – 0,1	Fury 100 EW – 0,125	Proteus 110 OD – 0,4	Sparviero – 0,075
	Decis Mega 50 EW – 0,15	Decis Mega 50 EW – 0,15	Los Ovados – 0,1	Coragen 200SC – 0,06	Bulldock 025 EC – 0,3	Bulldock 025 EC – 0,3	Coragen 200 SC – 62,5
			Calypso 480 SC – 0,1	Cyberkill Max – 0,06	Fury 100 EW – 0,125	Proteus 110 OD – 0,4	Decis Mega 50 EW – 0,15
				Calypso – 0,1	Karate Zeon 050CS – 0,16		Proteus 110 OD – 0,75
				Calypso – 0,1	Mospilan 20SP – 80		

Tab. 112. Średnie miesięczne temperatury powietrza w punktach doświadczalnych w okresie wegetacji ziemniaka. Rok 2020.

Lp.	Miesiąc	Temperatura [°C]							
		ZDOO Lućmierz	ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/Stare Olesno	SDOO Sulejów	ZDOO Tarnów	SDOO Zybiszów	Średnia
1	Kwiecień	8,8	7,9	8,8	11,8	8,1	6,6	9,4	8,8
2	Maj	11,3	10,1	11,0	13,2	10,7	9,3	11,4	11,0
3	Czerwiec	18,1	17,0	17,5	18,7	18,0	15,3	17,8	17,5
4	Lipiec	18,9	18,2	18,7	20,9	18,2	16,2	19,1	18,6
5	Sierpień	20,3	19,5	20,0	22,6	19,6	17,4	20,8	20,0
6	Wrzesień	15,9	14,2	15,6	16,6	15,0	12,4	14,5	14,9
Średnia		15,6	14,5	15,3	17,3	15,0	12,9	15,5	15,1

Tab. 113. Miesięczne sumy opadów w punktach doświadczalnych w okresie wegetacji ziemniaka. Rok 2020.

Lp.	Miesiąc	Opady [mm]							
		ZDOO Lućmierz	ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/Stare Olesno	SDOO Sulejów	ZDOO Tarnów	SDOO Zybiszów	Średnia
1	Kwiecień	5	4	5	8	9	13	13	8
2	Maj	93	50	77	67	82	68	86	75
3	Czerwiec	167	93	178	200	138	164	188	161
4	Lipiec	73	35	53	46	40	39	34	46
5	Sierpień	104	68	72	65	81	132	87	87
6	Wrzesień	77	71	103	105	52	85	102	89
Suma		519	321	489	491	402	502	510	462

Tab. 114. Ziemniak. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej – pełnomocnika w Polsce
Odmiany bardzo wczesne				
1	Denar	1999	2008	Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
2	Impala	2003	2017	Agrico Polska sp. z o.o. Lębork
3	Impresja	2015	2020	Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
4	Riviera	2015	2019	Agrico Polska sp. z o.o. Lębork
5	Surmia	2020		Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
6	Tacja	2016		Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
7	Werbena	2020		Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
Odmiany wczesne				
1	Bellarosa	2006	2020	Europlant Handel Ziemniakami sp. z o. o. Nowa Wieś Lęborska
2	Bohun	2014	2019	Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
3	Gwiazda	2011	2014	Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
4	Ignacy	2012	2015	Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino
5	Ismena	2018		Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
6	Madeleine	2016		Agrico Polska sp. z o.o. Lębork
7	Magnolia	2015		Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino
8	Michalina	2010	2011	Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
9	Stokrotka	2017		Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino
10	Vineta	1999	2008	Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. Nowa Wieś Lęborska
Odmiany średniowczesne				
1	Jurek	2012	2018	Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
2	Laskara	2013		Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Świeszyno
3	Lech	2013		Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Kamień Krajeński
4	Mazur	2014		Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. Świeszyno
5	Mila	2020		GPR Centrala Nasienna Sp. z o.o. Nidzica
6	Otolia	2014		Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. Nowa Wieś Lęborska
7	Satina	2000		Solana Polska sp. z o.o. Zduny
8	Tajfun	2004	2008	Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Świeszyno
Odmiana średniopóźna				
1	Jelly	2005	2009	Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. Nowa Wieś Lęborska

LOZ – Lista Odmian Zalecanych (odmiany Satina w latach 2008-2020, Lech 2019-2020 na LOZ)

Tab. 115. Ziemiak bardzo wczesny. Plon ogólny i handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny					Plon handlowy *				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)											
	Wzorzec dt/ha	318,5	236,2	280,0	277,3	278,2	301,4	209,7	263,4	255,5	258,2
1	Denar LOZ	96	99	100	97	98	95	100	99	98	98
2	Impala LOZ	108	101	117	105	109	110	106	119	108	112
3	Impresja LOZ	95	102	89	99	95	93	99	86	96	92
4	Riviera LOZ	100	113	115	107	109	102	123	117	113	114
5	Surmia	92	-	-	-	-	93	-	-	-	-
6	Tacja	103	98	88	101	96	100	93	86	96	93
7	Werbena	107	-	-	-	-	107	-	-	-	-
Zbiór po zakończeniu wegetacji											
	Wzorzec dt/ha	592,4	310,5	512,4	451,5	471,8	552,9	265,7	477,7	409,3	432,1
1	Denar	105	103	110	104	106	108	104	112	106	108
2	Impala	94	103	107	99	101	94	105	106	100	102
3	Impresja	116	114	111	115	114	116	116	106	116	113
4	Riviera	80	108	95	94	94	80	117	96	99	98
5	Surmia	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-
6	Tacja	96	99	96	98	97	95	92	95	93	94
7	Tonacja	122	90	82	106	98	122	91	82	107	98
8	Werbena	92	-	-	-	-	92	-	-	-	-
	Liczba doświadczeń	6	6	6	12	18	6	6	6	12	18

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian, * - Plon handlowy – bulwy o średnicy poprzecznej powyżej 30 mm

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 116. Ziemiak bardzo wczesny. Plon ogólny i handlowy bulw w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny							Plon handlowy							
		Punkt doświadczalny														
		ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/St. Olesno	SDOO Sulejów	ZDOO Tarnów	SDOO Zybiszów	Średnia	ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/St. Olesno	SDOO Sulejów	ZDOO Tarnów	SDOO Zybiszów	Średnia	
Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)																
Wzorzec dt/ha		220,4	276,0	314,3	355,9	243,9	500,4	318,5	204,3	268,1	273,5	335,3	232,5	494,4	301,4	
1	Denar	LOZ	83	103	85	99	94	110	96	81	104	84	96	94	110	95
2	Impala	LOZ	116	96	116	103	116	101	108	117	95	123	104	118	101	110
3	Impresja	LOZ	87	81	104	107	94	99	95	85	76	98	107	92	98	93
4	Riviera	LOZ	98	111	105	102	103	79	100	103	113	105	106	105	80	102
5	Surmia		96	91	90	90	90	95	92	99	92	93	90	92	95	93
6	Tacja		106	103	109	97	105	98	103	97	102	107	94	102	98	100
7	Werbena		115	116	90	102	99	118	107	117	118	90	104	97	118	107
Zbiór po zakończeniu wegetacji																
Wzorzec dt/ha		561,3	528,3	499,6	636,4	677,3	651,6	592,4	532,1	495,6	478,2	593,0	638,3	579,9	552,9	
1	Denar		97	100	107	110	110	108	105	97	101	108	112	111	122	108
2	Impala		89	94	97	96	96	95	94	89	94	96	93	95	98	94
3	Impresja		118	103	133	118	124	100	116	120	98	133	122	124	100	116
4	Riviera		92	84	83	80	86	54	80	91	87	83	79	90	52	80
5	Surmia		92	90	102	96	87	94	93	93	89	104	92	86	91	93
6	Tacja		88	106	92	101	87	105	96	82	105	91	98	86	105	95
7	Tonacja		130	125	115	107	112	143	122	133	128	113	111	112	136	122
8	Werbena		94	98	72	92	97	100	92	95	99	72	92	97	96	92

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 117. Ziemiak wczesny. Plon ogólny i handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny					Plon handlowy *				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	578,3	339,7	537,2	459,0	485,1	545,6	304,5	505,0	425,1	451,7
1	Bellarosa LOZ	101	105	100	103	102	103	111	104	107	106
2	Bohun LOZ	117	95	107	106	106	113	91	105	102	103
3	Gwiazda LOZ	97	107	106	102	103	98	105	106	102	103
4	Ignacy LOZ	110	104	106	107	107	110	104	106	107	107
5	Ismena	89	-	-	-	-	88	-	-	-	-
6	Madeleine	87	93	107	90	96	86	95	106	91	96
7	Magnolia	93	90	92	91	92	94	88	94	91	92
8	Michalina LOZ	110	125	94	118	110	110	126	96	118	111
9	Stokrotka	100	-	-	-	-	99	-	-	-	-
10	Vineta LOZ	97	94	96	95	96	97	94	98	96	96
	Liczba doświadczeń	6	6	6	12	18	6	6	6	12	18

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian, * - Plon handlowy – bulwy o średnicy poprzecznej powyżej 30 mm

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 118. Ziemiak wczesny. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny										Plon handlowy				
		Punkt doświadczalny														
		ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/St. Olesno	SDOO Sulejów	ZDOO Tarnów	SDOO Żybszów	Średnia	ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/St. Olesno	SDOO Sulejów	ZDOO Tarnów	SDOO Żybszów	Średnia	
Wzorzec dt/ha		583,6	493,0	489,2	640,1	665,2	598,7	578,3	560,4	469,9	476,2	619,6	620,9	526,3	545,6	
1	Bellarosa LOZ	102	93	121	105	88	97	101	105	93	123	104	92	100	103	
2	Bohun LOZ	124	112	108	113	124	120	117	116	112	109	110	118	116	113	
3	Gwiazda LOZ	90	90	95	110	96	103	97	91	90	95	109	98	107	98	
4	Ignacy LOZ	107	111	104	107	131	99	110	104	113	102	107	133	102	110	
5	Ismena	85	87	76	97	84	103	89	85	87	76	96	85	98	88	
6	Madeleine	94	85	84	90	93	73	87	95	84	78	91	90	77	86	
7	Magnolia	91	102	85	98	93	89	93	93	104	86	99	94	90	94	
8	Michalina LOZ	114	117	108	81	116	126	110	115	118	107	80	117	125	110	
9	Stokrotka	95	107	104	94	100	100	100	93	104	106	96	97	99	99	
10	Vineta LOZ	99	96	115	106	75	90	97	102	96	117	108	76	86	97	

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 119. Ziemiak średniowczesny. Plon ogólny i plon handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny					Plon handlowy *				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
		Wzorzec dt/ha	526,6	342,3	540,8	434,4	469,9	501,9	475,3	403,7	427,6
1	Jurek LOZ	112	105	106	108	108	114	101	105	108	107
2	Laskara	93	91	104	92	96	93	92	105	92	97
3	Lech	100	97	104	98	100	94	81	103	87	93
4	Mazur	111	96	90	103	99	113	100	98	106	104
5	Mila	83	-	-	-	-	82	-	-	-	-
6	Otolia	110	92	-	101	-	112	97	-	105	-
7	Satina	87	102	101	94	97	87	105	110	96	101
8	Tajfun LOZ	108	99	101	103	103	109	98	107	103	105
9	Jelly-średniopóźna LOZ	96	104	107	100	102	96	108	95	102	100
Liczba doświadczeń		7	7	7	14	21	7	7	7	14	21

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian, * - Plon handlowy – bulwy o średnicy poprzecznej powyżej 30 mm

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 120. Ziemiak średniowczesny. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (%wzorca), Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Plon ogólny										Plon handlowy						
		Punkt doświadczalny																
		ZDOO Lućmierz	ZDOO Masłowice	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/St. Olesno	SDOO Sulejów	SDOO Żybiżów	ZDOO Tarnów	Średnia	ZDOO Lućmierz	ZDOO Masłowic e	SDOO Pawłowice	HZ Zamarte O/St. Olesno	SDOO Sulejów	SDOO Żybiżów	ZDOO Tarnów	Średnia	
Wzorzec dt/ha		508,8	557,5	464,4	441,1	593,7	486,2	634,7	526,6	482,8	528,9	444,9	427,7	580,3	451,9	596,7	501,9	
1	Jurek	LOZ	105	106	92	125	107	129	122	104	109	93	127	108	134	126	114	
2	Laskara		90	100	97	99	99	67	99	88	99	96	98	99	68	101	93	
3	Lech		94	93	100	85	110	102	115	90	83	96	81	106	95	106	94	
4	Mazur		124	111	112	112	100	120	99	128	114	113	113	101	121	100	113	
5	Mila		69	93	86	79	87	83	84	70	94	84	75	86	84	81	82	
6	Otolia		122	105	112	96	94	134	108	123	109	114	98	95	136	110	112	
7	Satina		83	95	76	106	106	67	76	84	92	77	107	106	67	75	87	
8	Tajfun	LOZ	133	100	122	108	102	101	87	135	101	123	110	103	102	88	109	
9	Jelly- średniopóźna	LOZ	80	97	103	89	95	97	109	80	99	104	90	96	94	112	96	

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 121. Ziemiak bardzo wczesny. Zawartość skrobi (%).
Lata zbioru: 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020	2019	2018	2018-2020
Wzorzec (%)					
1	Denar	11,3	13,2	11,0	11,8
2	Impala	10,8	13,4	10,9	11,7
3	Impresja	10,3	12,7	10,1	11,0
4	Riviera	10,2	12,0	11,2	11,1
5	Surmia	11,1	-	-	-
6	Tacja	11,4	14,5	11,9	12,6
7	Tonacja	11,2	12,9	11,6	11,9
8	Werbena	10,4	-	-	-
Liczba doświadczeń		6	6	6	18

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 122. Ziemiak wczesny. Zawartość skrobi (%).
Lata zbioru: 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020	2019	2018	2018-2020
Wzorzec (%)					
1	Bellarosa	12,6	14,1	11,9	12,9
2	Bohun	13,4	14,8	12,3	13,5
3	Gwiazda	11,2	14,1	12,1	12,5
4	Ignacy	13,1	14,3	12,1	13,2
5	Ismena	11,8	-	-	-
6	Madeleine	10,2	13,1	11,7	11,7
7	Magnolia	16,1	18,6	15,3	16,7
8	Michalina	12,5	13,0	12,1	12,5
9	Stokrotka	12,1	-	-	-
10	Vineta	12,8	14,2	12,3	13,1
Liczba doświadczeń		6	6	6	18

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 123. Ziemniak średniowczesny. Zawartość skrobi (%).
Lata zbioru: 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020	2019	2018	2018-2020
	Wzorzec (%)	14,1	14,1	14,2	14,1
1	Jurek	13,6	13,3	13,3	13,4
2	Laskara	14,9	15,8	15,6	15,4
3	Lech	13,9	13,3	13,8	13,7
4	Mazur	15,0	14,5	14,8	14,8
5	Mila	14,8	-	-	-
6	Otolia	13,6	13,9	-	-
7	Satina	11,4	13,1	12,8	12,4
8	Tajfun	16,2	15,2	17,4	16,3
9	Jelly - średniopóźna	13,0	13,8	13,9	13,6
	Liczba doświadczeń	7	7	7	21

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp.	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	PLON BULW % WZORCA 2018-2020	
				Plon ogólny	Plon handlowy
Ziemniak bardzo wczesny					
1	DENAR	1999	2008	98 (106)	98 (108)
2	IMPALA	2003	2017	109 (102)	112 (102)
3	IMPRESJA	2015	2020	95 (114)	92 (113)
4	RIVIERA	2015	2019	109 (94)	114 (98)
Ziemniak wczesny					
1	BELLAROSA	2006	2020	102	106
2	BOHUN	2014	2019	106	103
3	GWIAZDA	2011	2014	103	103
4	IGNACY	2012	2015	107	107
5	MICHALINA	2010	2011	110	111
6	VINETA	1999	2008	96	96
Ziemniak średniowczesny i średniopóźny					
1	JUREK	2012	2018	108	107
2	TAJFUN	2004	2008	103	105
3	JELLY – odm.średniopóźna	2005	2009	102	100

KR – Krajowy Rejestr Odmian

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

- dla ziemniaka bardzo wczesnego 2 terminy kopania (wczesny – po 40 dniach od wschodów,
końcowy – po zakończeniu wegetacji) – dla plonu ogólnego 278,2 i 471,8 dt/ha,
dla plonu handlowego 258,2 i 432,1 dt/ha

- dla ziemniaka wczesnego – dla plonu ogólnego 485,1 dt/ha, dla plonu handlowego 451,7 dt/ha

- dla ziemniaka średniowczesnego, średniopóźnego – dla plonu ogólnego 469,9 dt/ha,
dla plonu handlowego 427,6 dt/ha

13. BOBIK

Doświadczenie z bobikiem w roku 2018 prowadzone było tylko w Głubczycach, natomiast w latach 2019-2020 w Głubczycach i Pągowie na jednym poziomie agrotechniki. W 2020 roku badano 11 odmian w 3 grupach (5 odmian niesamokończących wysokotaninowych, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych i 1 odmiana samokończąca wysokotaninowa). W latach 2018-2020 wszystkie doświadczenia były wykonane prawidłowo. Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze przedstawiono w tabelach poniżej.

W Głubczycach, średnio w 3-leciu przy plonie nasion 46,1 dt/ha najwyżej plonowały odmiany Apollo, Fanfare i Capri (niesamokończące wysokotaninowe). W Pągowie, w latach 2019-2020, przy średnim plonie 43,4 dt/ha najwyżej plonującymi były odmiany Capri, Apollo i Albus. W Polsce w 3-leciu wyróżniały się Capri, Apollo i Fanfare, a średni plon wynosił 39,6 dt/ha.

Najwyższą odmianą w 3-leciu był Bobas i on też był najbardziej podatny na wyleganie. Wyższą masę tysiąca nasion miały odmiany Albus i Apollo, a najniższą cechowała się Fernando.

Choroby grzybowe występowały w podobnym nasileniu. Porażenie nasion przez strąkowca w Głubczycach wynosiło średnio 2,8%.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

ALBUS, AMIGO, APOLLO, CAPRI, FANFARE i GRANIT.

Tab. 124. Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głubczyce	Pągów
Powiat		Głubczyce	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	3
Klasa bonitacyjna gleby		II	IVa
pH gleby w KCl		6,5	6,9
Przedplon		Rzepak ozimy	Pszenica ozima
Data siewu	(dzień, m-c, rok)	27.03	07.04
Obsada roślin	(szt./m²)	50- odmiany tradycyjne 70- odmiana samokończąca	
Data zbioru	(dzień, m-c, rok)	13.08	12.08
Nawożenie mineralne			
N	(kg/ha)	69	68
P ₂ O ₅	(kg/ha)	69	74
K ₂ O	(kg/ha)	105	64
Mikronawozy	(l,kg/ha)	MgSO ₄ – 5 + ADOB Mo – 0,1 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 1,5 + Basfoliar 6-12-6 – 5	
Środki ochrony roślin			
Zaprawa nasienna (nazwa)		Nitragina Bio Food Włacz	
Herbicydy	(l/ha)	Proman 500 SC – 2,0 + Efector 360 CS – 0,1	Stomp Aqua 455 CS – 3,0
Insektycydy		Proteus 110 OD – 0,4 + Karate Zeon 050 CS – 0,12	Proteus 110 OD – 0,4 + Karate Zeon 050 CS – 0,12 Decis Mega 50 EW – 0,2 Proteus 110 OD – 0,4
		Danadim 400 EC – 0,25 +Decis Mega 50 EW – 0,2	
		Danadim 400 EC – 0,3 + Decis Mega 50 EW – 0,1	
		Proteus 110 OD – 0,4	

Tab. 125. Bobik - Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Bobas NW	2002		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
2	Fanfare NW	2017	2019	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec
3	Julia NW	2017		AT	IGP Polska sp. z o.o. Poznań
4	Apollo NW	2018	2019	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec
5	Capri NW	2018	2020	DE	Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec
6	Albus NN	2002	2019	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
7	Amigo NN	2016	2020	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
8	Fernando NN	2016		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
9	Diego NN	2019		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
10	Domino NN	2020		PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
11	Granit SW	2006	2019	PL	Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

NW - odmiana niesamokończąca wysokotaninowa

NN - odmiana niesamokończąca niskotaninowa

SW - odmiana samokończąca wysokotaninowa

Tab. 126. Bobik. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha	Głęboczyce	Pągów
1	Termin kwitnienia (dzień, m-c)	01.06	-
2	Termin dojrzałości technicznej (dzień, m-c)	28.07	-
3	Wysokość roślin (cm)	155	141
4	Wyleganie w kwitnieniu (skala 9°)	9,0	9,0
5	Wyleganie przed zbiorem (skala 9°)	6,1	7,7
6	Porażenie przez choroby (skala 9°)		
	Plamistość czekoladowa	8,0	7,5
	Rdza bobiku	7,9	6,5
	Askochytoza	7,2	7,3
	Strąkowiec (%)	2,8	-
7	Masa 1000 nasion (g)	521,6	-
8	Wilgotność nasion podczas zbioru (%)	19,1	13,3
9	Plon nasion (dt z ha)	54,1	41,8

Tab. 127. Bobik. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	2020	2019	2018*	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha dt/ha	48,0	39,0	51,0	43,5	46,0
Odmiany niesamokończące - wysokotanimowe						
1	Bobas	89	92	101	91	94
2	Fanfare LOZ	105	110	104	107	106
3	Julia	81	-	106	-	-
4	Apollo LOZ	117	109	106	113	111
5	Capri LOZ	107	114	111	110	111
Odmiany niesamokończące - niskotanimowe						
6	Albus LOZ	116	96	98	106	103
7	Amigo LOZ	97	99	87	98	94
8	Fernando	97	96	93	97	95
9	Diego	98	93	-	96	-
10	Domino	97	-	-	-	-
Odmiany samokończące - wysokotanimowe						
11	Granit LOZ	98	93	102	96	98
	Liczba doświadczeń	2	2	1	4	5

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

*dane tylko z Głubczyc

Tab. 128. Bobik. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Rok zbioru 2020, 2018-2020

Lp.	Odmiana	Głubczyce					Pąków			Polska	
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2019-2020	2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	54,1	33,1	51,0	43,6	46,1	41,8	44,9	43,4	50,3	39,6
Odmiany niesamokończące - wysokotanimowe											
1	Bobas	101	89	101	95	97	77	95	86	99	98
2	Fanfare LOZ	108	116	104	112	109	102	103	103	106	107
3	Julia	85	-	106	-	-	76	-	-	97	-
4	Apollo LOZ	117	114	106	116	112	117	104	111	111	109
5	Capri LOZ	104	113	111	109	109	109	115	112	112	111
Odmiany niesamokończące - niskotanimowe											
6	Albus LOZ	107	97	98	102	101	124	94	109	99	97
7	Amigo LOZ	90	93	87	92	90	103	104	104	95	95
8	Fernando	94	92	93	93	93	100	100	100	97	95
9	Diego	89	93	-	91	61	106	92	99	92	93
10	Domino	99	-	-	-	-	94	-	-	98	95
Odmiany samokończące - wysokotanimowe											
11	Granit LOZ	105	93	102	99	100	91	93	92	96	97

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 129. Bobik. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)		Masa 1000 nasion (g)	
		2020	2018*- 2020	2020	2018*- 2020	2020*	2018*- 2020
Wzorzec		147	115	6,9	6,6	495,6	516,3
Odmiany niesamokończące- wysokotanianowe							
1	Bobas	154	122	5,8	5,1	494,6	525,2
2	Fanfare	151	115	7,5	7,3	501,7	520,3
3	Julia	149	-	5,8	-	508,9	-
4	Apollo	149	115	7,7	7,2	516,9	534,2
5	Capri	144	115	6,8	6,4	511,0	528,4
Odmiany niesamokończące –niskotanianowe							
6	Albus	149	113	7,5	7,4	510,7	536,3
7	Amigo	146	113	7,2	6,3	500,3	530,4
8	Fernando	149	113	6,3	6,7	471,3	484,7
9	Diego	152	-	7,3	-	517,6	-
10	Domino	148	-	7	-	467,8	-
Odmiany samokończące-wysokotanianowe							
11	Granit	126	108	6,8	6,3	451,2	497,5
Liczba doświadczeń		2	5	2	5	1	4

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian *dane tylko z Głubczyc

Tab. 130. Bobik. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby i szkodniki. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Plamistość czekoladowa (skala 9°)		Askochytoza (skala 9°)		Rdza bobiku (skala 9°)		Strąkowiec (%)	
		Głęboczyce	Pągów	Głęboczyce	Pągów	Głęboczyce	Pągów	Głęboczyce	Pągów
Wzorzec		8,0	7,5	7,2	7,3	7,8	6,5	2,8	-
Odmiany niesamokończące-wysokotaninowe									
1	Bobas	8,7	8,0	7,3	6,7	7,7	6,3	2,0	-
2	Fanfare	8,0	7,0	7,3	7,3	8,7	6,7	5,0	-
3	Julia	7,7	7,0	7,0	6,7	7,7	6,3	1,0	-
4	Apollo	8,3	8,0	7,3	8,0	7,7	6,3	1,0	-
5	Capri	8,0	8,0	7,7	7,7	8,3	6,7	6,0	-
Odmiany niesamokończące –niskotaninowe									
6	Albus	8,3	8,0	8,0	8,0	8,3	7,0	0,0	-
7	Amigo	8,3	7,7	7,3	7,7	7,3	6,0	2,0	-
8	Fernando	8,0	7,3	7,0	7,7	7,7	6,7	5,0	-
9	Diego	8,0	7,3	6,7	7,3	7,7	6,7	3,0	-
10	Domino	8,3	7,0	6,7	6,7	8,3	6,3	0,0	-
Odmiany samokończące-wysokotaninowe									
11	Granit	6,7	7,0	7,3	6,7	7,0	6,3	6,0	-

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

BOBIK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

LP.	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA LOZ	PLON ZIARNA % WZORCA 2018-2020
1	ALBUS	2002	2019	103
2	AMIGO	2016	2020	94
3	APOLLO	2018	2019	111
4	CAPRI	2018	2020	111
5	FANFARE	2017	2019	106
6	GRANIT	2006	2019	98

KR – Krajowy Rejestr Odmian

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian 2018-2020 - 46,0 dt/ha



14. GROCH

Doświadczenie z grochem w roku 2018 prowadzone było tylko w Głubczycach, natomiast w latach 2019-2020 w Głubczycach i Pągowie na jednym poziomie agrotechniki.

W 2020 roku badano 21 odmian w 2 grupach (20 odmian średniowysokich i 1 odmiana wysoka). W 3-leciu wszystkie doświadczenia były wykonane prawidłowo.

Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń w 2020 roku, pochodzenie odmian, zbiorcze wyniki plonowania oraz ważniejsze właściwości rolnicze przedstawiono w tabelach poniżej.

Średnio w 3-leciu, w Głubczycach przy plonie nasion 47,4 dt/ha najwyższej plonowały odmiany Mecenase, Astronaute, Tarchalska i Batuta oraz Mandaryn – wszystkie z grupy średniowysokich. W Pągowie przy średnim plonie 37,8 dt/ha w latach 2019-2020 najwyższej plonującymi były odmiany Nemo, Mentor, Medyk, Tarchalska i Astronaute. W Polsce średni plon nasion wynosił 36,3 dt/ha a wyróżniającymi się były Astronaute, Mandaryn, Tarchalska, Batuta i Prosper.

Najwyższą odmianą w 3-leciu była Mefisto, a do niższych należały Milwa, Hubal i Arwena. Wyleganie roślin było duże, zbliżone w odmianach. Odmiana wysoka Mefisto cechowała się wyższą mtn. W odmianach średniowysokich mtn wahała się od 142,6g (Turnia) do 176,6g (Tarchalska). Choroby grzybowe wystąpiły w niedużym nasileniu, w nieco wyższym mączniak właściwy.

Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego znajdują się:

ARWENA, ASTRONAUTE, BATUTA, MANDARYN, MECENAS, OLIMP, i TARCHALSKA.

Tab. 131 Groch siewny. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020.

Miejscowość		Głubczyce	Pągów
Powiat		Głubczyce	Namysłów
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1	3
Klasa bonitacyjna gleby		II	IV a
pH gleby w KCl		6,5	6,9
Przedplon		Rzepak ozimy	Pszenica ozima
Data siewu	(dzień, m-c, rok)	27.03	07.04
Obsada roślin	(szt./m²)	110 (odmiany średniowysokie) 100 (odmiany wysokie)	
Data zbioru	(dzień, m-c, rok)	13.08	12.08
Nawożenie mineralne			
N	(kg/ha)	69	68
P₂O₅	(kg/ha)	69	74
K₂O	(kg/ha)	105	64
Mikronawozy	(l,kg/ha)	MgSO₄ – 5+ ADOB Mo – 0,1 + ADOB Zn – 0,5 + ADOB Mn – 1,5 + Basfoliar 6-12-6 – 5	
Środki ochrony roślin			
Zaprawa nasienna (nazwa)	Nitragina Bio Food Wałcz		
Herbicydy (l/ha)	Proman 500 SC – 2,0 + Efektor 360 CS – 0,1		Stomp Aqua 455 CS – 3,0
Insektycydy (l/ha)	Proteus 110 OD - 0,4 + Karate Zeon 050 CS – 0,12 Danadim 400 EC - 0,25 +Decis Mega 50 EW – 0,2 Danadim 400 EC - 0,3 + Decis Mega 50 EW – 0,1 Proteus 110 OD – 0,4 Danadim 400 EC –0,5 + Los Ovados 200 SE– 0,125		Proteus 110 OD - 0,4 + Karate Zeon 050 CS – 0,12 Decis Mega 50 EW – 0,2 Proteus 110 OD – 0,4 Danadim 400 EC – ,5 + Los Ovados 200 SE – 0,125

Tab. 132. Groch siewny - Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana		Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ*	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
1	Tarchalska	SW	2004	2019	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
2	Hubal	SW	2005		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
3	Milwa	SW	2005		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR, Kobylin
4	Batuta	SW	2009	2021	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
5	Mentor	SW	2011		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR, Kobylin
6	Turnia	SW	2011		PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Tulce
7	Mecenas	SW	2012	2020	PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR, Kobylin
8	Arwena	SW	2015	2019	PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
9	Starski	SW	2016		PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Tulce
10	Astronaute	SW	2017	2019	FR	Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec
11	Olimp	SW	2017	2020	PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Tulce
12	Spot	SW	2017		FR	IGP Polska sp. z o.o. sp. k., Poznań
13	Tytus	SW	2017		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
14	Medyk	SW	2018		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR, Kobylin
15	Mandaryn	SW	2019	2021	PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR, Kobylin
16	Nemo	SW	2019		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
17	Rivoli	SW	2019		FR	IGP Polska sp. z o.o. Poznań
18	Grot	SW	2020		PL	Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Tulce
19	Kazek	SW	2020		PL	DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
20	Prosper	SW	2020		FR	IGP Polska sp. z o.o. Poznań
21	Mefisto	W	2019		PL	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR, Kobylin

SW - odmiana średniowysoka

W - odmiana wysoka

* LOZ – Lista Odmian Zalecanych, (odmiany Milwa, Turnia, Starski – w latach 2019-2020 na LOZ)

Tab. 133. Groch siewny. Zbiornicze wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2020.

Lp.	Cecha		Głębocze	Pągów
1	Termin kwitnienia	(dzień, m-c)	06.06	29.05
2	Termin dojrzałości technicznej	(dzień, m-c)	26.07	-
3	Wysokość roślin	(cm)	151	96
4	Wyleganie w kwitnieniu	(skala 9°)	9,0	9,0
5	Wyleganie przed zbiorem	(skala 9°)	2,5	3,0
6	Porażenie przez choroby	(skala 9°)		
	Mączniak prawdziwy		7,7	7,4
	Rdza grochu		7,3	8,1
	Askochytoza		8,1	8,3
	Strąkowiec	(%)	0	0
7	Masa 1000 nasion	(g)	241,8	-
8	Wilgotność nasion podczas zbioru	(%)	13,3	10,8
9	Plon nasion	(dt z ha)	37,2	32,8

Tab. 134. Groch siewny. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		2020	2019	2018*	2019-2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha			35,0	46,8	54,1	40,9	45,3
Odmiany średniowysokie							
1	Tarchalska	LOZ	116	107	97	111	107
2	Hubal		80	98	102	89	93
3	Milwa		94	101	102	97	99
4	Batuta	LOZ	107	95	106	101	103
5	Mentor		125	95	93	110	104
6	Turnia		89	97	107	93	98
7	Mecenas	LOZ	111	108	104	109	108
8	Arwena	LOZ	95	106	109	100	103
9	Starski		92	101	102	96	98
10	Astronaute	LOZ	117	99	116	108	111
11	Olimp	LOZ	98	100	104	99	101
12	Spot		103	103	98	103	101
13	Tytus		85	90	92	88	89
14	Medyk		104	105	98	104	102
15	Mandaryn	LOZ	104	105	-	105	-
16	Nemo		120	98	-	109	-
17	Rivoli		91	106	-	98	-
18	Grot		97	-	-	-	-
19	Kazek		98	-	-	-	-
20	Prosper		95	-	-	-	-
Odmiany wysokie							
21	Mefisto		77	96	-	86	-
Liczba doświadczeń			2	2	1	4	5

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ – Lista Odmian Zalecanych *dane tylko z Głubczyc



Tab. 135. Groch siewny. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Rok zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana		Głubczyce					Pągów			Polska	
			2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2019-2020	2020	2018-2020
Wzorzec dt/ha			37,2	50,9	54,1	44,1	47,4	32,8	42,7	37,8	37,6	36,3
Odmiany średniowysokie												
1	Tarchalska	LOZ	119	111	97	115	109	113	102	107	108	108
2	Hubal		86	86	102	86	91	75	109	92	96	99
3	Milwa		96	105	102	100	101	91	96	94	88	97
4	Batuta	LOZ	108	103	106	105	106	106	87	96	110	107
5	Mentor		117	100	93	109	103	134	90	112	99	91
6	Turnia		79	87	107	83	91	99	106	102	90	99
7	Mecenas	LOZ	118	114	104	116	112	104	102	103	101	99
8	Arwena	LOZ	94	110	109	102	104	96	101	98	97	101
9	Starski		98	101	102	100	100	86	100	93	94	97
10	Astronaute	LOZ	110	109	116	109	112	125	88	107	113	112
11	Olimp	LOZ	105	100	104	103	103	91	99	95	105	101
12	Spot		97	96	98	97	97	109	109	109	102	104
13	Tytus		83	92	92	87	89	88	88	88	91	97
14	Medyk		92	100	98	96	97	116	109	112	93	97
15	Mandaryn	LOZ	114	110	-	112	-	94	100	97	107	109
16	Nemo		104	96	-	100	-	137	100	119	101	106
17	Rivoli		104	101	-	103	-	79	110	94	98	100
18	Grot		92	-	-	-	-	101	-	-	108	104
19	Kazek		103	-	-	-	-	94	-	-	98	104
20	Prosper		96	-	-	-	-	94	-	-	100	105
Odmiany wysokie												
21	Mefisto		83	100	-	91	-	70	91	81	85	98

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 136. Groch siewny. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Lata zbioru 2020, 2019-2020.

Lp.	Odmiana	Wysokość roślin (cm)		Wyleganie (skala 9°)		Masa 1000 nasion (g)	
		2020	2019-2020	2020	2019-2020	2020 *	2019-2020
Wzorzec		123	74	2,8	2,1	241,8	163,5
Odmiany średniowysokie							
1	Tarchalska	100	67	2,7	2,1	272,3	176,6
2	Hubal	92	62	2,0	1,6	226,3	165,6
3	Milwa	84	59	2,3	1,8	232,7	163,1
4	Batuta	97	64	2,0	1,7	243,3	163,4
5	Mentor	101	68	3,0	2,4	237,6	162,9
6	Turnia	99	65	3,3	1,9	187,7	142,6
7	Mecenas	97	67	2,7	2,3	248,0	169,6
8	Arwena	96	63	2,3	1,7	233,3	160,8
9	Starski	102	67	2,0	1,8	250,2	164,5
10	Astronaute	100	64	3,0	2,1	274,2	172,6
11	Olimp	103	67	2,0	1,8	250,9	168,4
12	Spot	103	64	2,3	1,8	272,0	176,1
13	Tytus	108	71	2,7	2,0	239,3	165,8
14	Medyk	102	67	2,7	2,1	229,5	153,4
15	Mandaryn	98	65	3,0	2,3	265,7	174,3
16	Nemo	110	70	2,7	2,1	242,9	166,0
17	Rivoli	99	64	2,0	1,8	242,1	161,4
18	Grot	92	-	2,3	-	232,4	-
19	Kazek	108	-	2,7	-	239,3	-
20	Prosper	97	-	2,7	-	252,3	-
Odmiany wysokie							
21	Mefisto	113	108	2,7	3,5	204,8	222,5
Liczba doświadczeń		2	4	2	4	1	3

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

*dane tylko z Głubczyc

Tab. 137. Groch siewny. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby. Lata zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Mączniak prawdziwy (skala 9°)		Askochytoza (skala 9°)		Rdza grochu (skala 9°)	
		Głębocze	Pagów	Głębocze	Pagów	Głębocze	Pagów
Wzorzec		7,7	7,3	8,0	8,3	7,3	8,1
Odmiany średniowysokie							
1	Tarchalska	7,7	8,0	8,3	9,0	6,7	8,3
2	Hubal	7,3	7,3	7,7	7,7	7,7	8,0
3	Milwa	7,7	7,0	7,7	8,0	7,3	8,0
4	Batuta	7,7	7,0	8,7	8,0	7,0	8,0
5	Mentor	7,7	8,0	7,7	9,0	7,7	8,3
6	Turnia	8,0	7,3	7,3	8,0	7,3	8,0
7	Mecenas	7,7	7,0	7,3	8,0	7,0	8,0
8	Arwena	8,0	7,3	8,3	8,0	7,3	8,0
9	Starski	7,7	7,0	8,0	8,0	7,3	8,0
10	Astronaute	8,3	7,0	8,0	7,7	7,3	8,0
11	Olimp	8,0	7,0	7,7	7,7	8,0	8,0
12	Spot	7,7	8,0	8,3	8,7	7,3	8,3
13	Tytus	7,3	7,0	8,3	8,0	8,0	8,0
14	Medyk	8,0	8,0	8,0	9,0	7,0	8,3
15	Mandaryn	7,3	7,3	8,3	8,0	7,0	8,0
16	Nemo	7,3	7,7	8,0	9,0	7,7	8,3
17	Rivoli	7,3	7,0	8,3	8,0	7,3	8,0
18	Grot	7,7	7,0	8,0	9,0	7,3	8,0
19	Kazek	7,7	7,0	8,7	8,0	6,7	8,0
20	Prosper	8,0	7,3	8,3	8,0	7,0	8,0
Odmiany wysokie							
21	Mefisto	8,0	8,0	8,0	8,7	7,0	8,3

Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian

GROCH

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp.	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA ŁOŻ	PLON NASION % WZORCA 2018-2020
1	ARWENA	2015	2019	103
2	ASTRONAUTE	2017	2019	111
3	BATUTA	2009	2021	103
4	MANDARYN	2019	2021	105*
5	MECENAS	2012	2020	108
6	OLIMP	2017	2020	101
7	TARCHALSKA	2004	2019	106

KR – Krajowy Rejestr Odmian

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian – 45,3 dt/ha

* Dla odmiany Mandaryn wzorzec z lat 2019-2020 – 40,9 dt/ha

15. SOJA

Doświadczenia z soją prowadzono w Głubczycach i Łosiu (odmianowe i z gęstością siewu) w latach 2018-2020.

Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczeń, zestaw odmian i ich pochodzenie przedstawiono w poniższych tabelach. Do zaprawiania nasion stosowano nitraginę Hi Stick Soy BASF.

W okresie wegetacji soi przebieg warunków pogodowych był raczej korzystny. W latach 2018-2020 było ciepło (16,2°C w Głubczycach i 17,1°C w Łosiu), szczególnie w czerwcu, lipcu i sierpniu, z różną ilością opadów (suchy 2018 i 2019 i bardzo mokry 2020 rok). Szczególnie duża ilość opadów miała miejsce w czerwcu oraz wrześniu i październiku, co wpłynęło na opóźnienie zbioru. Suma temperatur efektywnych wynosiła od 2489 – 2803°C w Głubczycach i od 2433 – 2947°C w Łosiu. Przymrozki przygruntowe wystąpiły w pojedynczych dniach maja w Głubczycach.

Średni plon nasion dla 34 odmian soi w latach 2018-2020 w województwie opolskim wynosił 35,2 dt/ha. Wyróżniały się odmiany Acardia, ES Comandor, Viola, Kofu oraz Achillea, Bettina, Albiensis i Tertia. W ostatnim roku przy średniej 44,2 dt/ha dobrze plonowały Achillea, Viola, ES Comandor, Albiensis i Acardia. Wyraźnie wyżej plonowała soja w Głubczycach. Średni plon nasion w 3-leciu wynosił 42,7, a w 2020 roku 47,0 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany Acardia, ES Comandor i Regina oraz Albiensis, Tertia i Bettina. Średni plon nasion w Łosiu wyniósł 31,6, a w 2020 roku 41,3 dt/ha. Wyróżniały się Acardia, Viola i ES Comandor oraz Achillea, Bettina i Tertia. Do oceny odmian posilkowano się również wynikami plonowania soi z Tarnowa Śl. (woj. dolnośląskie). W 2020 roku, przy średnim plonie 46,9 dt/ha najwyżej plonowały odmiany Tertia, Acardia, Albiensis, Amiata, Achillea i RGT Salsa.

W województwie opolskim w latach 2018-2020 soję zbierano przy średniej wilgotności nasion 16,3%, a w 2020 roku 24%. ze zróżnicowaniem w grupach wczesności. Średnia ilość wysiewu, przy 70 szt/m² wynosiła 157,3 kg/ha, natomiast po wschodach liczba roślin 60 szt/m². Wysokość roślin była dość zróżnicowana, od 79 cm u odmian Erica i Regina do 93 cm u odmiany Abelina. Wyleganie roślin przed zbiorem było nieduże, większe w 2020 roku. Do bardziej podatnych należały odmiany Mayrika, Abelina, Sirelia i Petrina. Wysokość osadzenia najniższego strąka wynosiła średnio 10 cm. Nieco wyżej osadzały strąki odmiany Mayrika i SG Anser. Średnia masa tysiąca nasion wynosiła 223,1 g, ze zróżnicowaniem od 190,2 g u odmiany Mayrika do 247,4 g u odmiany Obelix.

Zawartość białka w 2020 roku ukształtowała się średnio na poziomie 44,9%. Wyższą miały odmiany Tertia i Favorit. Zawartość tłuszczu wahała się od 17,3% u odmiany NS Mercury do 20,5% u odmiany Abelina, przy średniej 18,7%.

Średni plon białka wyniósł 19,8 dt/ha (od 18,7 dt/ha w Łosiu do 20,9 dt/ha w Głubczycach).

Do odmian o wyższym plonie białka należały Achillea, Viola i Tertia, a najniższy miały Pompei i NS Mercury. Plon tłuszczu wynosił średnio 8,2 dt/ha. Najwyższym plonem tłuszczu wyróżniały się odmiany Acardia, Achillea, Viola, ES Comandor i Tertia, a najniższy miały Pompei i NS Mercury.

W Głubczycach przy średnim plonie nasion 42,7 dt/ha w 3-leciu wilgotność nasion soi wahała się od 12,8% u odmiany Erica do 16,4% u odmian Obelix i Brunensis. Średnia ilość wysiewu wynosiła 157 kg/ha, ze znacznym zróżnicowaniem dla odmian (od 106 kg/ha Viola do 201 kg/ha Obelix).

Liczba roślin po wschodach wynosiła średnio 67 szt/m². Wyższą miały odmiany Kofu i Sirelia. Wysokość roślin wynosiła od 74 cm u odmiany Erica do 104 cm u odmiany Mavka. Wyleganie roślin było nieduże, większe w 2020 roku. Do bardziej podatnych należały Mavka i Mayrika. Wysokość osadzenia najniższego strąka wynosiła średnio 11 cm. Wyżej strąki wiązały odmiany Mayrika, Abelina, SG Anser, Mavka i Acardia. Liczba strąków na jednej roślinie była zróżnicowana w latach (średnio od 18 szt w 2018 do 23 szt w 2020 roku). Wyraźnie mniejszą wiązały odmiany Moravians, Erica, Ambella, SG Anser i Naya. Masa tysiąca nasion wahała się od 194,6g u odmiany Mayrika do 273,1 g u odmiany SG Anser. Osypywanie nasion z pękających strąków było nieduże. Do bardziej podatnych odmian należały SG Anser i Aligator.

W 2020 roku średnia zawartość białka wynosiła 44,4%, a tłuszczu 17,3%. Większą zawartością białka cechowały się odmiany Aurelina i Tertia, a tłuszczu Abelina, Acardia i Mavka. Średni plon białka wyniósł 20,9 dt/ha, a tłuszczu 8,1 dt/ha. Wyższym plonem białka odznaczały się odmiany Tertia i Albiensis, a tłuszczu Acardia,

Abelina, Albiensis, RGT Salsa i Tertia.

W doświadczeniach z gęstością siewu, w których badano 9 odmian w 3-leciu plon nasion wynosił w województwie 30,5 dt/ha, przy 30 szt/m², 33,8 dt/ha, przy 45 szt/m² i 35,5 dt/ha przy 60 szt/m², a w 2020 roku odpowiednio 36,2, 41,2 i 43,3 dt/ha. Wysiew 30 szt/m² jest za mały, ale różnica między 60 a 45 szt/m², biorąc pod uwagę cenę nasion wskazuje na możliwość obniżenia ilości wysiewu do 45 szt/m², zwłaszcza w Głubczycach. Do bardziej przydatnych do tego celu odmian należały Acardia i Albiensis. Na wilgotność i masę tysiąca nasion przy zbiorze gęstość wysiewu nie miała średnio większego wpływu. Liczba roślin była oczywiście najwyższa przy 60 szt/m². Średnia wysokość roślin, ich wyleganie przed zbiorem oraz wysokość osadzenia najniższego strąka również wzrastały przy większej gęstości siewu soi.



Tab. 138. Soja. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Lata zbioru 2018, 2019, 2020.

Miejscowość		Głęboczyce		Łosiów		
Powiat	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kompleks rolniczej przydatności gleby		1			2	
Klasa bonitacyjna gleby		II		IIla	IIlb	II
pH gleby w KCl	6,7	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7
Przedplon		pszenica ozima	rzepak ozimy		pszenica ozima	
Data siewu (dzień, m-c, rok)	26.04.	26.04.	28.04	26.04.	06.05.	29.04
Obsada roślin (szt./m ²)						70
Data zbioru (dzień, m-c, rok)	23.08. – Augusta 10.09. – Erica, Adsoy, Bohemians, Sculptor, Mayrika, Merlin, Obelix, Sirella, GL Melanie, ES Comandor, Regina, Viola, Brunensis, Lissabon, Sultana, Coraline, RGT Shouna 12.09. – Mavka, Abelina, Maja, Acardia, Moravians, Silesia, SG Anser, Alligator, Madlen, Protina, Petrina, Kofu, Korus, Malaga, Naya	23.09.	16.11	31.08.	01.10.	26.10
Nawożenie mineralne						
N	0	0	60	0	0	0
P ₂ O ₅ (kg/ha)	55	69	69	20	0	0
K ₂ O (kg/ha)	72	116	117	40	40	0
Mikronawozy (kg/ha. //ha)	ADOB Mo – 0,15 ADOB Zn – 1,5	ADOB Mo – 0,1 ADOB Zn – 0,7	ADOB Mo – 0,1 ADOB Zn – 0,7	ADOB B – 1 +ADOB Zn – 1 +ADOB Mo – 0,3 +ADOB Mo – 0,3	ADOB B – 1 +ADOB Zn – 1 +ADOB Mo – 0,3 + Basfoliar 6-12-6 – 5	ADOB B – 1 +ADOB Zn – 1 +ADOB Mo – 0,3 + Basfoliar 6-12-6 – 5
Środki ochrony roślin						
Zaprawa nasienna (nazwa)		Nitragina Hi Stick Soy BASF				
Herbicydy (//ha)	Proman 500 SC – 3,0 + Fusilade Forte 150 EC–1,0 Corum 502,4 SL – 1,0	Proman 500 SC – 2,7 + Comand 480 EC – 0,05 Corum 502,4 SL – 0,5 Fusilade Forte 150 EC–0,9 Corum 502,4 SL – 0,6	Proman 500 SC – 3,0 + Efector 360 CS – 0,8 Corum 502,4 SL – 0,6 + Dash – 0,5 Corum 502,4 SL – 0,7 + Dash – 0,5 Fusilade Forte 150 EC–1,0	Sencor Liquid 600 SC–0,6 + Comand 480 EC – 0,2 Select Super 120 EC–0,8 Corum 502,4 SL – 1,25	Kilof 480 EC – 0,2 + Sencor Liquid 600 SC – 0,6 + Select Super 120 EC–0,8	Proman 500 SC – 3,0 + Comand 480 EC – 0,05 Select Super 120 EC – 0,8 Corum 502,4 SL – 1,25 + Dash – 0,5

Tab. 139. Soja. Pochodzenie odmian.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ	Kod kraju pochodzenia	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce
1	Erica	2017		PL	Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
2	Adessa	2019		AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
3	Antigua	2019		AT	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
4	Mayrika	CCA		CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
5	Ambella	CCA		AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
6	Abelina	2016		AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
7	Mavka	2013		PL	Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" sp. z o.o. Huta Krzeszowska
8	Amiata	CCA		AT	Agrosimex sp z o.o. Goliany
9	Moravians	CCA		CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
10	Nessie PZO	CCA		AT	IGP Polska sp. z o.o. sp. Poznań
11	Obelix	CCA		AT	Tomasz Krakowiak Nowy Kawęczyn
12	Sirelia	CCA	2019	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice
13	SG Anser	CCA		AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
14	Favorit	CCA		RO	Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o. Rudnik nad Sanem
15	Aligator	2015		FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. Poznań
16	ES Comandor	2018	2021	FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. Poznań
17	Regina	2018	2020	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
18	Viola	2018	2021	CA	University of Guelph
19	Aurelina	2019		AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
20	ES Governor	2020		FR	Euralis Nasiona sp. z o.o. Poznań
21	Acardia	CCA	2020	AT	Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec
22	Achillea	CCA	2021	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
23	Albiensis	CCA	2021	CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
24	Brunensis	CCA		CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
25	RGT Salsa	CCA		FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice
26	RGT Sphinx	CCA		FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice
27	Petrina	2017	2019	CA	Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń
28	Kofu	CCA	2020	CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
29	Naya	CCA		CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
30	Bettina	CCA	2021	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. Środa Śląska
31	Tertia	CCA	2021	CZ	Prograin Zia s.r.o. sp. z o.o. Prudnik
32	Kapral	CCA		SLO	Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o. Rudnik nad Sanem
33	Pompei	CCA		SLO	Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o. Rudnik nad Sanem
34	NS Mercury	CCA		RO	Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o. Rudnik nad Sanem

Tab. 140. Warunki pogodowe w okresie wegetacji soi. Lata 2018-2020.

Miesiąc	Średnia temperatura °C										Opady mm					
	Głębzyce					Łosiów					Głębzyce			Łosiów		
	2018	2019	2020	2018-2020	2018-2020	2018	2019	2020	2018-2020	2018-2020	2018	2019	2020	2018-2020	2018	2019
Maj	16,4	11,7	11,0	13,0	17,1	12,3	12,0	13,8	13,8	13,8	43,1	98,3	66,7	69,4	44,0	64,9
Czerwiec	18,4	21,2	16,9	18,8	19,0	22,6	18,0	19,9	19,9	19,9	70,1	14,1	195,7	93,3	65,4	24,4
Lipiec	20,1	19,3	18,2	19,2	21,0	20,0	19,3	20,1	20,1	20,1	80,7	91,9	87,9	86,8	54,5	40,7
Sierpień	21,0	20,1	19,8	20,3	22,3	21,2	20,8	21,0	21,0	21,0	37,5	93,6	88,6	73,2	29,0	61,9
Wrzesień	15,7	14,3	15,4	15,1	16,9	15,2	16,3	15,8	15,8	15,8	46,9	66,4	126,0	79,8	31,1	53,3
Październik	10,5	10,9	10,3	10,6	11,7	11,5	10,9	11,2	11,2	11,2	48,0	30,1	156,8	78,3	37,4	29,6
Średnia (suma) V-X	17,0	16,3	15,3	16,2	18,0	17,1	16,2	17,1	16,2	17,1	326,3	394,4	721,7	480,8	261,4	274,8
Suma temperatur efektywnych	Głębzyce					Łosiów					2803 °C (2018), 2649 °C (2019), 2489 °C (2020) 2947 °C (2018), 2793 °C (2019), 2443 °C (2020)					

Tab. 141. Warunki pogodowe w okresie wegetacji soi. Głębzyce. Lata 2018-2020.

Miesiąc	Temperatura powietrza °C												Opad					
	Średnia dobową				Minimalna				Maksymalna				Minimalna przy gruncie			mm		
	2018	2019	2020	2018-2020	2018	2019	2020	2018-2020	2018	2019	2020	2018-2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Maj	16,4	11,7	11,0	9,8	7,0	5,2	23,0	16,5	16,8	5,9	1,6	1,5	43,1	98,3	66,7	9	17	14
Czerwiec	18,4	21,2	16,9	13,1	14,7	12,1	23,6	27,7	21,7	10,0	8,7	10,1	70,1	14,1	195,7	14	5	16
Lipiec	20,1	19,3	18,2	14,1	12,7	12,2	26,2	25,8	24,2	10,5	7,2	10,6	80,7	91,9	87,9	11	10	13
Sierpień	21,0	20,1	19,8	14,1	13,9	13,8	27,9	26,3	25,8	11,0	9,5	11,9	37,5	93,6	88,6	11	11	12
Wrzesień	15,7	14,3	15,4	9,5	8,9	9,7	21,9	19,6	21,1	6,6	4,1	7,7	46,9	66,4	126,0	11	10	7
Październik	10,5	10,9	10,3	4,7	5,3	6,9	16,3	16,4	13,8	-1,0	0,8	3,0	48,0	30,1	156,8	12	9	17
Średnia (suma) V-X	17,0	16,3	15,3	10,9	10,4	10,0	23,2	22,1	20,5	7,2	5,3	7,5	326,3	394,4	721,7	68	62	79
Suma temperatur efektywnych (1.05-30.09)	2803 °C (2018), 2649 °C (2019), 2489 °C (2020)												04.05. – 1,6 °C, 08.05. – 1,6 °C, 13.05. – 2,6 °C, 16.05. – 1,6 °C, 22.05. – 1,1 °C (2020) – Przymrozki przygruntowe					

**Tab. 142. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion dt/ha przy 15% wilgotności (% wzorca).
Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.**

Lp	Odmiana	2020	2019*	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	44,2	30,7	30,7	37,5	35,2
1	Erica	90	73	98	82	87
2	Adessa	90	86	-	88	-
3	Antigua	99	85	-	92	-
4	Mayrika	91	84	108	88	94
5	Ambella	93	69	-	81	-
6	Abelina	100	99	90	100	96
7	Mavka	98	-	-	-	-
8	Amiata	108	-	-	-	-
9	Moravians	94	102	102	98	99
10	Nessie PZO	99	-	-	-	-
11	Obelix	99	97	105	98	100
12	Sirelia	LOZ	109	107	103	104
13	SG Anser	99	88	92	94	93
14	Favorit	90	-	-	-	-
15	Aligator	93	89	105	91	96
16	ES Comandor	LOZ	108	104	111	108
17	Regina	LOZ	102	104	102	102
18	Viola	LOZ	98	105	109	107
19	Aurelina	96	103	-	100	-
20	ES Governor	105	-	-	-	-
21	Acardia	LOZ	120	119	116	117
22	Achillea	LOZ	107	-	116	-
23	Albiensis	LOZ	115	-	114	-
24	Brunensis	108	101	104	105	104
25	RGT Salsa	103	-	-	-	-
26	RGT Sphinx	104	-	-	-	-
27	Petrina	LOZ	108	108	102	104
28	Kofu	LOZ	121	101	110	107
29	Naya	100	102	101	101	101
30	Bettina	LOZ	121	-	115	-
31	Tertia	LOZ	117	-	114	-
32	Kapral	96	-	-	-	-
33	Pompei	81	-	-	-	-
34	NS Mercury	89	-	-	-	-
Liczba doświadczeń		2	3	2	5	7

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian

* -dane z Głubczyc

Lista Odmian Zalecanych

ACARDIA, ACHILLEA, ALBIENSIS, BETTINA, ES COMANDOR, KOFU, PETRINA, REGINA, SIRELIA, TERTIA, VIOLA

Odmiana Moravians w latach 2019-2020 na LOZ

Tab. 143. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion dt/ha w miejscowościach przy 15% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Głubczyce						Łosiów						Tarnów Śląski	
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2020		
Wzorzec dt/ha		47,0	42,7	38,4	44,9	42,7	41,3	24,0	29,4	32,7	31,6	46,9			
1	Erica	95	71	95	83	87	85	91	100	88	92	90			
2	Adessa	89	89	-	89	-	91	96	-	94	-	93			
3	Antigua	99	91	-	95	-	99	94	-	97	-	76			
4	Mayrika	97	87	107	92	97	85	87	-	86	86	88			
5	Ambella	96	73	-	85	-	89	81	-	85	-	91			
6	Abelina	108	101	88	105	99	92	106	92	99	97	92			
7	Mavka	96	-	80	-	-	99	-	-	-	-	86			
8	Amiata	115	-	-	-	-	101	-	-	-	-	112			
9	Moravians	90	91	104	91	95	97	109	100	103	102	97			
10	Nessie PZO	96	-	-	-	-	102	-	-	-	-	101			
11	Obelix	107	100	109	104	105	90	87	100	89	92	106			
12	Sirelia	103	100	111	102	105	88	99	102	94	96	94			
13	SG Anser	99	87	84	93	90	98	104	100	101	101	95			
14	Favorit	89	-	-	-	-	90	-	-	-	-	91			
15	Aligator	96	87	94	92	92	89	97	116	93	101	99			
16	ES Comandor	115	106	103	111	108	110	117	105	114	111	113			
17	Regina	99	107	114	103	107	103	93	93	98	96	94			
18	Viola	89	108	113	99	103	148	97	96	123	114	100			
19	Aurelina	98	105	-	102	-	94	90	-	92	-	97			
20	ES Governor	107	-	-	-	-	103	-	-	-	-	99			
21	Acardia	112	120	121	116	118	109	130	117	120	119	113			
22	Achillea	110	100	-	105	-	137	105	-	121	-	112			
23	Albiensis	124	102	-	113	-	99	116	-	108	-	113			
24	Brunensis	92	107	113	100	104	123	97	94	110	105	104			
25	RGT Salsa	112	-	-	-	-	94	-	-	-	-	112			
26	RGT Sphinx	97	-	-	-	-	111	-	-	-	-	96			
27	Petrina	102	111	103	107	105	87	100	113	94	100	88			
28	Kofu	100	105	104	103	103	98	116	97	107	104	109			
29	Naya	97	109	104	103	103	102	75	97	89	91	105			
30	Bettina	115	107	-	111	-	103	120	-	112	-	112			
31	Tertia	111	112	-	112	-	109	112	-	111	-	119			
32	Kapral	100	-	-	-	-	91	-	-	-	-	104			
33	Pompei	71	-	-	-	-	90	-	-	-	-	98			
34	NS Mercury	78	-	-	-	-	99	-	-	-	-	98			

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 144. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion w miejscowościach przy 15% wilgotności (% wzorca). Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Głubczyce	Łosiów	Tarnów	Średnia
	Wzorzec dt/ha	47,0	41,3	46,9	45,1
1	Erica	95	85	90	90
2	Adessa	89	91	93	91
3	Antigua	99	99	76	91
4	Mayrika	97	85	88	90
5	Ambella	96	89	91	92
6	Abelina	108	92	92	97
7	Mavka	96	99	86	94
8	Amiata	115	101	112	109
9	Moravians	90	97	97	95
10	Nessie PZO	96	102	101	100
11	Obelix	107	90	106	101
12	Sirelia LOZ	103	88	94	95
13	SG Anser	99	98	95	97
14	Favorit	89	90	91	90
15	Aligator	96	89	99	95
16	ES Comandor LOZ	115	110	113	113
17	Regina LOZ	99	103	94	99
18	Viola LOZ	89	148	100	112
19	Aurelina	98	94	97	96
20	ES Governor	107	103	99	103
21	Acardia LOZ	112	109	113	111
22	Achillea LOZ	110	137	112	120
23	Albiensis LOZ	124	99	113	112
24	Brunensis	92	123	104	106
25	RGT Salsa	112	94	112	106
26	RGT Sphinx	97	111	96	101
27	Petrina LOZ	102	87	88	92
28	Kofu LOZ	100	98	109	102
29	Naya	97	102	105	101
30	Bettina LOZ	115	103	112	110
31	Tertia LOZ	111	109	119	113
32	Kapral	100	91	104	98
33	Pompei	71	90	98	86
34	NS Mercury	78	99	98	92

Wzorzec - średnia dla wszystkich badanych odmian

LOZ – Lista Odmian Zalecanych

Tab. 145. Soja. Doświadczenie odmianowe. Ważniejsze właściwości rolnicze. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp	Odmiana	Wilgotność nasion %		Ilość wysiewu kg/ha		Liczba roślin szt/m ²		Wysokość roślin cm		Wyleganie przed zbiorem sk. 9°		Wysokość osadzenia najniższego strąka cm		MTN g	
		2020	2018- 2020	2020*	2018- 2020	2020*	2018- 2020	2020	2018- 2020	2020	2018- 2020	2020	2018- 2020	2020	2018- 2020
	Wzorzec	24,0	16,3	154,8	157,3	69	60	98	85	7,4	8,2	11	10	242,7	223,1
1	Erica	22,0	15,4	129,1	138,7	69	58	98	79	8,3	8,7	11	10	212,8	209
2	Adessa	25,2	-	141,3	-	67	-	90	-	6,7	-	9	-	214,1	-
3	Antigua	23,7	-	152,1	-	64	-	103	-	8,8	-	10	-	249,5	-
4	Mayrika	25,9	16,5	177,1	137,0	77	60	105	89	5,7	7,3	14	12	206,9	190,2
5	Ambella	22,3	-	135,8	-	73	-	80	-	8,3	-	10	-	215,6	-
6	Abelina	25,0	16,2	144,4	149,1	70	59	107	93	6,2	7,6	12	11	220,6	212,2
7	Mavka	22,6	-	150,4	-	72	-	106	-	6,8	-	11	-	244,9	-
8	Amiata	22,8	-	159,2	-	73	-	99	-	8,5	-	12	-	241,3	-
9	Moravians	21,8	15,5	191,6	180,5	62	59	97	89	7,0	8,2	10	10	232,7	223,4
10	Nessie PZO	21,6	-	145,0	-	62	-	97	-	7,5	-	12	-	244,7	-
11	Obelix	25,5	16,9	210,0	198,0	68	60	94	85	7,3	8,2	12	10	260,3	247,4
12	Sirelia	24,9	16,6	143,4	149,5	74	62	99	86	6,3	7,8	11	10	261,8	230,4
13	SG Anser	21,8	15,4	154,9	164,0	71	61	106	89	7,3	8,1	12	12	241,2	240
14	Favorit	23,1	-	117,4	-	63	-	98	-	7,0	-	11	-	248,8	-
15	Aligator	26,1	16,9	163,5	171,2	66	59	95	84	7,8	8,6	13	11	233,5	226,8
16	ES Comandor	20,9	15,8	167,4	167,1	66	57	93	84	7,3	8,0	12	11	234,0	214,9
17	Regina	19,8	15,0	162,1	165,0	73	60	89	79	7,0	8,2	10	9	257,0	236,1
18	Viola	20,8	15,2	98,2	106,1	59	56	99	86	7,3	8,1	9	9	236,3	206,8
19	Aurelina	25,1	-	152,0	-	73	-	101	-	8,0	-	12	-	248,2	-
20	ES Governor	25,7	-	159,2	-	67	-	85	-	8,0	-	10	-	239,9	-
21	Acardia	25,2	16,5	152,0	164,0	68	59	92	85	7,8	8,4	11	10	232,9	219,3
22	Achillea	21,6	-	159,2	-	66	-	86	-	7,8	-	12	-	243,7	-
23	Albiensis	20,4	-	238,0	-	73	-	100	-	7,3	-	13	-	274,6	-
24	Brunensis	25,0	17,1	168,2	181,4	73	61	103	89	7,0	8,3	11	10	258,2	227,1
25	RGT Salsa	25,3	-	144,6	-	74	-	102	-	7,8	-	11	-	230,5	-
26	RGT Sphinx	20,8	-	130,7	-	67	-	92	-	8,8	-	10	-	260,3	-
27	Petrina	24,8	16,7	140,7	141,6	62	59	98	82	6,2	7,8	11	10	242,0	219
28	Kofu	25,6	17,4	186,6	173,9	66	62	98	85	8,0	8,4	11	10	243,4	221,8
29	Naya	24,7	17,0	164,9	169,3	68	59	92	85	7,0	8,2	12	10	260,0	238,1
30	Bettina	23,2	-	152,6	-	70	-	99	-	7,8	-	12	-	249,9	-
31	Tertia	25,5	-	172,7	-	74	-	98	-	7,5	-	12	-	246,2	-
32	Kapral	27,1	-	146,9	-	71	-	111	-	7,2	-	12	-	258,3	-
33	Pompei	31,6	-	131,9	-	69	-	110	-	6,2	-	13	-	258,2	-
34	NS Mercury	27,5	-	120,9	-	67	-	107	-	6,5	-	13	-	249,8	-
Liczba doświadczeń		2	7	2	7	1	6	2	7	2	7	2	7	2	7

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian * dane z Głubczyc

Tab. 146. Soja. Doświadczenie odmianowe. Zawartość białka i tłuszczu (% s.m.). Plon białka i tłuszczu dt/ha (% wzorca).
Województwo opolskie. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Zawartość białka % s.m.			Zawartość tłuszczu % s.m.			Plon białka dt/ha			Plon tłuszczu dt/ha		
		G	Ł	Śr	G	Ł	Śr	G	Ł	Śr	G	Ł	Śr
	Wzorzec	44,4	45,3	44,9	17,3	20,2	18,7	20,9	18,7	19,8	8,1	8,3	8,2
1	Erica	44,6	48,6	46,6	15,8	20,2	18,0	95	91	93	87	85	87
2	Adessa	46,2	46,2	46,2	16,3	20,7	18,5	93	93	93	84	93	89
3	Antigua	42,2	46,3	44,3	18,5	21,3	19,9	94	101	98	106	104	105
4	Mayrika	43,4	46,8	45,1	17,3	21,4	19,4	95	88	91	97	90	94
5	Ambella	38,5	49,0	43,8	16,4	21,1	18,8	83	96	90	91	93	93
6	Abelina	44,5	42,8	43,6	20,1	21,0	20,5	108	87	97	125	96	110
7	Mavka	43,1	45,1	44,1	19,8	20,4	20,1	93	99	96	110	100	105
8	Amiata	43,8	45,9	44,8	16,2	20,0	18,1	113	102	108	108	100	105
9	Moravians	43,9	47,0	45,5	15,9	19,7	17,8	89	101	95	83	95	89
10	Nessie PZO	43,7	44,6	44,2	16,8	18,5	17,7	94	100	97	93	93	94
11	Obelix	42,6	44,8	43,7	17,7	18,8	18,3	103	89	96	109	84	96
12	Sirelia	45,1	45,1	45,1	19,0	17,5	18,3	105	88	96	113	76	93
13	SG Anser	45,1	47,3	46,2	17,3	20,3	18,8	101	102	101	99	98	99
14	Favorit	45,9	48,1	47,0	16,9	19,8	18,3	92	96	94	87	88	88
15	Aligator	42,3	44,7	43,5	17,8	20,5	19,2	91	88	90	99	90	95
16	ES Comandor	44,7	38,6	41,7	16,5	22,3	19,4	116	94	104	110	121	117
17	Regina	44,8	43,2	44,0	16,9	22,4	19,6	100	98	99	97	114	106
18	Viola	46,6	40,6	43,6	16,0	21,4	18,7	93	133	115	82	157	119
19	Aurelina	48,0	44,9	46,5	16,3	20,5	18,4	106	93	99	92	95	94
20	ES Governor	46,6	45,0	45,8	19,4	21,2	20,3	112	102	107	120	108	114
21	Acardia	42,8	42,7	42,8	20,0	20,7	20,3	108	103	105	129	112	120
22	Achillea	46,0	44,0	45,0	16,8	19,4	18,1	114	133	124	107	132	120
23	Albiensis	42,5	43,0	42,8	17,4	18,4	17,9	119	94	106	125	90	107
24	Brunensis	44,9	46,2	45,6	17,0	19,2	18,1	93	125	109	90	117	104
25	RGT Salsa	44,0	46,5	45,3	18,9	19,1	19,0	111	96	104	122	89	105
26	RGT Sphinx	47,5	45,1	46,3	15,8	19,3	17,5	104	111	107	89	106	97
27	Petrina	44,4	46,8	45,6	16,6	20,7	18,6	102	90	96	98	89	94
28	Kofu	42,6	47,8	45,2	16,5	19,5	18,0	96	103	100	95	95	95
29	Naya	44,2	45,1	44,6	17,2	21,1	19,2	97	102	99	96	107	102
30	Bettina	44,1	44,7	44,4	17,7	20,4	19,1	114	102	108	118	104	111
31	Tertia	48,0	46,3	47,1	19,0	20,3	19,7	120	111	115	122	110	116
32	Kapral	45,3	46,4	45,9	16,9	20,0	18,5	102	93	98	98	90	94
33	Pompei	45,4	48,2	46,8	15,1	20,0	17,6	73	96	84	62	89	76
34	NS Mercury	43,0	42,3	42,7	16,0	18,7	17,3	76	92	84	72	92	82

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian G – Głubczyce, Ł – Łosiów;

Tab. 147. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion dt/ha przy 15% wilgotności (% wzorca) i ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp.	Odmiana	Plon nasion dt/ha				Wilgotność nasion %				Ilość wysiewu kg/ha			
		2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020	2020	2019	2018	2019	2020	2019- 2020	2018- 2020
	Wzorzec	47,0	42,7	38,4	44,9	42,7	22,3	15,4	10,0	18,9	15,9	155	161
1	Erica	95	71	95	83	87	14,6	15,5	8,3	15,1	12,8	129	136
2	Adessa	89	89	-	89	-	22,1	14,9	-	18,5	-	141	-
3	Antigua	99	91	-	95	-	22,6	14,8	-	18,7	-	152	160
4	Mayrika	97	87	107	92	97	22,5	14,6	8,4	18,6	15,2	177	119
5	Ambella	96	73	-	85	-	15,2	15,3	-	15,2	-	136	-
6	Abelina	108	101	88	105	99	22,4	14,5	9,0	18,4	15,3	144	145
7	Mavka	96	-	80	-	-	22,2	-	9,5	-	15,9	150	162
8	Amiata	115	-	-	-	-	22,1	-	-	-	-	159	-
9	Moravians	90	91	104	91	95	20,2	15,9	9,7	18,1	15,3	192	198
10	Nessie PZO	96	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	145	-
11	Obelix	107	100	109	104	105	23,2	15,3	10,8	19,2	16,4	210	214
12	Sirelia	103	100	111	102	105	21,3	15,0	10,8	18,2	15,7	143	143
13	SG Anser	99	87	84	93	90	22,6	15,6	9,3	19,1	15,8	155	156
14	Favorit	89	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-	117	-
15	Aligator	96	87	94	92	92	24,0	15,5	9,5	19,8	16,3	163	198
16	ES Comandor	115	106	103	111	108	21,0	15,3	11,2	18,2	15,8	167	173
17	Regina	99	107	114	103	107	21,8	15,8	10,9	18,8	16,2	162	203
18	Viola	89	108	113	99	103	22,4	14,5	10,8	18,5	15,9	98	124
19	Aurelina	98	105	-	102	-	22,4	14,9	-	18,7	-	152	-
20	ES Governor	107	-	-	-	-	23,6	-	-	-	-	159	-
21	Acardia	112	120	121	116	118	22,1	15,3	9,6	18,7	15,7	152	179
22	Achillea	110	100	-	105	-	23,3	15,5	-	19,4	-	159	-
23	Albiensis	124	102	-	113	-	20,4	15,5	-	18,0	-	238	-
24	Brunensis	92	107	113	100	104	21,8	16,0	11,5	18,9	16,4	168	203
25	RGT Salsa	112	-	-	-	-	22,0	-	-	-	-	145	-
26	RGT Sphinx	97	-	-	-	-	22,0	-	-	-	-	131	-
27	Petrina	102	111	103	107	105	21,7	15,7	9,6	18,7	15,7	141	118
28	Kofu	100	105	104	103	103	23,1	15,5	9,9	19,3	16,2	187	191
29	Nava	97	109	104	103	103	22,2	15,7	10,3	19,0	16,1	165	174
30	Bettina	115	107	-	111	-	22,0	15,6	-	18,8	-	153	-
31	Tertia	111	112	-	112	-	22,9	18,4	-	20,6	-	173	170
32	Kapral	100	-	-	-	-	24,8	-	-	-	-	147	-
33	Pompei	71	-	-	-	-	33,7	-	-	-	-	132	-
34	NS Mercury	78	-	-	-	-	27,0	-	-	-	-	121	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 148. Soja. Doświadczenie odmianowe. Ważniejsze właściwości rolnicze. Zawartość białka i tłuszczu (% s.m.), Plon białka i tłuszczu dt/ha (% wzorca). Głęboczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp	Odmiana	Liczba roślin szt/m ²					Wysokość roślin cm					Wyleganie przed zbiorem sk. 9 ^o					Wysokość osadzenia najniższego strąka cm				
		2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020	2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020	2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020	2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020
		Wzorzec dt/ha	69	62	71	65	67	100	63	78	82	80	5,7	9,0	7,8	7,4	7,5	13	10	11	11
1	Erica	69	60	65	64	65	65	95	59	68	77	74	7,7	9,0	8,7	8,3	8,5	12	9	11	11
2	Adessa	67	59	-	63	-	-	98	53	-	76	-	4,3	9,0	-	6,7	-	9	9	-	-
3	Antigua	64	61	-	62	-	-	104	54	-	79	-	8,7	9,0	-	8,8	-	11	9	-	10
4	Mayrika	77	54	63	66	65	65	117	70	88	94	92	2,3	9,0	6,3	5,7	5,9	17	11	15	14
5	Ambella	73	60	-	66	-	-	84	50	-	67	-	7,7	9,0	-	8,3	-	9	9	-	9
6	Abelina	70	61	68	65	66	66	119	80	80	99	93	3,3	8,7	7,3	6,0	6,4	15	13	13	14
7	Mavka	72	-	65	-	-	-	111	-	97	111	104	4,7	-	5,7	4,7	5,2	12	-	13	-
8	Amiata	73	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	14	-	-	-
9	Moravians	62	67	70	65	66	66	98	70	85	84	84	5,0	9,0	8,0	7,0	7,3	11	9	12	10
10	Nessie PZO	62	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	13	-	-	-
11	Obelix	68	63	65	66	65	65	100	60	78	80	79	5,7	9,0	8,0	7,3	7,6	14	11	12	13
12	Sirelia	74	56	79	65	70	70	107	63	75	85	82	3,7	8,7	8,3	6,2	6,9	11	9	11	10
13	SG Anser	71	60	72	65	68	68	109	70	82	89	87	5,7	8,7	8,0	7,2	7,5	14	13	14	14
14	Favorit	63	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	13	-	-	-
15	Aligator	66	59	68	62	64	64	97	62	81	79	80	6,7	9,0	9,0	7,8	8,2	14	11	12	13
16	ES Comandor	66	61	61	64	63	63	91	68	82	79	80	5,7	9,0	7,7	7,3	7,5	14	12	10	13
17	Regina	73	67	65	70	68	68	92	57	75	75	75	5,0	9,0	8,7	7,0	7,6	10	9	10	9
18	Viola	59	59	69	59	62	62	103	65	76	84	81	5,7	9,0	8,0	7,3	7,6	10	9	10	9
19	Aurelina	73	65	-	69	-	-	105	60	-	82	-	7,0	9,0	-	8,0	-	14	11	-	12
20	ES Governor	67	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	12	-	-	-
21	Acardia	68	58	72	63	66	66	96	61	80	79	79	6,7	9,0	8,0	7,8	7,9	14	12	12	13
22	Achillea	66	67	-	67	-	-	85	60	-	73	-	6,7	9,0	-	7,8	-	14	10	-	12
23	Albiensis	73	52	-	62	-	-	101	70	-	85	-	5,7	8,7	-	7,2	-	16	12	-	14
24	Brunensis	73	52	76	63	67	67	102	69	84	86	85	5,0	9,0	9,0	7,0	7,7	12	10	11	11
25	RGT Salsa	74	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	12	-	-	-
26	RGT Sphinx	67	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	11	-	-	-
27	Petrina	62	65	72	64	66	66	107	60	75	83	81	3,3	9,0	9,0	6,2	7,1	12	11	10	12
28	Kofu	66	72	79	69	72	72	99	64	78	82	80	7,0	9,0	8,0	8,0	8,0	12	10	12	11
29	Naya	68	62	67	65	66	66	91	64	73	77	76	5,0	9,0	9,0	7,0	7,7	14	9	10	11
30	Bettina	70	71	-	71	-	-	101	69	-	85	-	6,7	9,0	-	7,8	-	13	10	-	11
31	Tertia	74	81	-	78	-	-	95	76	-	86	-	6,0	9,0	-	7,5	-	14	13	-	13
32	Kapral	71	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	13	-	-	-
33	Pompei	69	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	16	-	-	-
34	NS Mercury	67	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	15	-	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 149. Soja. Doświadczenie odmianowe. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Lp	Odmiana	Liczba strąków na 1 roślinie szt.				MTN g				Osypywanie sk. 9°				Zawartość białka % s.m.	Zawartość tłuszczu % s.m.	Plon białka dt/ha	Plon tłuszczu dt/ha		
		2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020	2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020								
												2020							
Wzorzec		23	21	18	22	21	267,6	243,0	218,6	255,3	243,1	8,9	8,9	8,8	8,9	44,4	17,3	20,9	8,1
1	Erica	20	18	17	20	18	206,6	226,0	212,0	216,3	214,9	9,0	8,7	9,0	8,9	44,6	15,8	95	87
2	Adessa	23	21	-	23	21	224,2	238,0	-	231,1	-	9,0	9,0	-	8,9	46,2	16,3	93	84
3	Antigua	22	22	-	22	22	286,0	237,0	-	261,5	-	9,0	9,0	-	9,0	42,2	18,5	94	106
4	Mayrika	25	23	21	25	23	225,8	181,0	177,0	203,4	194,6	9,0	9,0	9,0	9,0	43,4	17,3	95	97
5	Ambella	19	18	-	19	18	216,2	232,0	-	224,1	-	9,0	9,0	-	9,0	38,5	16,4	83	91
6	Abelina	22	21	19	22	21	241,2	225,0	220,0	233,1	228,7	9,0	9,0	9,0	9,0	44,5	20,1	108	125
7	Mavka	21	-	20	21	-	258,7	-	234,0	-	246,4	9,0	-	9,0	-	43,1	19,8	93	110
8	Amiata	21	-	-	21	-	273,6	-	-	-	-	9,0	-	-	-	43,8	16,2	113	108
9	Moravians	20	17	18	20	17	278,3	253,0	229,0	265,7	253,4	8,7	9,0	9,0	8,9	43,9	15,9	89	83
10	Nessie	21	-	-	21	-	261,4	-	-	-	-	9,0	-	-	-	43,7	16,8	94	93
11	Obelix	22	21	17	22	21	313,6	300,0	266,0	306,8	293,2	9,0	9,0	9,0	8,9	42,6	17,7	103	109
12	Sirella	25	24	16	25	24	294,6	238,0	217,0	266,3	249,9	9,0	9,0	9,0	8,8	45,1	19	105	113
13	SG Anser	21	18	15	21	18	262,4	275,0	282,0	268,7	273,1	8,7	8,7	8,3	8,8	45,1	17,3	101	99
14	Favorit	21	-	-	21	-	277,5	-	-	-	-	9,0	-	-	-	45,9	16,9	92	87
15	Aligator	22	20	16	22	20	262,9	259,0	225,0	261,0	249,0	9,0	9,0	8,0	9,0	42,3	17,8	91	99
16	ES	24	22	18	24	22	272,9	245,0	212,0	259,0	243,3	9,0	9,0	9,0	8,9	44,7	16,5	116	110
17	Regina	25	25	19	25	25	277,9	274,0	223,0	276,0	258,3	9,0	9,0	9,0	8,9	44,8	16,9	100	97
18	Viola	26	23	19	26	23	247,5	204,0	180,0	225,8	210,5	9,0	9,0	9,0	9,0	46,6	16	93	82
19	Aurelina	24	21	-	24	21	289,4	254,0	-	271,7	-	9,0	9,0	-	9,0	48	16,3	106	92
20	ES	22	-	-	22	-	259,7	-	-	-	-	9,0	-	-	-	46,6	19,4	112	120
21	Acardia	26	25	16	26	25	265,8	241,0	214,0	253,4	240,3	9,0	9,0	9,0	9,0	42,8	20	108	129
22	Achillea	21	20	-	21	20	261,3	250,0	-	255,7	-	9,0	8,7	-	8,9	46	16,8	114	107
23	Albiensis	22	21	-	22	21	327,1	292,0	-	309,6	-	9,0	9,0	-	9,0	42,5	17,4	119	125
24	Brunensis	24	23	18	24	23	278,4	244,0	205,0	261,2	242,5	9,0	9,0	9,0	9,0	44,9	17	93	90
25	RGT Salsa	22	-	-	22	-	257,0	-	-	-	-	9,0	-	-	-	44	18,9	111	122
26	RGT Sphinx	23	-	-	23	-	286,5	-	-	-	-	8,7	-	-	-	47,5	15,8	104	89
27	Petrina	24	22	20	24	22	268,0	240,0	200,0	254,0	236,0	8,7	9,0	8,7	8,9	44,4	16,6	102	98
28	Kofu	23	20	19	23	20	259,8	234,0	225,0	246,9	239,6	9,0	9,0	8,7	9,0	42,6	16,5	96	95
29	Naya	21	18	16	21	18	281,0	259,0	248,0	270,0	262,7	8,7	9,0	8,7	8,8	44,2	17,2	97	96
30	Bettina	22	20	-	22	20	262,7	238,0	-	250,4	-	8,7	8,7	-	8,8	44,1	17,7	114	118
31	Tertia	26	25	-	26	25	276,4	250,0	-	263,2	-	8,7	9,0	-	8,8	48	19	120	122
32	Kapral	22	-	-	22	-	297,6	-	-	-	-	8,7	-	-	-	45,3	16,9	102	98
33	Pompei	23	-	-	23	-	287,4	-	-	-	-	9,0	-	-	-	45,4	15,1	73	62
34	NS	22	-	-	22	-	259,5	-	-	-	-	8,7	-	-	-	43	16	76	72

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 150. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Plon nasion przy 15% wilgotności dt/ha (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Gęstość siewu	Plon nasion dt/ha													
	30 szt/m ²				45 szt/m ²				60 szt/m ²					
	2020	2019	2018	2018-2020	2020	2019	2018	2018-2020	2020	2019	2018	2018-2020	2019	2018
Wzorzec dt/ha	36,2	27,3	28,1	30,5	41,2	31,8	28,3	33,8	43,3	34,5	28,6	35,5		
Moravians	96	-	-	-	84	-	-	-	87	-	-	-	-	-
Sirelia	104	-	-	-	111	-	-	-	112	-	-	-	-	-
SG Anser	91	107	93	97	93	100	91	95	97	101	98	99		
ES Comandor	96	-	-	-	103	-	-	-	94	-	-	-	-	-
Regina	73	-	-	-	78	-	-	-	91	-	-	-	-	-
Acordia	132	-	-	-	120	-	-	-	108	-	-	-	-	-
Albiensis	110	-	-	-	115	-	-	-	104	-	-	-	-	-
Petrina	85	-	-	-	85	-	-	-	94	-	-	-	-	-
Kofu	116	-	-	-	113	-	-	-	116	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń	2	2	2	6	2	2	2	4	2	2	2	6		

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 151. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Plon nasion przy 15% wilgotności dt/ha (% wzorca). Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Odmiana	Plon nasion dt/ha													
	30 szt/m ²				45 szt/m ²				60 szt/m ²					
	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2019	2018-2020
Wzorzec dt/ha	43,7	37,9	28,7	23,1	49,1	41,6	33,2	25,9	48,8	41,5	37,8	29,4		
Moravians	101	-	90	-	84	-	84	-	91	-	82	-	-	-
Sirelia	94	-	113	-	97	-	125	-	93	-	130	-	-	-
SG Anser	88	95	93	98	90	93	96	96	94	96	99	100		
ES Comandor	89	-	102	-	100	-	105	-	98	-	90	-	-	-
Regina	89	-	57	-	97	-	59	-	104	-	77	-	-	-
Acordia	109	-	155	-	111	-	128	-	111	-	104	-	-	-
Albiensis	124	-	96	-	121	-	109	-	114	-	94	-	-	-
Petrina	94	-	75	-	92	-	77	-	94	-	94	-	-	-
Kofu	113	-	119	-	108	-	118	-	101	-	131	-	-	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 152. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020

Odmiana	Wilgotność %										MTN G									
	Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów	
Gęstość siewu	30 szt/m ²		45 szt/m ²		60 szt/m ²		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów	
	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec	22,8	16,3	23,8	17,1	22,7	16,0	24,9	17,4	22,3	15,8	24,3	17,3	230,5	217,2	202,7	184,9	235,5	217,5	200,3	185,4
Moravians	21,7	-	27,9	-	23,3	-	28,3	-	23,2	-	24,6	-	220,3	-	200,0	-	221,6	-	190,0	-
Sirelia	23,6	-	27,0	-	24,2	-	24,0	-	23,6	-	22,6	-	216,8	-	203,0	-	208,9	-	223,0	-
SG Anser	23,6	16,3	24,6	-	23,2	16,1	25,0	-	23,1	16,2	23,6	-	244,8	246,9	205,0	-	239,4	238,1	207,0	-
ES	22,4	-	22,4	-	22,7	-	27,6	-	22,1	-	22,4	-	210,1	-	189,0	-	232,9	-	177,0	-
Comandor	23,1	-	22,7	-	22,9	-	24,1	-	21,7	-	27,3	-	230,6	-	207,0	-	242,7	-	214,0	-
Regina	23,4	-	20,3	-	22,4	-	27,2	-	23,3	-	29,3	-	253,3	-	230,0	-	265,3	-	184,0	-
Acardia	21,7	-	26,0	-	21,2	-	22,9	-	21,0	-	20,6	-	218,0	-	191,0	-	244,0	-	208,0	-
Albionis	22,8	-	21,4	-	20,8	-	21,4	-	19,2	-	24,6	-	244,7	-	174,0	-	228,6	-	188,0	-
Petrina	23,1	-	21,8	-	23,6	-	23,6	-	23,7	-	23,9	-	235,5	-	225,0	-	236,4	-	212,0	-
Kofu	23,1	-	21,8	-	23,6	-	23,6	-	23,7	-	23,9	-	235,5	-	225,0	-	236,4	-	212,0	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 153. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Odmiana	Liczba roślin szt/m ²										Wysokość roślin cm									
	Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów	
Gęstość siewu	30 szt/m ²		45 szt/m ²		60 szt/m ²		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów		Głubczyce		Łosiów	
	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec	30	29	30	32	45	42	44	37	59	55	59	51	93	76	95	86	97	77	92	86
Moravians	28	-	27	-	40	-	41	-	59	-	60	-	93	-	93	-	94	-	98	-
Sirelia	30	-	31	-	46	-	44	-	61	-	60	-	101	-	91	-	102	-	97	-
SG Anser	29	28	28	-	46	43	46	-	60	53	61	-	77	73	107	-	81	72	102	-
ES	30	-	29	-	46	-	45	-	56	-	57	-	74	-	90	-	83	-	90	-
Comandor	31	-	32	-	48	-	45	-	58	-	59	-	101	-	85	-	90	-	85	-
Regina	30	-	32	-	45	-	44	-	58	-	59	-	95	-	93	-	104	-	85	-
Acardia	32	-	32	-	44	-	45	-	61	-	60	-	102	-	98	-	108	-	85	-
Albionis	29	-	30	-	44	-	45	-	57	-	59	-	87	-	93	-	98	-	91	-
Petrina	30	-	29	-	45	-	45	-	57	-	59	-	106	-	101	-	111	-	96	-
Kofu	30	-	29	-	45	-	45	-	57	-	59	-	106	-	101	-	111	-	96	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

Tab. 154. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głęboczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

Odmiana	Wyleganie przed zbiorem skala 9 ^e						Wysokość osadzenia najniższego strąka cm											
	Głęboczyce			Łosiów			Głęboczyce			Łosiów			Głęboczyce			Łosiów		
	30 szt/m ²			45 szt/m ²			60 szt/m ²			30 szt/m ²			45 szt/m ²			60 szt/m ²		
	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020	2020	2018-2020
Wzorzec	8,9	8,6	9,0	9,0	8,2	8,4	8,2	8,0	9,0	8,3	8,2	9,0	8,2	8,0	9,0	8,2	8,0	9,0
Moravians	9,0	-	9,0	-	8,0	-	8,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-
Sirelia	8,0	-	9,0	-	7,0	-	8,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-
SG Anser	9,0	8,7	9,0	-	9,0	8,6	9,0	8,8	9,0	-	9,0	8,8	9,0	9	11	12	10	11
ES	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-
Comandor	9,0	-	9,0	-	8,0	-	8,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-
Regina	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-
Acordia	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-	9,0	-
Albensis	9,0	-	9,0	-	8,0	-	8,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-
Petrina	9,0	-	9,0	-	7,0	-	8,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-
Kofu	9,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-	8,0	-

Wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian

SOJA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

Lp.	ODMIANA	ROK WPISANIA DO KR	ROK WPISANIA NA ŁOŻ	PLON NASION % WZORCA 2018-2020
1	ACARDIA	CCA	2020	117
2	ACHILLEA	CCA	2021	116*
3	ALBIENSIS	CCA	2021	114*
4	BETTINA	CCA	2021	115*
5	ES COMANDOR	2018	2021	108
6	KOFU	CCA	2020	107
7	PETRINA	2017	2019	104
8	REGINA	2018	2020	102
9	SIRELIA	CCA	2019	104
10	TERTIA	CCA	2021	114*
11	VIOLA	2018	2021	107

KR – Krajowy Rejestr Odmian

CCA – Wspólnotowy Katalog Odmian

wzorzec – średnia dla wszystkich badanych odmian dla plonu nasion 35,2 dt/ha

*-dla odmian Achillea, Albiensis, Bettina, Tertia wzorzec z lat 2019-2020 roku (37,5 dt/ha)

DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE ODMIAN Z KATALOGU UE (CCA)

1. PSZENICA OZIMA

W latach 2018-2020 badano 3, w latach 2019-2020 6, a w ostatnim roku 17 odmian. Do wyżej plonujących należały RGT Reform i RGT Sacramento. Na intensywnym poziomie agrotechniki w 2020 roku uzyskano średnio wyższą gęstość zsypaną ziarna (nieznacznie), zawartość białka, ilość glutenu i wskaźnik sedymentacji.

Tab. 155. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) na dwóch poziomach agrotechniki. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.

L.p.	Odmiana	Poziom a ₁					Poziom a ₂				
		2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020	2020	2019	2018	2019-2020	2018-2020
	Wzorzec dt/ha	97,9	98,6	88,3	98,3	94,9	113,1	107,2	121,5	110,1	113,9
1	RGT Sacramento	101	102	-	102	-	98	101	-	99	-
2	Activus	89	-	-	-	-	95	-	-	-	-
3	Andromede CS	98	-	-	-	-	93	-	-	-	-
4	Findus	95	96	-	96	-	95	96	-	96	-
5	Galerist	97	89	95	93	94	98	92	102	95	97
6	Montecristo CS	97	-	-	-	-	96	-	-	-	-
7	Ponticus	91	94	92	93	92	89	93	102	91	95
8	RGT Provision	102	-	-	-	-	99	-	-	-	-
9	RGT Depot	100	101	-	100	-	97	103	-	100	-
10	RGT Reform	103	103	94	103	100	102	102	93	102	99
11	Solindo CS	97	-	-	-	-	101	-	-	-	-
12	SY Koniko	83	-	-	-	-	96	-	-	-	-
13	SY Landrich	98	-	-	-	-	97	-	-	-	-
14	BAUB 14.3009	98	-	-	-	-	101	-	-	-	-
15	Emotion	87	-	-	-	-	96	-	-	-	-
16	Foxx	99	-	-	-	-	95	-	-	-	-
17	Julie	98	-	-	-	-	101	-	-	-	-

Wzorzec: 2020: Artist, RGT Kilimanjaro, Formacja, Wenecja
 2019: Patras, Artist, RGT Kilimanjaro, Formacja
 2018: Patras, Artist, RGT Kilimanjaro, Formacja
 a₁-przecietny, a₂-intensywny poziom agrotechniki

Tab. 156. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu.
Wyniki analiz jakościowych na przeciętnym – a1 i intensywnym poziomie agrotechniki – a2.
Głęboczyce. Rok zbioru 2020.

Lp.	Odmiana	Gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)		Zawartość białka (% s.m.)		Ilość glutenu (%)		Wskaźnik sedimentacji (ml)		Liczba opadania (sek.)	
		a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂	a ₁	a ₂
Wzorzec		71,9	72,2	12,4	13,1	20,8	22,8	44	50	276	274
1	RGT Sacramento	74,0	73,4	13,7	13,7	25,1	25,2	54	60	74	73
2	Activus	67,9	68,1	12,7	13,2	20,4	20,9	47	53	173	219
3	Andromede CS	73,7	74,5	12,9	13,0	24,2	23,1	65	66	273	306
4	Findus	70,8	72,0	12,3	13,4	22,3	24,3	46	49	220	241
5	Galerist	71,9	72,7	11,7	12,0	17,8	19,6	32	44	288	244
6	Montecristo CS	71,6	73,6	12,7	13,9	26,7	28,6	55	59	390	426
7	Ponticus	73,6	73,3	11,5	12,7	18,9	22,3	39	46	186	174
8	RGT Provision	70,1	70,2	11,9	12,6	19,0	24,2	39	44	325	296
9	RGT Depot	74,0	74,1	11,2	11,7	18,3	20,9	41	53	261	286
10	RGT Reform	71,3	71,6	11,4	12,0	18,1	20,1	30	31	348	264
11	Solindo CS	72,9	73,6	12,3	12,6	22,3	22,9	44	47	303	282
12	SY Koniko	72,8	72,8	13,6	13,8	23,4	24,3	56	64	358	312
13	SY Landrich	71,7	71,9	12,6	13,2	20,3	23,2	38	40	257	323
14	BAUB 14.3009	68,9	70,3	11,9	13,7	18,8	21,8	39	43	363	326
15	Emotion	74,8	74,5	13,8	14,3	20,0	22,0	38	46	292	279
16	Foxx	70,0	68,9	12,0	13,0	19,5	23,9	34	42	371	397
17	Julie	73,2	73,0	12,4	13,3	19,0	20,1	49	59	202	206

Wzorzec – średnia dla wszystkich odmian

2. RZEPAK OZIMY

W latach 2018-2020 badano 23, w latach 2019-2020 33, a w ostatnim roku 74 odmiany. Do wyżej plonujących w 3-leciu należały odmiany DK Exterrier, Umberto KWS i Architect, w latach 2019-2020 DK Exima, DK Exterrier, Amazzonite i ES Amadeo, a w ostatnim roku Espri CS, Architect, Cadran i Azarite.

**Tab. 157. Rzepak ozimy. Plon ziarna przy 9 % wilgotności (% wzorca)
na przeciętnym poziomie agrotechniki. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020.**

L.p.	Odmiana	2020	2019	2018	2019- 2020	2018- 2020
Wzorzec dt/ha		49,3	33,6	56,9	41,4	46,6
1	ES Valegro	85	89	88	87	87
2	SY Ilona	90	82	96	86	89
3	Arabella	84	90	77	87	84
4	Butterfly	91	83	71	87	82
5	Campus	96	-	-	-	-
6	Darcy	87	-	-	-	-
7	Django	93	-	-	-	-
8	Finley	93	-	-	-	-
9	Jeremy	96	103	62	100	87
10	Marley	91	-	-	-	-
11	Randy	91	115	67	103	91
12	Skye	95	-	-	-	-
13	Stanley	101	85	61	93	82
14	Architect F ₁	115	112	108	114	112
15	Duke F ₁	110	-	-	-	-
16	Abundi CS F ₁	110	-	-	-	-
17	Agostino KWS F ₁	113	-	-	-	-
18	Amazzonite F ₁	113	122	-	118	-
19	Aquila F ₁	102	-	-	-	-
20	Armani F ₁	99	-	-	-	-
21	Avignon F ₁	94	-	-	-	-
22	Azurite F ₁	114	-	-	-	-
23	Batis F ₁	110	-	-	-	-
24	Cadran F ₁	115	-	-	-	-
25	Celebriti CS F ₁	109	-	-	-	-
26	Clarus F ₁	89	-	-	-	-
27	Crome F ₁	97	119	-	108	-
28	Cuzzco F ₁	99	128	-	114	-
29	Dazzler F ₁	106	-	-	-	-
30	DK Exima F ₁	110	136	-	123	-
31	DK Expat F ₁	110	-	-	-	-
32	DK Extenso F ₁	106	113	99	110	106
33	DK Exterrier F ₁	106	132	110	119	116
34	DK Extime F ₁	111	111	102	111	108
35	DMH 365 F ₁	95	-	-	-	-
36	Donut F ₁	100	-	-	-	-
37	Ermino KWS F ₁	108	105	105	106	106
38	ES Amadeo F ₁	113	123	-	118	-
39	ES Azurio F ₁	102	-	-	-	-
40	ES Capello F ₁	108	121	-	114	-
41	ES Navigo F ₁	101	-	-	-	-
42	ES Vito F ₁	108	106	105	107	106
43	Espri CS F ₁	121	-	-	-	-
44	Factor KWS F ₁	95	-	-	-	-
45	Feliciano KWS F ₁	112	-	-	-	-
46	George F ₁	88	-	-	-	-
47	INV1024 F ₁	102	117	104	110	108
48	INV1120 F ₁	110	114	96	112	107
49	INV1130 F ₁	102	-	-	-	-

50	INV1170	F ₁	113	-	-	-	-
51	Miranda	F ₁	103	-	-	-	-
52	Pantheon	F ₁	99	102	105	100	102
53	Parcours	F ₁	106	-	-	-	-
54	President	F ₁	88	91	70	90	83
55	PT264	F ₁	101	76	80	88	86
56	PT271	F ₁	91	124	75	108	97
57	PT274	F ₁	102	96	-	99	-
58	PT275	F ₁	99	92	-	96	-
59	X15WT906C	F ₁	101	-	-	-	-
60	RGT Gazetta	F ₁	113	112	99	112	108
61	RGT Jacuzzi	F ₁	108	108	106	108	107
62	RGT Quizz	F ₁	110	-	-	-	-
63	Schiller	F ₁	96	-	-	-	-
64	Shield	F ₁	101	115	-	108	-
65	Simona	F ₁	107	-	-	-	-
66	SY Algo	F ₁	99	-	-	-	-
67	SY Julietta	F ₁	89	-	-	-	-
68	SY Loyd	F ₁	97	-	-	-	-
69	SY Matteo	F ₁	107	-	-	-	-
70	Temptation	F ₁	108	-	-	-	-
71	Umberto KWS	F ₁	111	117	114	114	114
72	PX126 p	F ₁	88	90	83	89	87
73	PX128 p	F ₁	95	89	-	92	-
74	PX131 p	F ₁	95	-	-	-	-

Wzorzec –2020: ES Valegro, SY Ilona, Architect F₁, Duke F₁
2019: ES Valegro, SY Ilona, DK Expiro F₁, Architect F₁
2018: ES Valegro, SY Ilona, DK Expiro F₁, Architect F₁
F₁ – odmiana mieszańcowa, p – odmiana półkarłowa

SPIS TABEL

- Tab.1. Realizacja doświadczeń PDO w województwie opolskim w sezonie 2019/2020 **8**
- Tab. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w punktach doświadczalnych województwa opolskiego w roku 2020 i w wieloleciu (oC). **10**
- Tab. 3. Sumy miesięczne opadów w punktach doświadczalnych województwa opolskiego w roku 2020 i w wieloleciu (mm). **10**
- Tab. 4. Pszenica ozima. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **15**
- Tab. 5. Pszenica ozima. Pochodzenie odmian. **16**
- Tab. 6. Pszenica ozima. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **17**
- Tab. 7. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na dwóch poziomach agrotechniki. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **18**
- Tab. 8. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności w miejscowościach (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **19**
- Tab. 9. Pszenica ozima. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **20**
- Tab. 10. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian na dwóch poziomach agrotechniki. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020. **21**
- Tab. 11. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Rok zbioru 2020. **22**
- Tab. 12. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Rok zbioru 2020. **23**
- Tab. 13. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Rok zbioru 2020. **24**
- Tab. 14. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce, Bąków i Pągów. Lata zbioru 2019-2020. **26**
- Tab. 15. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce, Bąków i Pągów. Rok zbioru 2020. **27**
- Tab. 16. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Porównanie gęstości siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce i Pągów. Rok zbioru 2020. **28**
- Tab. 17. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych. Plon ziarna przy 14% wilgotności (dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2019-2020. **29**
- Tab. 18. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2019-2020. **30**
- Tab. 19. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych form nawozów azotowych. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020. **31**
- Tab. 20. Pszenica ozima. Przedplon pszenica ozima i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce i Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018 - 2020. **33**
- Tab. 21. Pszenica ozima. Przedplon pszenica ozima i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020 **34**
- Tab. 22. Pszenica ozima. Przedplon pszenica ozima i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych

na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce, Łosiów. Rok zbioru 2020. **35**

Tab. 23. Pszenica ozima. Przedplon soja i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2019-2020. **36**

Tab. 24. Pszenica ozima. Przedplon soja i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020. **37**

Tab. 25. Pszenica ozima. Przedplon soja i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Zastosowanie różnych dawek azotu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020. **38**

Tab. 26. Pszenica ozima. Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności. (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce, Pąków. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **40**

Tab. 27. Pszenica ozima. Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce, Pąków. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **41**

Tab. 28. Pszenica ozima. Przedplon kukurydza na ziarno, opóźniony termin siewu i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Pąków. Rok zbioru 2020. **42**

Tab. 29. Pszenica ozima. Przedplon burak cukrowy i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **43**

Tab. 30. Pszenica ozima. Przedplon burak cukrowy i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **44**

Tab. 31. Pszenica ozima. Przedplon burak cukrowy i rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020. **45**

Tab. 32. Pszenica ozima. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **47**

Tab. 33. Pszenica ozima. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) w różnych wariantach agrotechnicznych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **48**

Tab. 34. Pszenica ozima. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Pąków. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **49**

Tab. 35. Jęczmień ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020 **51**

Tab. 36. Jęczmień ozimy. Pochodzenie odmian. **52**

Tab. 37. Jęczmień ozimy. Zbiórce wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **52**

Tab. 38. Jęczmień ozimy. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **52**

Tab. 38. Jęczmień ozimy. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **53**

Tab. 40. Jęczmień ozimy. Głubczyce - poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **53**

Tab. 41. Jęczmień ozimy. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020. **54**

Tab. 42. Jęczmień ozimy. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **54**

Tab. 43. Jęczmień ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020 **56**

Tab. 44. Pszenżyto ozime. Pochodzenie odmian. **57**

Tab. 45. Pszenżyto ozime. Zbiórce wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **57**

Tab. 46. Pszenżyto ozime. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **57**

Tab. 47. Pszenżyto ozime. Plon ziarna przy 14% wilgotności w miejscowościach (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **58**

Tab. 48. Pszenżyto ozime. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **58**

Tab. 49. Pszenżyto ozime. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020,

2018–2020. **22**

- Tab. 50. Pszenżyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **59**
- Tab. 51. Żyto ozime. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **60**
- Tab. 52. Żyto ozime. Pochodzenie odmian **61**
- Tab. 53. Żyto ozime. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **61**
- Tab. 54. Żyto ozime. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **61**
- Tab. 55. Żyto ozime. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **62**
- Tab. 56. Żyto ozime. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **62**
- Tab. 57. Żyto ozime. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **62**
- Tab. 58. Żyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **63**
- Tab. 59. Pszenica jara. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **64**
- Tab. 60. Pszenica jara. Pochodzenie odmian. **65**
- Tab. 61. Pszenica jara. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **65**
- Tab. 62. Pszenica jara. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **65**
- Tab. 63. Pszenica jara. Plon ziarna w miejscowościach przy 14 % wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **66**
- Tab. 64. Pszenica jara. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **66**
- Tab. 65. Pszenica jara. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020. **66**
- Tab. 66. Pszenica jara. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **67**
- Tab. 67. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych na przeciętnym poziomie agrotechniki – a1. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **67**
- Tab. 68. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Rok zbioru 2020. **67**
- Tab. 69. Pszenica jara. Wyniki analiz jakościowych na intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Rok zbioru 2020. **69**
- Tab. 70. Jęczmień jary. Pochodzenie odmian. **70**
- Tab. 71. Jęczmień jary. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **70**
- Tab. 72. Jęczmień jary. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **70**
- Tab. 73. Jęczmień jary. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **71**
- Tab. 74. Jęczmień jary. Głubczyce - poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **71**
- Tab. 75. Jęczmień jary. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020. **72**
- Tab. 76. Jęczmień jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1. Rok zbioru 2020. **72**
- Tab. 77. Owies. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **74**
- Tab. 78. Owies. Pochodzenie odmian. **75**
- Tab. 79. Owies. Zbiornicze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **75**
- Tab. 80. Owies. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **75**
- Tab. 81. Owies. Plon ziarna w miejscowościach przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **76**
- Tab. 82. Owies. Głubczyce – poszerzony dobór odmian. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **76**
- Tab. 83. Owies. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018 – 2020. **76**
- Tab. 84. Owies. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby. Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **77**
- Tab. 85. Rzepak ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **78**
- Tab. 86. Rzepak ozimy. Pochodzenie odmian. **79**

- Tab. 87. Rzepak ozimy. Zbiórce wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **80**
- Tab. 88. Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca) . Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **81**
- Tab. 89. Rzepak ozimy. Plon nasion przy 9% wilgotności w miejscowościach (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **82**
- Tab. 90. Rzepak ozimy. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Bąków, Pągów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **83**
- Tab. 91. Rzepak ozimy. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Bąków, Pągów, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **84**
- Tab. 92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **86**
- Tab. 93. Rzepak jary. Pochodzenie odmian. **87**
- Tab. 94. Rzepak jary. Zbiórce wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2020. **87**
- Tab. 95. Rzepak jary. Plon nasion przy 9% wilgotności (%wzorca). Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **87**
- Tab. 96. Rzepak jary. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **88**
- Tab. 97. Rzepak jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **88**
- Tab. 98. Kukurydza pastewna na ziarno. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2020. **90**
- Tab. 99. Kukurydza pastewna na ziarno. Pochodzenie odmian. **91**
- Tab. 100. Kukurydza pastewna na ziarno. Zbiórce wyniki doświadczenia. Głubczyce. Rok zbioru 2020. **92**
- Tab. 101. Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności, wilgotność w czasie zbioru (% wzorca). Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. Odmiany wczesne. **92**
- Tab. 102. Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności, wilgotność w czasie zbioru (% wzorca). Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. Odmiany średniowczesne. **93**
- Tab. 103. Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności, wilgotność w czasie zbioru (% wzorca). Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. Odmiany średniopóźne. **93**
- Tab. 104. Kukurydza pastewna na ziarno. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Głubczyce. Lata zbioru: 2020, 2018-2020. **94**
- Tab. 105. Burak cukrowy. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2020. **95**
- Tab. 106. Burak cukrowy. Pochodzenie odmian. **96**
- Tab. 107. Burak cukrowy. Zbiórce wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2020. **96**
- Tab. 108. Burak cukrowy - Głubczyce. Plon korzeni (dt/ha, %wzorca), zawartość cukru (%), plon technologiczny cukru (dt/ha). Lata zbioru 2020, 2019-2020. **97**
- Tab. 109. Burak cukrowy. Głubczyce. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian, porażenie przez choroby. Lata zbioru 2020, 2019-2020. **97**
- Tab. 110. Burak cukrowy. Polska. Plon korzeni (dt/ha), zawartość cukru(%), plon technologiczny cukru (dt/ha), porażenie przez choroby. Rok zbioru 2020. **98**
- Tab. 111. Ziemniak. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **100**
- Tab. 112. Średnie miesięczne temperatury powietrza w punktach doświadczalnych w okresie wegetacji ziemniaka. Rok 2020. **102**
- Tab. 113. Miesięczne sumy opadów w punktach doświadczalnych w okresie wegetacji ziemniaka. Rok 2020. **102**
- Tab. 114. Ziemniak. Pochodzenie odmian. **103**
- Tab. 115. Ziemniak bardzo wczesny. Plon ogólny i handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **104**
- Tab. 116. Ziemniak bardzo wczesny. Plon ogólny i handlowy bulw w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru 2020. **104**
- Tab. 117. Ziemniak wczesny. Plon ogólny i handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **104**
- Tab. 118. Ziemniak wczesny. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru 2020. **105**
- Tab. 119. Ziemniak średniowczesny. Plon ogólny i plon handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **105**
- Tab. 120. Ziemniak średniowczesny. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru 2020. **106**
- Tab. 121. Ziemniak bardzo wczesny. Zawartość skrobi (%). Lata zbioru: 2018-2020. **106**
- Tab. 122. Ziemniak wczesny. Zawartość skrobi (%). Lata zbioru: 2018-2020. **106**
- Tab. 123. Ziemniak średniowczesny. Zawartość skrobi (%). Lata zbioru: 2018-2020. **107**
- Tab. 124. Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **108**
- Tab. 125. Bobik - Pochodzenie odmian. **109**

- Tab. 126. Bobik. Zbiorcze wyniki doświadczeń. Rok zbioru 2020. **109**
- Tab. 127. Bobik. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **110**
- Tab. 128. Bobik. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Rok zbioru 2020, 2018-2020. **110**
- Tab. 129. Bobik. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **111**
- Tab. 130. Bobik. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby i szkodniki. Rok zbioru 2020. **111**
- Tab. 131. Groch siewny. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2020. **113**
- Tab. 132. Groch siewny - Pochodzenie odmian. **114**
- Tab. 133. Groch siewny. Zbiorcze wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2020. **114**
- Tab. 134. Groch siewny. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **115**
- Tab. 135. Groch siewny. Plon nasion przy 15 % wilgotności (% wzorca). Rok zbioru 2020, 2018-2020. **116**
- Tab. 136. Groch siewny. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian. Lata zbioru 2020, 2019-2020. **116**
- Tab. 137. Groch siewny. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby. Lata zbioru 2020. **117**
- Tab. 138. Soja. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Lata zbioru 2018, 2019, 2020. **120**
- Tab. 139. Soja. Pochodzenie odmian. **121**
- Tab. 140. Warunki pogodowe w okresie wegetacji soi. Lata 2018-2020. **122**
- Tab. 141. Warunki pogodowe w okresie wegetacji soi. Głubczyce. Lata 2018-2020. **122**
- Tab. 142. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion dt/ha przy 15% wilgotności (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **123**
- Tab. 143. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion dt/ha w miejscowościach przy 15% wilgotności (% wzorca). Lata zbioru 2020, 2018-2020. **124**
- Tab. 144. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion w miejscowościach przy 15% wilgotności (% wzorca). Rok zbioru 2020. **125**
- Tab. 145. Soja. Doświadczenie odmianowe. Ważniejsze właściwości rolnicze. Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **126**
- Tab. 146. Soja. Doświadczenie odmianowe. Zawartość białka i tłuszczu (% s.m.). Plon białka i tłuszczu dt/ha (% wzorca). Województwo opolskie. Rok zbioru 2020. **127**
- Tab. 147. Soja. Doświadczenie odmianowe. Plon nasion dt/ha przy 15% wilgotności (% wzorca) i ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **128**
- Tab. 148. Soja. Doświadczenie odmianowe. Ważniejsze właściwości rolnicze. Zawartość białka i tłuszczu (% s.m.). Plon białka i tłuszczu dt/ha (% wzorca). Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **129**
- Tab. 149. Soja. Doświadczenie odmianowe. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **130**
- Tab. 150. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Plon nasion przy 15% wilgotności dt/ha (% wzorca). Województwo opolskie. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **131**
- Tab. 151. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Plon nasion przy 15% wilgotności dt/ha (% wzorca). Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **131**
- Tab. 152. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **132**
- Tab. 153. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **132**
- Tab. 154. Soja. Doświadczenie z gęstością siewu. Ważniejsze właściwości rolnicze. Głubczyce, Łosiów. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **133**
- Tab. 155. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca) na dwóch poziomach agrotechniki. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **135**
- Tab. 156. Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Wyniki analiz jakościowych na przeciętnym – a1 i intensywnym poziomie agrotechniki – a2. Głubczyce. Rok zbioru 2020. **136**
- Tab. 157. Rzekpak ozimy. Plon ziarna przy 9 % wilgotności (% wzorca) na przeciętnym poziomie agrotechniki. Głubczyce. Lata zbioru 2020, 2018-2020. **137**

