

**Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Ciciborze Dużym**

**Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
w województwie lubelskim**


**Wyniki
Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych
w woj. lubelskim w 2025 r.**

RZEPAK OZIMY



Cicibór Duży 2026

**Punkty realizacji badań odmianowych w systemie PDO
w województwie lubelskim.**



Lubelski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Przewodniczący: dr inż. Piotr Pszczółkowski

Zastępca: mgr inż. Waldemar Banach

Zastępca: Roman Kot

Sekretarz: mgr inż. Przemysław Kąkol

Stacja Koordynująca PDO na Lubelszczyźnie
COBORU

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym

tel.: 533 267 726, 781 906 094

e-mail: sdoo@cicibor.coboru.gov.pl

Cicibór Duży 80A

21-500 Biała Podlaska

pow. bialski

woj. lubelskie

Dyrektor mgr inż. Łukasz Korszeń

Wyniki

Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych

**Zboża jare, zboża ozime, groch siewny, bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, kukurydza, soja,
rzepak ozimy, ziemniak jadalny**

2025 r.

Opracowanie:

mgr inż. Michał Tarkowski

Publikacja chroniona prawem wydawcy: każda reprodukcja całości lub jej części wymaga zgody wydawcy.
--

Wydawca: SDOO Cicibór Duży we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie

RZEPAK OZIMY

Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w naszym kraju, według danych GUS, wynosiła w ostatnich latach 740-1089 tys. ha. W roku 2024 areał uprawy tej rośliny wyniósł 986 tys. ha i był niewiele mniejszy niż w roku poprzednim. Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 165 odmian rzepaku ozimego (32 populacyjne i 133 mieszańcowe). W tej liczbie jest 18 odmian krajowych i 147 zagranicznych. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach. W roku 2024 skreślono z Krajowego rejestru 6 odmian (Acapulco, Amazon, Einstein, Graf, Rangar, Taifun). Dla 2 odmian wygaśł okres wpisu do - 30 KR: Oriolus i Popular. W naszym województwie doświadczenia z rzepakiem ozimym w sezonie wegetacyjnym 2024/2025 prowadzone były w Ciciborze Dużym, Bezku, Palikijach i Ulhówku. Największe plony osiągnięto w Palikijach.

Charakterystyka odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru w 2025 roku.

Crusador (d. WRH 675)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozy nolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość dobra. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na zgniliznę twarząkową, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czerń krzyżowych – średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie pa totypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK Exarho (d. CWH604)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozy nolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twarząkową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i werciliozę – dość mała. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK Plener (d. DMH585)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozy nolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion mała. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twarząkową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czerń krzyżowych – średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie pa totypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Dreamline (d. IGP1379)

Odmiana populacyjna.

Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozy nolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej – średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twarząkową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czerń krzyżowych – średnia.

KWS Ditos (d. H9191517)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozy nolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny dość wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na zgniliznę twarząkową, choroby podstawy łodygi, werciliozę, i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

KWS Oceanos (d. H9201134)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozy nolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twarząkową, suchą zgniliznę kapustnych i werciliozę – średnia, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – dość mała.

LG Adamant (d. LE22/460)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią dość szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czern krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i werciliozę – dość mała.

LG Adventus (d. LE22/466)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion dość mała. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny bardzo wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej późniejszy od średniego. Odporność na werciliozę – dość duża, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czern krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

LG Akerman (d. LE22/468)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion większa od średniej. Rozwój roślin jesienią dość szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny bardzo wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej późniejszy od średniego. Odporność na czern krzyżowych – dość duża, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, werciliozę – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

LG Arrakis (d. LE22/472)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i werciliozę – dość duża, na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czern krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

LID Cabero (d. LDC21121)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na werciliozę – dość duża, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czern krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

LID Hello (d. LDC22125)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią dość szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czern krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość mała. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

LID Maestro (d. LDC21112)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czern krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

LID Tebo (d. LDC21118)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czern krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).

Royce (d. WRH 674)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią dość szybki. Zimotrwałość dobra. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi – dość duża, na zgniliznę twardzikową, werciliozę, i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

SY Elisabetta (d. RNX213331)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozyolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i werciliozę – dość mała. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

Tartu (d. NPZ21295W11)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na werciliozę duża, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi – dość duża, na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

Teflon (d. RAP 676)

Odmiana mieszańcowa.

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozyolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion dość mała. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość dobra. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na choroby podstawy łodygi – dość duża, na zgniliznę twardzikową, werciliozę i czerń krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość mała. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).

Zodiak (d. MAH 9422)

Odmiana populacyjna.

Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozyolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie bez tłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Rozwój roślin jesienią średnio szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, werciliozę i czerń krzyżowych – średnia.

Odmiany w LOZ (Lista Odmian Zalecanych) 2026 dla województwa lubelskiego:

- Bachus
- DK Exited
- Dynamic
- Tom
- LG Aviron
- DK Exaura



Tabela 1. Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2025.

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce	Rok włączenia do LOZ	Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej – pełnomocnika w Polsce
Odmiany populacyjne				
1	Kuba	2023		Cluser Brending International GmbH Gammelby 6 DE-24966 Sorup
2	Telly	2024		Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1; 55-300 Środa Śląska
3	Anton	2023		Cluser Brending International GmbH Gammelby 6 DE-24966 Sorup
4	Bachus L	2022	2024	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146 63-740 Kobylin
5	Derrick	2018		KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151 PL 60-206 Poznań
6	Marvin	2023		Cluser Brending International GmbH Gammelby 6 DE-24966 Sorup
7	SM Bolt	2024		Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146 63-740 Kobylin
8	Tom L	2022	2024	Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146 63-740 Kobylin
Odmiany mieszańcowe				
9	DK Excited L	2020	2023	Monsanto Polska sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
10	LG Avenger	2024		Limagrain Central Europe Societe Europeenne; Spółka Europejska Oddział W Polsce ul. Rataje 164; 61 168 Poznań
11	Amoroso	2023		Lidea Poland sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a PL-60-449 Poznań
12	Bernstein	2024		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
13	Create	2024		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
14	Desperado	2021		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
15	DK Exaura L	2022	2024	Monsanto Polska sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
16	Dynamic L	2019	2022	DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
17	Jurek	2022		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
18	KWS Granos	2021		KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151 PL 60-206 Poznań
19	KWS Lauros	2022		KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151 PL 60-206 Poznań
20	LG Apollonia	2022		Limagrain Central Europe Societe Europeenne; Spółka Europejska Oddział W Polsce ul. Rataje 164; 61 168 Poznań
21	LG Aviron L	2020	2023	Limagrain Central Europe Societe Europeenne; Spółka Europejska Oddział W Polsce ul. Rataje 164; 61 168 Poznań
22	LG Wagner	2023		Limagrain Central Europe Societe Europeenne; Spółka Europejska Oddział W Polsce ul. Rataje 164; 61 168 Poznań
23	Metropol	2021		Saaten – Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
24	PT315	2023		Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o. ul. Józefa P. Dziekońskiego 1 PL-00-728 Warszawa
25	Richmond	2023		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
26	Romeo	2023		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
27	Temptation	2022		DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec
28	Crossfit	CCA		ASF Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142b PL-02-305 Warszawa
29	DK Exima	CCA		Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158; 02-326 Warszawa

L- Lista Odmian Zalecanych

Tabela 2. Rzepak ozimy. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru 2025.

Miejscowość	SDOO Ciciwór Duży	ZDOO Bezek	SHR Palikije	SHR Ułhówek
Powiat	białski	chełmski	lubelski	tomaszowski
Kompleks rolniczej przydatności gleby	żytni bardzo dobry	pszenny wadliwy	pszenny b. dobry	pszenny b. dobry
Klasa bonitacyjna gleby	IIIb	IIIb	II	Ia
pH gleby w KCL	6,1	7,1	6,6	6,9
Przedplon	Groch	Jęczmień jary	Pszenżyto jare	pszenica ozima
Data siewu	02.09	27.08	04.09	23.08
Obsada nasion (szt/m ²)	45/55	50/60	45/55	50
Data zbioru	01.08	01.08	01.08	01.08
nawożenie mineralne				
N na poziomie a ₁ (kg/ha)	190	190	65	198
P ₂ O ₅ (kg/ha)	50	60		60
K ₂ O (kg/ha)	75	90		90
Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi (l/ha)	Siarczan Magnezu 6kg	Siarczan Magnezu 10kg	Basfoliar 8L	Basfoliar Extra 8L
środki ochrony roślin				
Herbicyd (nazwa, dawka/ha)	Boa 480 EC 0,15L Metazanex 1,5l/ha Agil S 100EC 0,5L Navigator 360 SL 0,2L	Agil-S 100EC 0,7l Mota 2,5l	Caryx 240 SL 1l Fusilade Forte 150 1l	Colzor trio 4l Fusilade Forte 150 0,75l
Insektycyd (nazwa, dawka/ha)	Los ovados 200 SE 0,2l Apis 200SE 0,25l	Decis Mega 50 EW 0,15L Los ovados 200 SE 0,25L Camadine 200SL 0,2l Inazuma 130 WG 0,3kg	Marric Vita 240 EW 0,1l Inzuma 0,2kg Decis Mega 50 EW 0,15l Cyperkill Max 0,05l Karate-Zeon 0,50 SC 0,1l	Inazuma 0,2kg/ha Mospilan 0,12kg/ha
Fungicyd -pierwszy zabieg (nazwa, dawka/ha)	Nie stosowano	Nie stosowano	Pictor 400 SC 0,5l	Caryx 240 SL 0,6l/ha Topex 3l/ha Propulse 1l
Regulator wzrostu (nazwa, dawka/ha)	Nie stosowano	Nie stosowano	Mepik 300 SL 0,3l	Nie stosowano
Inne zabiegi (nazwa, dawka/ha)	Nie stosowano	Nie stosowano	Nie stosowano	Nie stosowano

Tabela 3. Rzepak ozimy. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru 2025.

Lp.	Cecha	SDOO Ciciwór Duży	ZDOO Bezek	SHR Palikije	SHR Ułhówek
1	Przezimowanie (%)	61,6	100,0	100,0	100,0
2	Termin kwitnienia (dzień, m-c)	24.04	27.04	27.04	20.04
3	Termin dojrzałości technicznej (dzień, m-c)	14.07	12.07	12.07	14.07
4	Wysokość roślin (cm)	114,9	129,7	146,0	135,4
5	Pochylenie łanu (9°)	9,0	6,2	9,0	9,0
6	Porażenie przez choroby				
7	Zgnilizna twardzikowa (%)	0,0	1,7	0,0	0,0
8	Plon ziarna (dt z ha)	29,0	32,8	62,1	57,8

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian

Skala 9°: 9 - oznacza ocenę najkorzystniejszą, 1 - najmniej korzystną, 5 - średnią

Tabela 4. Rzepak ozimy. Plon nasion odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2025.

Lp.	Odmiana	Poziom a ₁			
		Cicibór Duży	Bezek	Palikije	Ulhówek
Wzorzec, dt z ha		29,0	32,8	62,1	57,8
Odmiany populacyjne					
1	Kuba	73	103	92	101
2	Telly	96	90	89	99
3	Anton	74	86	94	102
4	Bachus L	82	92	96	97
5	Derrick	98	82	95	93
6	Marvin	71	81	98	104
7	SM Bolt	93	86	87	95
8	Tom L	74	91	90	99
Odmiany mieszańcowe					
9	DK Excited L	130	103	111	107
10	LG Avenger	108	114	107	101
11	Amoroso	111	103	106	104
12	Bernstein	117	113	121	103
13	Create	84	96	102	100
14	Desperado	92	99	97	99
15	DK Exaura L	114	99	109	99
16	Dynamic L	123	102	105	99
17	Jurek	91	98	88	95
18	KWS Granos	68	99	99	98
19	KWS Lauros	108	105	102	101
20	LG Apollonia	112	114	102	98
21	LG Aviron L	107	103	96	101
22	LG Wagner	110	97	92	100
23	Metropol	102	123	105	105
24	PT315	113	114	113	93
25	Richmond	96	98	105	107
26	Romeo	113	97	105	101
27	Temptation	111	96	94	98
28	Crossfit	117	119	103	99
29	DK Exima	113	99	98	101

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian,

Tabela 5. Rzepak ozimy. Plon nasion odmian (% wzorca). Lata zbioru 2025, 2024, 2023.

Tabela 6. Rzepak ozimy. Plon nasion odmian (% Wzorca). Lata zbioru 2020, 2021, 2022.						
Lp.	Odmiana	Poziom a ₁				
		2023	2024	2025	2024-2025	2023-2025
Wzorzec, dt z ha		55,5	52,6	45,4	49,0	51,2
Odmiany populacyjne						
1	Kuba		93	94	94	
2	Telly			93		
3	Anton		93	92	93	
4	Bachus L	100	97	93	95	97
5	Derrick	91	94	92	93	92
6	Marvin		91	93	92	
7	SM Bolt			90		
8	Tom L	95	94	90	92	93
Odmiany mieszańcowe						
9	DK Excited L	109	106	111	109	109
10	LG Avenger			106		
11	Amoroso			106		
12	Bernstein			113		
13	Create			97		
14	Desperado	103	104	97	101	101
15	DK Exaura L	105	113	105	109	108
16	Dynamic L	103	102	106	104	104
17	Jurek	100	99	93	96	97
18	KWS Granos		102	94	98	
19	KWS Lauros		100	103	102	
20	LG Apollonia			105		
21	LG Aviron L	106	101	100	101	102
22	LG Wagner			98		
23	Metropol	104	99	108	104	104
24	PT315			107		
25	Richmond		103	103	103	
26	Romeo			104		
27	Temptation		98	98	98	
28	Crossfit			107		
29	DK Exima	105	105	101	103	104
Liczba doświadczeń		3	4	4	8	11

Wzorzec dt z ha – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 6. Rzepak ozimy. Porażenie przez suchą zgniliznę kapustnych na przeciętnym poziomie agrotechniki a1 – (odchylenie od wzorca). Lata zbioru: 2025, 2024, 2023.

Zgnilizna kapustna (Sucha zgnilizna w Wzorzec), lata 2019, 2020, 2021, 2022						
Lp.	Odmiana	Liczba lat badań	Zgnilizna Twardzikowa %		Sucha zgnilizna kapustnych w %	
			2025	2023-2025	2025	2023-2025
Wzorzec			1,4	3,6	0,0	0,0
Odmiany populacyjne						
1	Kuba	2	0,3	0,2*	0,0	0,0*
2	Telly	1	0,3	0,3	0,0	0,0
3	Anton	2	-0,1	0,6*	0,0	0,0*
4	Bachus L	3	-0,1	-0,5	0,0	0,0
5	Derrick	3	0,9	-0,1	0,0	0,0
6	Marvin	2	0,6	-0,2*	0,0	0,0*
7	SM Bolt	1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
8	Tom L	3	0,6	-0,5	0,0	0,0
Odmiany mieszańcowe						
9	DK Excited L	3	-0,1	-0,5	0,0	0,0
10	LG Avenger	1	-0,4	-0,4	0,0	0,0
11	Amoroso	1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
12	Bernstein	1	0,6	0,6	0,0	0,0
13	Create	1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
14	Desperado	3	-0,1	-0,8	0,0	0,0
15	DK Exaura L	3	0,3	-0,3	0,0	0,0
16	Dynamic L	3	-0,4	-0,6	0,0	0,0
17	Jurek	3	-0,4	-1,0	0,0	0,0
18	KWS Granos	2	0,6	0,4*	0,0	0,0*
19	KWS Lauros	2	0,6	0,5*	0,0	0,0*
20	LG Apollonia	1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
21	LG Aviron L	3	0,6	0,6	0,0	0,0
22	LG Wagner	1	0,9	0,9	0,0	0,0
23	Metropol	3	0,3	0,0	0,0	0,0
24	PT315	1	0,9	0,9	0,0	0,0
25	Richmond	2	0,9	0,4*	0,0	0,0*
26	Romeo	1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
27	Temptation	2	-0,4	-0,2*	0,0	0,0*
28	Crossfit	1	-0,4	-0,4	0,0	0,0
29	DK Exima	3	0,9	0,1	0,0	0,0
Liczba doświadczeń			2	6	2	6

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

*- średnia z lat 2024-2025

**Tabela 7. Rzepak ozimy. Ważniejsze właściwości rolniczo – użytkowe odmian (odchylenie od wzorca).
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023.**

Lp.	Odmiana	Przezimowanie roślin (%)		Wysokość roślin (cm)		Pochylenie łanu (skala 9°)		Dojrzałość techniczna (dzień roku)	
		2025	2022-2025	2025	2022-2025	2025	2022-2025	2025	2022-2025
Wzorzec		100,0	93,9	130,7	146,2	7,6	8,5	193,8	188,6
Odmiany populacyjne									
1	Kuba	0,0	-0,8*	-7,3	-5,2*	0,0	0,0*	0,9	0,7*
2	Telly	0,0	0,0	-7,4	-7,4	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8
3	Anton	0,0	0,2*	-0,9	-5,0*	0,5	0,3*	1,2	1,0*
4	Bachus L	0,0	0,5	-1,1	-3,1	0,2	0,1	1,4	0,9
5	Derrick	0,0	-2,6	-3,2	-4,5	0,2	0,1	0,2	0,7
6	Marvin	0,0	0,2*	-4,9	-3,5*	0,2	0,1*	0,2	-0,3*
7	SM Bolt	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
8	Tom L	0,0	-0,1	-2,5	-3,5	0,2	0,1	0,7	0,1
Odmiany mieszańcowe									
9	DK Excited L	0,0	0,5	-0,8	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
10	LG Avenger	0,0	0,0	5,1	5,1	0,2	0,2	-0,3	-0,3
11	Amoroso	0,0	0,0	5,0	5,0	-0,5	-0,5	0,2	0,2
12	Bernstein	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,9	0,9
13	Create	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,4	0,4	0,2	0,2
14	Desperado	0,0	0,2	-1,4	-1,8	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
15	DK Exaura L	0,0	-0,1	-0,4	2,2	-0,1	-0,0	-0,3	0,3
16	Dynamic L	0,0	-0,8	1,2	-0,1	0,0	0,0	0,4	0,3
17	Jurek	0,0	0,5	-6,0	-3,9	0,0	0,0	0,7	0,1
18	KWS Granos	0,0	0,2*	2,3	2,1*	0,2	0,1*	-0,6	-0,2*
19	KWS Lauros	0,0	0,2*	2,1	2,4*	-0,1	-0,1*	-0,8	-0,5*
20	LG Apollonia	0,0	0,0	4,4	4,4	0,5	0,5	0,2	0,2
21	LG Aviron L	0,0	0,5	2,6	3,6	-0,6	-0,2	-0,8	-0,8
22	LG Wagner	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-0,6	-0,6	-0,8	-0,8
23	Metropol	0,0	-0,8	0,2	1,0	0,5	0,2	0,7	0,0
24	PT315	0,0	0,0	10,5	10,5	0,4	0,4	-0,1	-0,1
25	Richmond	0,0	0,2*	1,2	3,8*	-0,1	-0,1*	-0,8	-0,8*
26	Romeo	0,0	0,0	7,4	7,4	-0,5	-0,5	0,2	0,2
27	Temptation	0,0	0,2*	-6,6	-2,7*	-0,3	-0,1*	-0,1	0,1*
28	Crossfit	0,0	0,0	0,5	0,5	-0,1	-0,1	0,7	0,7
29	DK Exima	0,0	0,5	1,5	-0,6	-0,6	-0,2	-0,8	-0,7
Liczba doświadczeń		2	6	4	11	2	7	2	6

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

*- średnia z lat 2024-2025;