

Kukurydza

Uwagi ogólne

W roku 2025 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone były dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO Wróćkowo i ZDOO Rychliki oraz dwa oświadczenia w użytkowaniu na ziarno z odmianami wczesnymi w SDOO Wróćkowo i ZDOO Rychliki oraz jedno z średniowczesnymi we Wróćkowie. Opracowanie zostało wzbogacone o dane z doświadczeń w SDOO Krzyżewo, z sąsiedniego województwa podlaskiego, w celu poszerzenia informacji o badanych odmianach. Odmiany uczestniczące w doświadczeniach na kiszonkę podzielono na trzy grupy wczesności, tworzące odrębne doświadczenia:

- odmiany wczesne FAO 200 – 240
- odmiany średniowczesne FAO 240 – 260
- odmiany średniopóźne i późne FAO 260 – 280

W przypadku odmian użytkowanych na kiszonkę podstawowym parametrem określającym wczesność odmiany jest zawartość suchej masy w całych roślinach (kolby wraz z łodygami), natomiast na ziarno - wilgotność ziarna w czasie zbioru. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań z Wróćkowa, Rychlik i Krzyżewa na tle średniej krajowej. Terminy siewu i zbioru poszczególnych doświadczeń podano w tabeli 3.

Tabela 1.

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany badane. Rok zbioru 2025

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestru *	Kod kraju pochodzenia	Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)
Grupa 1- odmiany wczesne				
1.	Keltico	2021	AT	Saatbau Polska sp. z o.o.; ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska
2.	SM Mieszko	2021	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
3.	Qualito	2022	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
4.	Herculio	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
5.	KWS Kalpo	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
6.	SM Manoso	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
Grupa 2- odmiany średniowczesne				
7.	Farmpower	2021	DE	farmSaat Polska sp. z o.o.; Nowa Trzcianna 12; PL- 96-115 Nowy Kawęczyn
8.	Inception	2021	DE	farmsaat Polska sp. z o.o.; Nowa Trzcianna 12; PL- 96-115 Nowy Kawęczyn
9.	Inspiro	2021	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska
10.	SM Perseus	2021	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
11.	SM Varsovia	2021	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
12.	MHR Vamos	2023	PL	Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.; ul. Zbożowa 4; PL-30-002 Kraków
13.	P8782	2023	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
14.	Sunbird	2023	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
15.	Tabarro	2023	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska
16.	RGT Deixxel	2024	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
17.	RGT Lanxx	2024	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
18.	SM Zadra	2024	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
19.	SM Zerka	2024	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
20.	Spektro	2024	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska
21.	Agrolupo	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań

c.d. Tabela 1

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestr *	Kod kraju pochodzenia	Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)
Grupa 2- odmiany średniowczesne				
22.	KWS Lupollino	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
23.	MHR Mercado	2025	PL	Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.; ul. Zbożowa 4; PL-30-002 Kraków
24.	RGT Oddaxx	2025	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
25.	SM Ina	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
26.	SM Jasper	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
27.	SM Nida	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
28.	SM Rambo	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
29.	SM Rokita	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
30.	SM Zulu	2025	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
31.	Blandeen	CCA	FR	
32.	Monster	CCA	FR	
Grupa 3- odmiany średniopóźne				
33.	Classico	2021	AT	Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska
34.	SM Giewont	2022	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
35.	Honoreen	2023	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
36.	KWS Monumento	2023	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
37.	Rosaleen	2023	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
38.	KWS Temisto	2024	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
39.	LG31271	2024	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
40.	LG31304	2024	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
41.	SM Adego	2024	PL	"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
42.	Bellwood	2025	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
43.	P9944	2025	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piłsudskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
44.	RGT Trapixx	2025	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
45.	MAS 26R	CCA	FR	

Tabela 2.

Kukurydza na ziarno. Odmiany badane. Rok zbioru 2025

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestru *	Kod kraju pochodzenia	Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)
odmiany wczesne				
1.	Ashley	2022	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
2.	LID1015C	2022	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
3.	Aktoro	2023	AT	Saatbau Polska sp. z o.o.; ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska
4.	KWS Emporio	2023	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
5.	P8255	2023	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
6.	Wesley	2023	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
7.	Ibarama	2024	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
8.	KWS Norento	2024	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
9.	KWS Pluvio	2024	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
10.	P7818	2024	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
11.	SM Fagun	2024	PL	„Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
12.	SY Fanfara	2024	CH	Syngenta Polska sp. z o.o.; ul. Szamocka 8; PL-01-748 Warszawa
13.	Herculio	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
14.	KWS Petraro	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
15.	LID1033C	2025	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
16.	Rochester	2025	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
17.	SM Hiltop	2025	PL	„Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”; Smolice 146; PL-63-740 Kobylin
18.	Bayninja	CCA	DE	
19.	Parsifal	CCA	DE	

cd. Tabela 2

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestru *	Kod kraju pochodzenia	Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)
odmiany średniowczesne				
1.	Farmpower	2021	DE	farmSaat Polska sp. z o.o.; Nowa Trzcianna 12; PL- 96-115 Nowy Kawęczyn
2.	Inception	2021	DE	farmSaat Polska sp. z o.o.; Nowa Trzcianna 12; PL- 96-115 Nowy Kawęczyn
3.	KWS Camillo	2022	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
4.	LG31240	2022	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
5.	Murphey	2022	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
6.	P8904	2022	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
7.	KWS Editio	2023	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
8.	LG32257	2023	FR	Limagrain Polska sp. z o.o.; ul. Rataje 164; PL-61-168 Poznań
9.	LID2020C	2023	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
10.	Lunexal	2023	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
11.	Sunbird	2023	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
12.	Bots	2024	DE	farmSaat Polska sp. z o.o.; Nowa Trzcianna 12; PL- 96-115 Nowy Kawęczyn
13.	KWS Adamo	2024	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
14.	KWS Kolendo	2024	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
15.	LID1244C	2024	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
16.	LID2155C	2024	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
17.	P8660	2024	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
18.	P9255	2024	US	Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.; ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1; PL- 00-728 Warszawa
19.	RGT Cedexx	2024	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
20.	RGT Veluxxo	2024	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
21.	Serafino	2024	AT	Saatbau Polska sp. z o.o.; ul. Żytnia 1; PL-55-300 Środa Śląska

c.d. Tabela 2

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do Krajowego rejestr *	Kod kraju pochodzenia	Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)
odmiany średniowczesne				
22.	Agrolupo	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
23.	Dagaz	2025	DE	farmSaat Polska sp. z o.o.; Nowa Trzcianna 12; PL- 96-115 Nowy Kawęczyn
24.	Facilio	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
25.	Keystone	2025	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
26.	KWS Burano	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
27.	KWS Lupollino	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
28.	KWS Privilio	2025	DE	KWS Polska sp. z o.o. ul. Głogowska 151; PL – 60-206 Poznań
29.	LID2214C	2025	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
30.	RGT Alpixx	2025	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
31.	RGT Peterxxon	2025	FR	RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83a; PL-87-100 Toruń
32.	Rockhampton	2025	FR	Lidea Poland sp. sp. z o.o. ul. Wichrowa 1a; PL-60-449 Poznań
33.	Barkley	CCA	FR	
34.	Calixto	CCA	DE	
35.	Clooney	CCA	FR	
36.	Debix	CCA	DE	
37.	Farmoritz	CCA	DE	
38.	Farmueller	CCA	DE	
39.	KWS Aldo	CCA	DE	
40.	LG31252	CCA	FR	
41.	P8556	CCA	US	
42.	Smartboxx	CCA	FR	

*- według „Listy odmian roślin rolniczych wpisanych do Krajowego rejestru w Polsce”
CCA – Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych

Tabela 3.

Kukurydza. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru 2025

Miejscowość		SDOO Wróćkowo <i>pow. Olsztyn</i>	ZDOO Rychliki <i>pow. Elbląg</i>	SDOO Krzyżewo <i>woj. podlaskie</i>
Kompleks rolniczej przydatności gleby		żytni dobry	pszenny dobry	żytni bardzo dobry
Klasa bonitacji gleby		IV a	III b	III b
pH gleby w KCl		6,5	6,3	6,6
Przedplon		ziemniak	rzepak ozimy	pszenica ozima
Data siewu		28.-30.04.	30.04.	29.- 30.04.
Data zbioru – kukurydza na kiszonkę	odmiany wczesne	25.09.	22.09.	10.09.
	odmiany średniowczesne	03.10.	06.10.	24.09.
	odmiany późne	08.10.	17.10.	25.09.
Data zbioru – kukurydza na ziarno	odmiany wczesne	13.11.	14.11.	15.10.
	odmiany średniowczesne	12.11.	-	21.10.
Nawożenie mineralne				
N (kg/ha)		140	150	160
P₂O₅ (kg/ha)		70	80	48
K₂O (kg/ha)		150	120	202
Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi (nazwa, dawka/ha)		Opti kukurydza (3kg); BlueN (0,333kg)+ Cropvit FeMo (0,2l)+ NewJon Zn (0,5l)	-	-
Środki ochrony roślin				
Herbicyd (nazwa, dawka/ha)		Juzan 100 SC (1l) + Tezosar 500 SC (1l) + Nikosar 060 OD (0,6l)	Juzan 100 SC (0,75l) + Tezosar 500 SC (1l) + Nikosar 060 OD (0,5l)	Valentia 102 SE (1l) + Notos 100 SC (1l) + Ikanos 040 OD (1l)
Insektycyd (nazwa, dawka/ha)		-	-	-

Tabela 4.

Kukurydza na kiszonkę. Plon ogólny świeżej masy (% wzorca). Wyniki z poszczególnych miejscowości na tle średniej krajowej.
Rok zbioru 2025

Odmiany		Plon ogólny świeżej masy, % wzorca						
		Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
							średnia	% wzorca
odmiany wczesne								
wzorzec dt/ha:		687,9	474,6	697,3	619,9	-	533,0	-
1.	Keltico	103	107	102	644,7	104	524,3	98
2.	SM Mieszko	99	90	94	584,8	94	517,4	97
3.	Qualito	92	91	93	570,3	92	513,9	96
4.	Herculio	101	98	105	628,2	101	532,1	100
5.	KWS Kalpo	100	102	102	628,2	101	550,4	103
6.	SM Manoso	106	111	105	665,4	107	559,9	105
odmiany średniowczesne								
wzorzec dt/ha:		713,6	595,6	626,7	645,3	-	564,8	-
7.	Farmpower	94	94	93	604,4	94	568,2	101
8.	Inception	94	83	93	580,8	90	532,6	94
9.	Inspiro	90	94	95	600,1	93	527,5	93
10.	SM Perseus	106	102	103	669,0	104	574,4	102
11.	SM Varsovia	108	95	103	658,2	102	573,1	101
12.	MHR Vamos	75	90	90	548,5	85	493,5	87
13.	P8782	89	108	102	643,1	100	573,6	102
14.	Sunbird	87	82	94	565,7	88	518,8	92
15.	Tabarro	78	80	88	529,1	82	509,0	90
16.	RGT Deixxel	92	94	94	602,3	93	529,3	94
17.	RGT Lanxx	94	98	95	617,3	96	554,3	98
18.	SM Zadra	128	108	110	744,2	115	612,5	108
19.	SM Zerka	106	124	107	724,9	112	603,4	107
20.	Spektro	86	94	97	595,8	92	549,1	97
21.	Agrolupo	102	98	94	632,4	98	555,2	98
22.	KWS Lupollino	92	93	99	610,9	95	527,1	93
23.	MHR Mercado	108	103	108	686,2	106	598,5	106
24.	RGT Oddaxx	99	94	98	625,9	97	556,8	99

cd. Tabela 4.

Odmiany		Plon ogólny świeżej masy, % wzorca							
		Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)		
							średnia	% wzorca	
odmiany średniowczesne									
wzorzec dt/ha:		713,6	595,6	626,7	645,3	-	564,8	-	
25.	SM Ina	99	114	108	690,5	107	609,1	108	
26.	SM Jasper	106	103	104	673,3	104	570,0	101	
27.	SM Nida	110	113	99	692,6	107	573,3	102	
28.	SM Rambo	117	110	101	705,5	109	603,9	107	
29.	SM Rokita	119	113	114	744,2	115	618,4	109	
30.	SM Zulu	108	109	106	694,8	108	585,5	104	
31.	Blandeen	CCA	103	101	102	658,2	102	588,0	104
32.	Monster	CCA	107	104	102	673,3	104	579,8	103
odmiany średniopóźne									
wzorzec dt/ha:		783,5	595,2	636,4	671,7	-	526,4	-	
33.	Classico	93	94	88	615,7	92	552,7	105	
34.	SM Giewont	99	107	89	660,5	98	558,9	106	
35.	Honoreen	114	120	122	797,1	119	622,9	118	
36.	KWS Monumento	95	86	93	613,5	91	541,1	103	
37.	Rosaleen	109	112	115	752,3	112	592,1	112	
38.	KWS Temisto	100	86	104	649,3	97	562,7	107	
39.	LG31271	95	86	89	604,5	90	526,7	100	
40.	LG31304	94	95	92	629,2	94	558,9	106	
41.	SM Adego	89	105	91	638,1	95	539,5	102	
42.	Bellwood	99	106	112	709,8	106	582,4	111	
43.	P9944	106	121	105	743,3	111	608,0	116	
44.	RGT Trapixx	90	81	97	600,1	89	526,1	100	
45.	MAS 26R	CCA	116	102	103	718,7	107	579,2	110

Wzorzec- średnia z odmian badanych w grupach

Lp. 31,32,45 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 5

Kukurydza na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy (% wzorca). Wyniki z poszczególnych miejscowości na tle średniej krajowej.
Rok zbioru 2025

Odmiany		Plon ogólny suchej masy, % wzorca						
		Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
							średnia	% wzorca
odmiany wczesne								
wzorzec dt/ha:		198,5	147,8	242,6	196,3	-	175,6	-
1.	Keltico	98	107	98	198,3	101	168,6	96
2.	SM Mieszko	101	96	88	186,5	95	168,6	96
3.	Qualito	95	96	99	189,8	97	173,8	99
4.	Herculio	102	91	109	197,6	101	179,1	102
5.	KWS Kalpo	99	107	107	204,8	104	180,9	103
6.	SM Manoso	105	104	99	201,5	103	180,9	103
odmiany średniowczesne								
wzorzec dt/ha:		207,2	191,7	216,3	205,1	-	183,3	-
7.	Farmpower	101	93	94	196,9	96	181,5	99
8.	Inception	93	85	87	181,2	88	170,5	93
9.	Inspiro	99	96	92	196,2	96	172,3	94
10.	SM Perseus	114	104	100	217,4	106	187,0	102
11.	SM Varsovia	100	97	107	207,8	101	187,0	102
12.	MHR Vamos	70	89	81	164,1	80	148,5	81
13.	P8782	92	111	104	209,9	102	187,0	102
14.	Sunbird	92	74	90	175,0	85	168,6	92
15.	Tabarro	86	71	89	168,2	82	166,8	91
16.	RGT Deixxel	91	99	93	193,5	94	177,8	97
17.	RGT Lanxx	99	105	100	207,8	101	187,0	102
18.	SM Zadra	116	105	104	222,2	108	196,1	107
19.	SM Zerka	96	132	113	233,1	114	198,0	108
20.	Spektro	88	93	87	183,2	89	177,8	97
21.	Agrolupo	114	97	110	219,5	107	194,3	106
22.	KWS Lupollino	93	98	107	203,7	99	177,8	97
23.	MHR Mercado	97	96	108	205,8	100	185,1	101
24.	RGT Oddaxx	93	93	107	200,3	98	187,0	102

cd. Tabela 5.

Odmiany		Plon ogólny suchej masy, % wzorca							
		Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)		
							średnia	% wzorca	
odmiany średniowczesne									
wzorzec dt/ha:		207,2	191,7	216,3	205,1	-	183,3	-	
25.	SM Ina	94	107	102	207,2	101	188,8	103	
26.	SM Jasper	109	99	103	212,6	104	187,0	102	
27.	SM Nida	115	112	114	233,1	114	190,6	104	
28.	SM Rambo	115	101	95	212,6	104	187,0	102	
29.	SM Rokita	119	126	116	246,8	120	198,0	108	
30.	SM Zulu	114	104	102	218,8	107	190,6	104	
31.	Blandeen	CCA	105	109	101	215,4	105	188,8	103
32.	Monster	CCA	96	101	97	201,0	98	181,5	99
odmiany średniopóźne									
wzorzec dt/ha:		208,5	189,1	214,6	204,1	-	184,6	-	
33.	Classico	106	94	87	195,3	96	184,6	100	
34.	SM Giewont	93	110	91	200,0	98	182,8	99	
35.	Honoreen	105	109	117	225,2	110	193,8	105	
36.	KWS Monumento	110	90	104	206,8	101	186,4	101	
37.	Rosaleen	108	115	123	235,4	115	199,4	108	
38.	KWS Temisto	103	99	106	209,5	103	180,9	98	
39.	LG31271	91	90	87	182,3	89	180,9	98	
40.	LG31304	101	95	86	191,9	94	186,4	101	
41.	SM Adego	91	105	96	198,7	97	177,2	96	
42.	Bellwood	111	97	118	221,8	109	193,8	105	
43.	P9944	88	119	100	208,9	102	186,4	101	
44.	RGT Trapixx	99	80	94	185,7	91	173,5	94	
45.	MAS 26R	CCA	94	95	89	189,1	93	177,2	96

Wzorzec- średnia z odmian badanych w grupach

Lp. 31,32,45 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 6.

Kukurydza na kiszonkę. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym (%).

Wyniki z poszczególnych miejscowości na tle średniej krajowej. Rok zbioru 2025

Odmiany		Zawartość suchej masy w plonie ogólnym, %					
		Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia % wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
						średnia	% wzorca
odmiany wczesne							
wzorzec:		28,9	31,2	34,8	31,6	33,4	-
1.	Keltico	27,4	31,0	33,4	97	32,5	97
2.	SM Mieszko	29,4	33,0	32,6	100	33,3	100
3.	Qualito	30,0	32,8	37,1	105	34,4	103
4.	Herculio	29,3	28,9	36,3	100	34,2	102
5.	KWS Kalpo	28,6	32,6	36,7	103	33,4	100
6.	SM Manoso	28,6	29,2	32,8	96	32,9	99
odmiany średniowczesne							
wzorzec:		29,1	32,4	34,5	32,0	32,9	-
7.	Farmpower	31,1	32,0	34,6	102	31,8	97
8.	Inception	28,8	33,6	32,4	99	32,8	100
9.	Inspiro	31,9	33,2	33,1	102	33,0	100
10.	SM Perseus	31,1	32,9	33,6	102	33,2	101
11.	SM Varsovia	27,0	33,0	35,7	100	33,2	101
12.	MHR Vamos	26,9	32,4	31,1	94	31,0	94
13.	P8782	30,0	32,5	35,2	102	32,9	100
14.	Sunbird	30,7	29,5	33,2	97	33,1	101
15.	Tabarro	31,7	29,3	34,8	100	33,0	100
16.	RGT Deixxel	29,0	34,0	34,3	101	34,3	104
17.	RGT Lanxx	30,4	34,8	36,2	106	34,3	104
18.	SM Zadra	26,3	31,9	32,6	95	32,2	98
19.	SM Zerka	26,2	34,2	36,4	101	33,2	101
20.	Spektro	29,7	32,1	30,8	96	32,8	100
21.	Agrolupo	32,5	32,1	40,3	109	36,0	109
22.	KWS Lupollino	29,1	34,7	37,1	105	34,0	103
23.	MHR Mercado	26,1	30,5	34,6	95	32,1	98
24.	RGT Oddaxx	27,1	32,1	37,8	101	33,9	103

cd. Tabela 6.

Odmiany		Zawartość suchej masy w plonie ogólnym, %						
		Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia % wzorca	KRAJ (wg COBORU)		
						średnia	% wzorca	
odmiany średniowczesne								
wzorzec:		29,1	32,4	34,5	32,0	32,9	-	
25.	SM Ina	27,4	30,8	32,4	94	31,2	95	
26.	SM Jasper	29,6	31,5	34,4	99	33,4	102	
27.	SM Nida	30,5	32,2	40,1	107	33,5	102	
28.	SM Rambo	28,7	30,1	32,2	95	31,4	95	
29.	SM Rokita	29,1	35,9	35,2	104	32,4	98	
30.	SM Zulu	30,4	31,3	33,2	99	32,9	100	
31.	Blandeen	CCA	29,6	34,3	34,2	102	32,6	99
32.	Monster	CCA	26,3	31,0	32,6	94	32,1	98
odmiany średniopóźne								
wzorzec:		26,8	31,9	33,8	30,8	33,1	-	
33.	Classico	30,1	31,9	33,5	103	33,5	101	
34.	SM Giewont	25,0	32,6	34,6	100	33,0	100	
35.	Honoreen	24,4	29,1	32,4	93	31,6	95	
36.	KWS Monumento	31,1	33,4	37,8	111	34,5	104	
37.	Rosaleen	26,5	32,8	36,2	103	33,8	102	
38.	KWS Temisto	27,4	36,5	34,6	107	32,4	98	
39.	LG31271	25,4	33,3	33,2	99	34,9	105	
40.	LG31304	28,7	32,0	31,5	100	34,4	104	
41.	SM Adego	27,4	31,9	35,7	103	33,2	100	
42.	Bellwood	29,6	29,2	35,6	102	33,7	102	
43.	P9944	22,1	31,4	32,1	93	31,4	95	
44.	RGT Trapixx	29,3	31,4	32,6	101	33,0	100	
45.	MAS 26R	CCA	21,4	29,5	29,3	87	31,3	95

Wzorzec - średnia z odmian badanych w grupach

Lp. 31,32,45 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 7.

Kukurydza na ziarno. Odmiany wczesne.**Plon ziarna (przy wilgotności ziarna 14%) w miejscowościach na tle średniej krajowej. Rok zbioru 2025**

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Plon ziarna (% wzorca)						
			Wróćnikowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
								średnia (dt/ha)	% wzorca
odmiany wczesne									
wzorzec dt/ha:			106,8	102,3	137,6	115,6	-	115,4	-
1.	Ashley	220	97	105	93	113,7	98	111,0	96
2.	LID1015C	220	97	89	102	111,0	96	113,5	98
3.	Aktoro	220	92	111	106	119,1	103	114,9	100
4.	KWS Emporio	210	107	85	95	110,6	96	113,8	99
5.	P8255	230	110	104	101	121,4	105	114,3	99
6.	Wesley	230	94	106	97	114,4	99	119,3	103
7.	Ibarama	230	118	105	103	125,6	109	122,2	106
8.	KWS Norento	230	98	99	100	114,4	99	113,8	99
9.	KWS Pluvio	230	113	88	97	114,8	99	113,7	99
10.	P7818	220	106	104	103	120,6	104	116,6	101
11.	SM Fagun	230	92	95	94	108,3	94	112,0	97
12.	SY Fanfara	230	95	104	104	116,8	101	120,0	104
13.	Herculio	230	115	117	104	129,5	112	118,3	103
14.	KWS Petraro	210	113	92	102	118,3	102	116,3	101
15.	LID1033C	230	98	105	97	115,6	100	113,7	99
16.	Rochester	230	97	96	103	114,1	99	113,0	98
17.	SM Hiltop	230	90	95	104	111,4	96	119,9	104
18.	Bayninja	CCA	87	97	94	107,1	93	114,4	99
19.	Parsifal	CCA	82	104	102	111,0	96	112,7	98

Wzorzec- średnia z wszystkich odmian

Lp. 18-19- odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 8.

Kukurydza na ziarno. Odmiany wczesne.**Wilgotność ziarna podczas zbioru w miejscowościach na tle średniej krajowej (%). Rok zbioru 2025**

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Wilgotność ziarna podczas zbioru, %						
			Wróćkowo	Rychliki	Krzyżewo	średnia	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
								średnia	% wzorca
odmiany wczesne									
wzorzec:			37,1	31,4	32,1	33,5	-	27,6	-
1.	Ashley	220	35,1	30,6	30,4	32,0	96	27,4	99
2.	LID1015C	220	37,9	31,0	32,1	33,7	100	27,5	100
3.	Aktoro	220	36,1	31,4	32,8	33,4	100	27,4	99
4.	KWS Emporio	210	35,7	27,2	30,5	31,1	93	26,4	96
5.	P8255	230	38,6	31,6	32,9	34,4	103	28,7	104
6.	Wesley	230	38,7	33,2	33,1	35,0	104	29,2	106
7.	Ibarama	230	33,2	30,3	31,2	31,6	94	27,5	100
8.	KWS Norento	230	37,8	31,1	31,4	33,4	100	27,9	101
9.	KWS Pluvio	230	35,3	31,3	30,6	32,4	97	27,3	99
10.	P7818	220	36,5	30,1	31,1	32,6	97	26,5	96
11.	SM Fagun	230	39,0	34,1	33,5	35,5	106	28,9	105
12.	SY Fanfara	230	36,9	32,8	33,9	34,5	103	28,7	104
13.	Herculio	230	38,7	32,7	32,2	34,5	103	28,5	103
14.	KWS Petraro	210	37,7	29,1	31,5	32,8	98	26,0	94
15.	LID1033C	230	37,4	31,4	32,5	33,8	101	27,7	100
16.	Rochester	230	37,0	30,3	32,4	33,2	99	27,7	100
17.	SM Hiltop	230	39,5	34,3	33,5	35,8	107	28,9	105
18.	Bayninja	CCA	37,1	30,8	30,8	32,9	98	27,8	101
19.	Parsifal	CCA	37,0	33,4	32,6	34,3	102	28,6	104

Wzorzec średnia z wszystkich odmian**Lp. 18-19-** odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 9.

Kukurydza na ziarno. Odmiany wczesne.**Plon ziarna (przy wilgotności ziarna 14%). Lata zbioru: 2025, 2024, 2023.**

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Plon ziarna (% wzorca)					KRAJ wg COBORU		
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025	2025	2024-2025	2023-2025
odmiany wczesne										
wzorzec dt/ha:			115,6	118,6	109,7	117,1	114,6	115,4	116,8	114,7
1.	Ashley	220	98	101	106	100	102	96	98	99
2.	LID1015C	220	96	101	104	99	100	98	100	100
3.	Aktoro	220	103	97	102	100	101	100	100	101
4.	KWS Emporio	210	96	106	96	101	99	99	101	101
5.	P8255	230	105	97	100	101	101	99	99	100
6.	Wesley	230	99	99	99	99	99	103	104	103
7.	Ibarama	230	109	106	-	108	-	106	107	-
8.	KWS Norento	230	99	105	-	102	-	99	102	-
9.	KWS Pluvio	230	99	99	-	99	-	99	99	-
10.	P7818	220	104	108	-	106	-	101	101	-
11.	SM Fagun	230	94	93	-	94	-	97	97	-
12.	SY Fanfara	230	101	105	-	103	-	104	105	-
13.	Herculio	230	112	-	-	-	-	103	-	-
14.	KWS Petraro	210	102	-	-	-	-	101	-	-
15.	LID1033C	230	100	-	-	-	-	99	-	-
16.	Rochester	230	99	-	-	-	-	98	-	-
17.	SM Hiltop	230	96	-	-	-	-	104	-	-
18.	Bayninja	CCA	93	-	-	-	-	99	-	-
19.	Parsifal	CCA	96	-	-	-	-	98	-	-

Wzorzec- średnia z wszystkich odmian**Lp. 18-19-** odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 10.

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniowczesne.**Plon ziarna (przy wilgotności ziarna 14%) oraz wilgotność ziarna podczas zbioru w miejscowościach na tle średniej krajowej.****Rok zbioru 2025**

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Plon ziarna, % wzorca						Wilgotność ziarna podczas zbioru (%)					
			Wróćkowo	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)		Wróćkowo	Krzyżewo	średnia	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
							średnia dt/ha	% wzorca					średnia	% wzorca
odmiany średniowczesne														
wzorzec dt/ha:			102,8	139,3	102,8	-	118,3	-	39,6	33,7	36,7	-	28,6	-
1.	Farmpower	250	102	102	104,9	102	118,8	100	38,9	33,9	36,4	99	30,8	108
2.	Inception	250	101	107	106,9	104	122,4	103	39,6	33,1	36,4	99	29,2	102
3.	KWS Camillo	250	101	97	101,8	99	119,6	101	39,4	32,7	36,1	98	28,3	99
4.	LG31240	240	107	102	107,4	105	121,1	102	37,8	31,6	34,7	95	26,8	94
5.	Murphey	240	96	100	100,7	98	117,0	99	39,7	34,6	37,2	101	28,4	99
6.	P8904	240-250	96	105	103,3	101	120,6	102	40,8	34,2	37,5	102	28,5	100
7.	KWS Editio	240	112	110	114,1	111	121,0	102	37,1	32,1	34,6	94	28,2	99
8.	LG32257	240	102	96	101,8	99	117,3	99	38,9	33,6	36,3	99	28,3	99
9.	LID2020C	240	100	106	105,9	103	121,9	103	38,7	33,0	35,9	98	27,9	98
10.	Lunexal	240	97	98	100,2	98	117,4	99	40,1	33,6	36,9	100	29,0	101
11.	Sunbird	240	94	100	99,7	97	117,4	99	39,7	34,6	37,2	101	28,0	98
12.	Bots	250	108	95	104,3	102	117,8	100	37,9	33,2	35,6	97	29,7	104
13.	KWS Adamo	240	99	101	102,8	100	113,3	96	38,1	31,8	35,0	95	26,9	94
14.	KWS Kolendo	240	100	100	102,8	100	117,7	99	37,9	32,7	35,3	96	27,2	95
15.	LID1244C	240	101	102	104,3	102	118,7	100	37,6	33,6	35,6	97	28,1	98
16.	LID2155C	250	78	104	93,5	91	124,9	106	43,9	35,1	39,5	108	29,5	103
17.	P8660	240	103	106	107,4	105	118,2	100	38,8	33,7	36,3	99	28,8	101
18.	P9255	250	97	97	99,7	97	122,2	103	41,8	36,1	39,0	106	29,8	104
19.	RGT Cedexx	240	94	92	95,6	93	115,9	98	42,2	34,4	38,3	104	29,2	102
20.	RGT Veluxxo	250	99	103	103,8	101	121,2	102	39,7	34,4	37,1	101	28,9	101
21.	Serafino	250	100	91	98,2	96	113,5	96	39,8	35,3	37,6	102	28,8	101

c.d. Tabela 10

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Plon ziarna, % wzorca						Wilgotność ziarna podczas zbioru (%)					
			Wróćkowo	Krzyżewo	średnia (dt/ha)	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)		Wróćkowo	Krzyżewo	średnia	% wzorca	KRAJ (wg COBORU)	
							średnia dt/ha	% wzorca					średnia	% wzorca
odmiany średniowczesne														
wzorzec dt/ha:			102,8	139,3	102,8	-	118,3	-	39,6	33,7	36,7	-	28,6	-
22.	Agrolupo	240	106	104	107,9	105	117,3	99	38,0	32,9	35,5	97	27,8	97
23.	Dagaz	250	103	100	104,3	102	119,0	101	38,1	31,6	34,9	95	28,2	99
24.	Facilio	240	102	96	101,8	99	113,3	96	36,8	32,6	34,7	95	27,9	98
25.	Keystone	240	68	89	80,7	79	109,9	93	45,5	34,0	39,8	108	28,2	99
26.	KWS Burano	240	109	107	111,0	108	118,2	100	37,9	31,9	34,9	95	26,9	94
27.	KWS Lupollino	240	101	102	104,3	102	117,9	100	39,9	33,5	36,7	100	28,0	98
28.	KWS Privilio	240	113	107	113,1	110	124,4	105	38,5	33,5	36,0	98	27,8	97
29.	LID2214C	240	97	107	104,9	102	120,6	102	39,9	34,6	37,3	101	28,0	98
30.	RGT Alpixx	240	97	87	94,6	92	111,0	94	40,6	33,3	37,0	101	28,6	100
31.	RGT Peterxxon	250	78	93	87,9	86	114,9	97	44,6	36,2	40,4	110	30,0	105
32.	Rockhampton	240	110	108	112,1	109	123,0	104	39,3	33,8	36,6	100	27,9	98
33.	Barkley	CCA	110	102	109,0	106	118,9	101	40,1	35,0	37,6	102	29,6	103
34.	Calixto	CCA	90	104	99,7	97	121,1	102	42,9	35,0	39,0	106	29,7	104
35.	Clooney	CCA	108	89	101,3	99	113,5	96	38,1	33,5	35,8	98	29,0	101
36.	Debix	CCA	101	98	102,3	100	118,2	100	39,0	33,4	36,2	99	28,7	100
37.	Farmoritz	CCA	109	93	103,8	101	115,8	98	39,2	35,2	37,2	101	29,9	105
38.	Farmueller	CCA	107	95	103,8	101	118,0	100	39,1	33,4	36,3	99	29,5	103
39.	KWS Aldo	CCA	108	104	109,0	106	120,6	102	38,5	33,0	35,8	97	28,0	98
40.	LG31252	CCA	110	101	108,5	106	118,1	100	40,1	33,3	36,7	100	28,8	101
41.	P8556	CCA	94	103	101,3	99	119,1	101	42,8	35,5	39,2	107	28,7	100
42.	Smartboxx	CCA	90	98	96,6	94	116,5	98	36,6	34,3	35,5	97	28,8	101

Wzorce- średnia z wszystkich odmian

Lp. 33-42- odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 11.

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniowczesne.

Plon ziarna (przy wilgotności ziarna 14%). Lata zbioru: 2025, 2024, 2023.

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Plon ziarna, % wzorca					KRAJ wg COBORU		
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025	2025	2024-2025	2023-2025
odmiany średniowczesne										
wzorzec dt/ha:			102,8	129,8	128,0	116,3	120,2	118,3	122,5	122,8
1.	Farmpower	250	102	98	96	100	99	100	100	99
2.	Inception	250	104	105	103	105	104	103	104	103
3.	KWS Camillo	250	99	97	101	98	99	101	100	101
4.	LG31240	240	105	108	104	107	106	102	101	101
5.	Murphey	240	98	96	105	97	100	99	98	99
6.	P8904	240-250	101	102	108	102	104	102	102	103
7.	KWS Editio	240	111	-	98	-	105*	102	-	103*
8.	LG32257	240	99	103	110	101	104	99	99	100
9.	LID2020C	240	103	100	102	102	102	103	103	103
10.	Lunexal	240	98	97	97	98	97	99	100	102
11.	Sunbird	240	97	101	98	99	99	99	101	100
12.	Bots	250	102	106	-	104	-	100	101	-
13.	KWS Adamo	240	100	96	-	98	-	96	96	-
14.	KWS Kolendo	240	100	97	-	99	-	99	98	-
15.	LID1244C	240	102	102	-	102	-	100	102	-
16.	LID2155C	250	91	113	-	102	-	106	107	-
17.	P8660	240	105	102	-	104	-	100	99	-
18.	P9255	250	97	105	-	101	-	103	105	-
19.	RGT Cedexx	240	93	106	-	100	-	98	100	-
20.	RGT Veluxxo	250	101	101	-	101	-	102	102	-
21.	Serafino	250	96	91	-	94	-	96	94	-

c.d. Tabela 11

Lp.	Odmiany	Wczesność FAO	Plon ziarna, % wzorca					KRAJ wg COBORU		
			2025	2024	2023	2024-2025	2023-2025	2025	2024-2025	2023-2025
odmiany średniowczesne										
wzorzec dt/ha:			102,8	129,8	128,0	116,3	120,2	118,3	122,5	122,8
22.	Agrolupo	240	105	-	-	-	-	99	-	-
23.	Dagaz	250	102	-	-	-	-	101	-	-
24.	Facilio	240	99	-	-	-	-	96	-	-
25.	Keystone	240	79	-	-	-	-	93	-	-
26.	KWS Burano	240	108	-	-	-	-	100	-	-
27.	KWS Lupollino	240	102	-	-	-	-	100	-	-
28.	KWS Privilio	240	110	-	-	-	-	105	-	-
29.	LID2214C	240	102	-	-	-	-	102	-	-
30.	RGT Alpidx	240	92	-	-	-	-	94	-	-
31.	RGT Peterxxon	250	86	-	-	-	-	97	-	-
32.	Rockhampton	240	109	-	-	-	-	104	-	-
33.	Barkley	CCA	106	97	-	102	-	101	102	-
34.	Calixto	CCA	97	-	-	-	-	102	-	-
35.	Clooney	CCA	99	97	99	98	98	96	97	98
36.	Debix	CCA	100	103	-	102	-	100	99	-
37.	Farmoritz	CCA	101	100	96	101	99	98	100	99
38.	Farmueller	CCA	101	102	104	102	102	100	103	103
39.	KWS Aldo	CCA	106	-	-	-	-	102	-	-
40.	LG31252	CCA	106	-	-	-	-	100	-	-
41.	P8556	CCA	99	-	-	-	-	101	-	-
42.	Smartboxx	CCA	94	95	94	95	94	98	97	98

*- KWS Editio- średnia z roku 2025 i 2023

Wzorzec- średnia z wszystkich odmian

Lp. 33-42- odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie są wpisane do Krajowego rejestru)

Charakterystyka odmian kukurydzy wpisanych do Krajowego rejestru w sezonie wegetacyjnym 2025 na podstawie Listy Opisowej Odmian COBORU (odmiany badane w doświadczeniach regionalnych)

AGROLUPO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej duży. Rośliny dość wysokie. Odporność na głównię łodyg – średnia do dużej, na głównię kolb – średnia. Strawność roślin średnia.

BELLWOOD

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do małej. Strawność roślin średnia do dobrej.

DAGAZ

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – średnia, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej, na głównię łodyg – duża, na głównię kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – mała.

FACILIO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu flint. Plon ziarna dość duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg – duża, na głównię łodyg i głównię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – mała do bardzo małej.

HERCULIO

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – średnia do małej, na głównię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin dobra.

KEYSTONE

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – duża, na głównię kolb i łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – mała; na omacnicę prosowiankę – duża.

KWS BURANO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – mała, na fuzariozę łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – mała do bardzo małej.

KWS KALPO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent.. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – duża do bardzo dużej, na głównię kolb – duża. Strawność roślin dobra.

KWS LUPOLLINO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średwczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego między flint i dent. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy dość duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – duża, na głównię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin średnia do dobrej.

KWS PETRARO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na fuzariozę kolb – średnia do dużej; na głównię kolb – mała, na głównię łodyg – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.

KWS PRIVILIO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny bardzo niskie, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na głównię 15 kolb – średnia do dużej, na głównię łodyg – duża, na fuzariozę kolb – duża do bardzo dużej; na omacnicę prosowiankę – bardzo mała.

LID1033C

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – duża do bardzo dużej, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

LID2214C

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię kolb – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do małej, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.

MHR MERCADO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny wysokie. Odporność na głównię łodyg i kolb – bardzo mała. Strawność roślin średnia.

P9944

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 280. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głównię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – bardzo mała, na głównię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – mała.

RGT ALPIX

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna dość duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – mała, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do dużej oraz na omacnicę prosowiankę – średnia do małej.

RGT ODDAXX

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – średnia do dużej, na głównię kolb – średnia. Strawność roślin bardzo mała.

RGT PETERXXON

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – duża, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do małej; na omacnicę prosowiankę – mała.

RGT TRAPIXX

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy mniejszy. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – mała do bardzo małej, na głównię kolb – bardzo mała. Strawność roślin dobra do bardzo dobrej.

ROCHESTER

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint. Plon ziarna bardzo duży do bardzo dużego. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię łodyg – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do małej, głównię kolb – duża, na omacnicę prosowiankę – duża do bardzo dużej.

ROCKHAMPTON

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu pośredniego pomiędzy flint i dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i głównię łodyg i kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia do dużej, na fuzariozę łodyg – średnia do dużej.

SM HILTOP

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb – bardzo duża, na fuzariozę łodyg – bardzo mała, na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do dużej, na omacnicę prosowiankę – mała.

SM INA

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250-260. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – średnia do dużej. Strawność roślin średnia do małej.

SM JASPER

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny bardzo wysokie. Odporność na głównię łodyg – średnia, na głównię kolb – mała. Strawność roślin średnia do małej.

SM MANOSO

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia do małej.

SM NIDA

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg i kolb – mała. Strawność roślin średnia.

SM RAMBO

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg – średnia do dużej, na głównię kolb – średnia. Strawność roślin bardzo mała.

SM ROKITA

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej bardzo duży. Rośliny wysokie. Odporność na głównię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia do małej.

SM ZULU

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu flint. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głównię łodyg i kolb – średnia. Strawność roślin średnia.