

Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych

**Kukurydza
na ziarno
2025**



Słupia Wielka 34
PL 63-022 Słupia Wielka

tel.: (+48) 61 285 23 41
faks.: (+48) 61 285 35 58
email sekretariat@coboru.gov.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Henryk Bujak

Pracownia WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy

Kierownik

mgr inż. Karolina Piecuch

Opracowanie

mgr inż. Karolina Piecuch

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian kukurydzy badanych w doświadczeniach rozpoznawczych, w sezonach wegetacyjnych 2025, 2024 i 2023. Odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce oceniane na tle odmian z Krajowego rejestru i niektórych z CCA badanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Do badań rozpoznawczych odmiany zostały zgłoszone przez zainteresowane podmioty. Materiał siewny tych odmian najczęściej znajduje się już w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych działających w naszym kraju.

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ziarna (kukurydza na ziarno) w roku 2025 lub w latach poprzednich w obrębie wydzielonych grup wczesności (dla odmian badanych rozpoznawczo – oddzielnie dla testowanych dwa lub trzy lata i oddzielnie dla ocenianych pierwszy rok).

**Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji
wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji**

Tabela 1

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiany		Plon ziarna przy 14% wilgotności			Wilgotność ziarna w czasie zbioru		
			% wzorca			%		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
	1		2			3		
Wzorzec, dt z ha, %			115,8	116,7	99,0	29,4	20,5	20,6
	wpisane do KR i po badaniach rozpoznawczych							
1	Ibarama	FR	106	105		29,0	20,5	
2	SM Hiltop	PL	104			31,2		
3	Herculio	DE	103			29,9		
4	P7818	US	103	101		27,7	18,5	
5	SY Fanfara	CH	103	106		30,4	21,2	
6	Wesley	PL	102	104	103	30,5	21,2	22,2
7	Aktoro	AT	101	100	99	29,0	20,6	20,9
8	KWS Petraro	DE	101			28,0		
9	KWS Norento	DE	99	103		29,3	20,6	
10	SM Fagun	PL	99	96		30,4	21,9	
11	Parsifal *	DE	99	(104)	(102)	30,4	(23,4)	(21,4)
12	Ashley	FR	98	98	101	28,9	20,4	21,1
13	LID1015C	FR	98	101	103	28,9	19,6	19,9
14	LID1033C	FR	98			29,7		
15	P8255	US	98	97	100	30,3	21,4	21,4
16	Bayninja *	DE	98	(105)	(98)	29,5	(20,6)	(20,1)
17	KWS Pluvio	DE	97	98		28,7	21,0	
18	Rochester	FR	97			29,2		
19	KWS Emporio	DE	96	99	99	27,8	19,6	20,1
	zgłoszone do badań rozpoznawczych							
20	EC Gisella	DE	107	107	108	31,4	24,1	25,1
21	Caballo	DE	103	107		29,3	20,4	
22	Silvio	FR	102	104		29,4	21,1	
23	Belenos	DE	100	102		29,4	21,0	
24	Kraken	FR	100	94		31,0	22,2	
25	Scorecard	FR	98	98		30,8	20,7	
26	Thermic	DE	98	101		30,7	22,6	
27	RGT Keloxxs	FR	97	101		29,6	20,8	
28	P8436	US	95	98	108	29,1	19,9	21,3
29	SY Fleming	CH	108			30,5		
30	Amalkeo	DE	103			29,1		
31	Dorothey	FR	102			30,2		
32	Privat	DE	101			30,8		
33	Climber	DE	100			30,1		
34	Dossian	FR	100			29,3		
35	Bazuk	DE	99			31,4		
36	Qucikstep	FR	99			30,5		
37	Cigaluxx	FR	98			29,2		
38	Vertual	US	97			26,9		
39	DKC2972	US	92			28,4		
40	Edoro	AT	92			30,2		
41	DKC3247	US	89			28,3		
42	SU Addition	US	86			29,8		
Liczba doświadczeń			7	7	7	7	7	7

Kol. 1: wzorzec: średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie wczesnej w doświadczeniach PDO * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Kol. 2, 3: () – wynik z badań rozpoznawczych odmiany

Tabela 2

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiany		Plon ziarna przy 14% wilgotności			Wilgotność ziarna w czasie zbioru		
			% wzorca			%		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		122,8	137,7	126,2	27,6	21,2	23,3
	wpisane do KR i po badaniach rozpoznawczych							
1	Inception	DE	107	103	105	28,7	21,7	23,8
2	KWS Privilio	DE	107			27,1		
3	LG31240	FR	106	100	101	25,4	20,4	22,7
4	Farmpower	DE	105	100	95	29,5	23,6	24,8
5	KWS Editio	DE	105			27,3		
6	RGT Veluxxo	FR	105	104		27,4	21,8	
7	Calixto *	DE	105	(108)	(107)	28,8	(21,5)	(24,8)
8	LID2214C	FR	104			26,9		
9	P8904	US	104	101	106	27,9	20,0	22,2
10	Barkley *	FR	104	102	(99)	29,0	21,1	(22,2)
11	LID2155C	FR	103	106		28,8	21,4	
12	KWS Aldo *	DE	103	(104)	(105)	26,7	(21,1)	(23,9)
13	P8556 *	US	103	(106)	(102)	27,5	(20,5)	(22,1)
14	KWS Camillo	DE	102	98	102	27,1	20,3	22,5
15	LID2020C	FR	102	101	103	27,2	20,0	22,4
16	Murphey	FR	102	95	99	27,4	22,1	23,5
17	P9255	US	102	109		28,5	20,9	
18	Rockhampton	FR	102			27,0		
19	Dagaz	DE	101			27,0		
20	KWS Lupollino	DE	101			27,7		
21	LG31252 *	FR	101	(103)	(102)	27,5	(21,3)	(22,7)
22	RGT Cedexx	FR	100	103	(100)	28,1	21,9	(24,2)
23	Bots	DE	99	103	(103)	29,0	22,8	(23,7)
24	LG32257	FR	99	98	103	27,5	20,9	22,2
25	LID1244C	FR	99	97		27,6	20,2	
26	RGT Peterxxon	FR	99			28,7		
27	Sunbird	FR	99	101	100	27,0	20,1	22,1
28	KWS Burano	DE	98			26,1		
29	KWS Kolendo	DE	98	97		26,1	20,4	
30	P8660	US	98	106		27,9	20,6	
31	Smartboxx *	CH	98	96	100	27,6	21,4	23,3

Lp.	Odmiany		Plon ziarna przy 14% wilgotności			Wilgotność ziarna w czasie zbioru		
			% wzorca			%		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		122,8	137,7	126,2	27,6	21,2	23,3
32	Lunexal	FR	97	103	104	28,1	20,6	23,9
33	Farmueller *	DE	97	105	103	28,6	22,4	24,1
34	KWS Adamo	DE	96	94		25,6	19,8	
35	Debix *	DE	96	100	(102)	27,0	21,6	(23,4)
36	Farmoritz *	DE	96	101	98	28,8	23,1	24,5
37	Agrolupo	DE	94			26,9		
38	Facilio	DE	94			27,0		
39	Keystone	FR	94			26,2		
40	RGT Alpixx	FR	93	(103)	(102)	27,9	(21,8)	(22,7)
41	Serafino	AT	93	91		27,9	21,8	
42	Clooney *	FR	92	98	98	28,4	21,9	23,9
	zgłoszone do badań rozpoznawczych							
43	KWS Artesio	DE	103	106		27,7	20,2	
44	KWS Lantano	DE	103	105		26,8	20,1	
45	BRV2383B	US	102	104		26,5	20,3	
46	Cheerful	DE	102	100		27,9	21,5	
47	KWS Kaduro	DE	102	99		26,7	20,1	
48	Beluga	DE	101	100	101	28,5	22,6	23,9
49	RGT Kepoxx	FR	100	102		27,4	20,1	
50	Snowy	AT	100	99		27,8	21,1	
51	Wakefield	FR	100	102		27,0	19,8	
52	Bazuk	DE	99	99		28,9	22,6	
53	Euroboss	DE	99	99		28,4	22,8	
54	KWS Arturello	DE	99	100		26,0	20,0	
55	Ismeri	DE	98	99	102	28,2	23,1	23,9
56	SY Olivia	CH	97	103		26,3	21,3	
57	Bivouac	US	96	104		28,0	21,8	
58	Privat	DE	94	101	100	28,7	22,4	23,3
59	MAS 282K	FR	87	92	97	27,3	20,5	23,3
60	P9279	US	109			29,4		
61	P89699	US	108			29,0		
62	P92841	US	107			28,9		
63	EC Gisella	DE	105			28,5		
64	Westmont	FR	105			28,8		

Lp.	Odmiany		Plon ziarna przy 14% wilgotności			Wilgotność ziarna w czasie zbioru		
			% wzorca			%		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		122,8	137,7	126,2	27,6	21,2	23,3
65	P92440	US	103			27,6		
66	Transformers	DE	103			28,5		
67	Amarone	DE	102			27,3		
68	Turbojet	FR	102			28,3		
69	DKC3346	US	101			26,1		
70	SU Keldeo	US	100			27,7		
71	Zigoto	DE	99			27,7		
72	Dracula	UK	98			27,9		
73	SU Hampton	US	98			26,3		
74	Inextenso	FR	97			27,6		
75	DKC3400	US	96			26,2		
76	DKC3527	US	96			27,1		
77	Farmtron	DE	96			29,9		
78	LID2404C	FR	96			27,2		
79	SY Figura	CH	96			27,4		
80	DKC3402	US	92			27,0		
81	GW0739	GR	90			27,9		
	OHM – ekologiczny materiał heterogeniczny							
82	Ukiel	PL	82			29,3		
Liczba doświadczeń			7	6	8	7	6	8

Kol. 1: wzorzec: średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie średniowczesnej w doświadczeniach PDO; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Kol. 2, 3: () – wynik z badań rozpoznawczych odmiany

Tabela 3

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniopóźne. Plon i wilgotność ziarna.
Lata zbioru: 2025, 2024, 2023

Lp.	Odmiany		Plon ziarna przy 14% wilgotności			Wilgotność ziarna w czasie zbioru		
			% wzorca			%		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		127,1	144,1	144,8	31,1	20,2	23,6
	wpisane do KR i po badaniach rozpoznawczych							
1	P9944	US	108			32,0		
2	P9975	US	107			33,8		
3	KWS Hypolito *	DE	102	(105)	(106)	34,6	(20,2)	(25,3)
4	BRV1586D *	US	101	(102)	(104)	28,5	(19,6)	(23,6)
5	P9610	US	100	98	107	28,4	19,1	23,6
6	P0710 *	US	100	104	(112)	37,5	24,6	(27,8)
7	P9367 *	US	98	(100)	(109)	27,8	(18,8)	(23,1)
8	RGT Alexx *	FR	97	97	(110)	32,1	20,4	(25,6)
9	KWS Kaspero	DE	95			29,4		
10	LID3306C	FR	92	105	104	26,4	18,7	23,1
	zgłoszone do badań rozpoznawczych							
11	Prexxtton	FR	99	97		29,8	20,3	
12	Mogabrix	FR	98	98		29,0	20,8	
13	Dexter	FR	96	96	105	28,4	20,1	23,7
14	Citadel	FR	95	95	97	29,4	18,9	23,6
15	MAS 357M	FR	95	96	99	30,9	20,4	24,3
16	RGT Poxxtal	FR	94	95		29,1	18,9	
17	Volraxe	FR	93	93		28,4	18,6	
18	DKC4125	US	90	102		28,9	19,7	
19	Farmeriko	DE	89	91		33,1	22,6	
20	Hipster	FR	88	100		32,1	20,9	
21	Solaking	US	83	96	96	29,1	19,1	22,6
22	Indem1012	US	101			31,4		
23	KWS Forturio	DE	101			35,6		
24	Farmedoc	DE	98			27,8		
25	KWS Exceptio	DE	98			31,9		
26	Bigboss	FR	97			35,3		
27	Farmalba	DE	97			28,2		
28	Bozon	HR	96			33,8		
29	DKC3844	US	96			28,8		
30	DKC4031	US	96			27,3		
31	DKC3805	US	94			26,5		
32	SY Electron	CH	94			29,8		
33	SY Nautilus	CH	94			27,3		
34	DKC4428	US	93			28,4		
35	Queenstown	FR	93			27,3		
36	Tarraco	AT	93			29,3		
37	Foxtrail	FR	92			30,7		
38	Alpedro	AT	91			31,7		
39	Limonite	FR	91			29,0		
40	RGT Pinxxfloyd	FR	90			31,3		

Lp.	Odmiany		Plon ziarna przy 14% wilgotności			Wilgotność ziarna w czasie zbioru		
			% wzorca			%		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
	1		2			3		
	Wzorzec, dt z ha, %		127,1	144,1	144,8	31,1	20,2	23,6
41	Fizz	DE	89			28,3		
42	DKC3747	US	88			26,3		
43	Farmluke	DE	84			37,2		
44	GW3808	GR	83			31,1		
45	ZE Elizabeth	SK	82			32,4		
46	Glanda	AT	81			27,9		
47	STINE9714HP	RO	73			36,9		
Liczba doświadczeń			7	5	7	7	5	7

Kol. 1: wzorzec: średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w grupie średniopóźnej w doświadczeniach PDO; * – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do KR

Kol. 2,3: () – wynik z badań rozpoznawczych odmiany